63078/B
2 d 1
S.d 98
J
a 75

The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark
REUSS, C.F.

U5

COMPENDIVM
BOTANICES
SYSTEMATIS LINNÆANI
CONSPECTVM
EJVSDEMQVE
APPLICATIONEM
AD SELECTIORA
PLANTARVM GERMANIÆ
INDIGENARVM
VSV
MEDICO ET OECONOMICO
INSIGNIVM
GENERA EORVMQVE SPECIES
CONTINENS.

ADORNAVIT
CHRISTIANVS FRIDERICVS REVSS
MEDICINÆ DOCTOR ET PROFESSOR PVBLICVS
IN ALMA EBERHARDINO-CAROLINA.

MEDICAL

VLMÆ
SVMTV STETTINIANO.
1774.

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30515798

PRÆFATIO.

In ampliſſimo rei botanicæ campo, quem emenſi adhuc ſunt meritiſſimi & immortalis memoriæ viri, ad audendum aliquid quæ me commoverint rationes, paucis indicare & benevolo lectorum judicio ſubiicere Præfationis fere leges jubent.

Plantarum, quarum Claſſium, Ordinum, multiplicemque aliam, ipſius etiam naturæ earum, accuratiorem notitiam laudatiſſimis Perilluſtris *Linnæi* laboribus debemus, immenſa fere copia, ac multo etiam magis ingentes ſumtus, quibus ad libros ejus ſibi comparandos opus eſt, rei botanicæ ſtudium permultis nimis difficile reddunt; alios, qui operam ei aliquam dare magnopere geſtiunt, prorſus deterrent. Eam ob cauſam, ut tironibus via redderetur & expeditior & minus ſumtuoſa, vir Clariſſ. *Elmgreen*, ipſius *Linnæi* auctoritate & conſilio adductus, *Terminos botanicos*, addita brevi deſcriptione, in Compendium redegit, idque ſpeciminis loco editum Upſalæ A. 1762. ipſe deinceps Vir Perill.

Amoenitatum ſuarum volumini ſexto (p. 217. ſq.) inſeruit. Eodem conſilio Doctiſſ. *Lipp* diſſertationem illam auxit, utiliſſimo indice inſtruxit, & Vindobonæ A. 1765. Speciminis inauguralis loco cum orbe erudito ſub titulo *Enchiridii Botanici* communicavit. Et hunc ipſum libellum non tironibus modo, ſed & docentibus, ut lectionum botanicarum filum, Linnæi Philoſophiâ botanicâ, multo brevius, egregie omnino inſervire poſſe, viri rei hujus peritiſſimi judicarunt.

Horum aliorumve Clariſſimorum virorum veſtigia, non ſine optabili aliquo fructu, ſequi me poſſe, re haud indiligenter expenſa, exiſtimo. Non ſolum Medicinæ ſtudioſos, ſed & alios, in deliciis botanicis otia ſua collocantes, eos etiam inprimis, qui in ſtudio botanico ut αὐτοδίδακτοι verſantur, deſiderare, memini, librum manualem, qui ad rem botanicam, & præcipue quidem ad *Syſtematis Linnæani* ſcientiam, viam ipſis oſtenderet brevem & expeditam. Libellum hi tales jam dudum quærunt, qui terminorum non latinam modo deſcriptionem, ſed terminos hos vernaculo quoque ſermone expreſſos exhiberet; qui plantas contineret Germaniæ indigenas (*a*) ſelectiores, quas videre, colligere facile, & in uſus ſuos conver-

(*a*) De neceſſitate & utilitate cognitionis plantarum indigenarum præ exoticis, legi meretur inprimis Ill. *Büffon* allgemeine Naturgeſchichte. 1 Theil 1771. Berlin. p. 52. & Ill. *Linnæi* Amoenit. academic. Vol. II. p. 408. Orat. *de Peregrinationibus intra patriam.*

vertere poſſent. Ejusmodi libellus, etiamſi novi prorſus nihil contineret, id certe præſtat, ut tiro *conjuncta* videat, quæ prolixe & ſparſim propoſita ſunt in Ill. *Linnæi Generibus* & *Speciebus* plantarum, in ejusdem *Philoſophia Botanica*, aliisque ejus ſcriptis, & in aliis quoque rei botanicæ ſcriptoribus.

Quo igitur conſilio, quosve in fines meum huncce libellum ego conſcripſerim, facile jam intelliget benevolus lector. In eo adornando ita verſatus ſum, ut, præmiſſa *fatorum ſtudii botanici*, *præcipuorumque ſyſtematum* botanicorum, *Linnæani* inprimis, brevi recenſione,

1) Præcipuorum (licet fortaſſe ne horum quidem omnium,) *terminorum botanicorum*, quibus *Linnæus* inprimis utitur, deſcriptionem, translationem germanicam, illuſtrationem per aliquot exempla, & omnium denique indicem & latinum & germanicum exhiberem. *Lippium* ſupra laudatum ſecutus ſum, & hinc inde auctiorem reddidi.

2) Ut uſus & adplicatio terminorum botanicorum cuivis facile pateret, extraxi ex Celeberr. *Linn. Generibus* plantarum, eorumque *Specieb. deſcriptionem botanicam* plantarum & quidem Generum 423. ac Specierum paulo plus 700. *Germaniæ* noſtræ *indigenarum*, (*b*)

 quæ

(*b*) Plurium *Specierum*, & *exoticarum* & indigenarum, ob Compendii limites heic omiſſarum, cenſum de-

quæ tam in incultis quam cultis locis crescunt, (omissis Ordinibus, plantas exoticas continentibus,) his simul adjunxi *Locum natalem*, *Tempus* quo florent, & de complurium *vi medica*, *usuque œconomico*, generalia quædam, (quæ compendii limites admittunt,) ex scriptis potissimum *Linnæanis*, addidi, ad excitandum studii botanici amorem.

3) *Specialiora* quædam, Botanophilo observanda, proposui.

4) Hæc denique omnia excipit *Index* plantarum secundum *Ordinem temporis*, quo florescunt, aliusque *alphabeticus* tam *germanicus*, quam *latinus*, ut, si tiro nomen germanicum audiat, statim *Linnæanum* quoque reperiat, & v. v.

5) Utque clarius omnia tironi pateant, *icones* tandem addi curavi, partim ex Philosophia botanica Ill. Linnæi, partim aliunde desumtas.

Animus igitur fuit *Compendium* offerre Botanophilis, quod *terminologiam* tam *germanicam* quam

---

siderantes, adire præter alios possunt Clar. *Dieterichs* Pflanzenreich nach dem Linnæischen Natur-Systeм. Erfurt. 1770. Celeberr. *Beckmanni* systema Linnæi, (quoad Species) in epitomen redactum. Gœtting. 1772. & quoad nostrates inprimis Species *sponte* crescentes Doctissimi nostri *Gmelini* Enumerationem stirpium agro Tubingensi indigenarum. 1772.

quam *latinam*, & *brevem Syſtematis Linnæani delineationem* exhibeat, quod illos, qui *plantas Indigenas notas* ſibi reddere cupiunt, ita adjuvet, ut opus non habeant comparare ſibi majoris pretii libros, non indigenas modo ſed & exoticas plantas deſcribentes; quod iis etiam adjumento ſit, qui vel horto botanico, vel hortis Principum majoribus, exoticas continentibus, uti poſſunt; quod denique lectoribus plantarum indigenarum uſum tam *medicum* quam *œconomicum* oſtendat, & hac ipſa ratione eos ad exquirendas ulterius Hiſtoriæ Naturalis univerſæ delicias ac commoda excitet & alliciat.

Nec dubito, quin tentamini etiam huic meo veniam quandam conciliatura ſint verba præfationis, Diſſertationi ſupra laudatæ (Linn. Amoenit. Vol. VI. p. 217.) præmiſſæ.

„Rei quidem botanices tirones non pauci ſtu„pent, maxime arduum & herculeum opus fore „primo intuitu judicantes, cum vident, tot vo„cabulis inſolitis tamque ſtricte ſumtis aditum „ſibi occludi. Verum enim vero nullo negotio, „deprehendent, opera hiſce addiſcendis præſtita „proniori ut ajunt, alveo reliqua fluere. Profe„cto botanicem qui colit, ullo pacto metam „perfectioris cognitionis felicius non attinget, „quam ſi aliquot dies terminis cognoſcendis ac „perdiſcendis tribuerit, ſic enim omnia ſuperat „incommoda, quæ alios, hanc viam negligen„tes, jugiter & ubique manent. Botanices hi „termini maximam partem in horto Cliffortia„no, Philoſophia Botanica, aliisque expoſiti „qui-

„quidem ſunt, ſed magis *ſparſi*, *prolixiusque*, „quam, quos tiro, qui primis labiis ſcientiam „guſtavit, facile colligere poſſit.

Tandem, cum multi naturæ ſcholam, ubique patentem, ſcopo vel medico vel œconomico vel alio frequentare ſoleant, ſpero certe, eorum aliquos, cum vel ruri vel in hortis ambulantes magnificam plantarum ſtructuram contemplari geſtiunt, modico hoc libello, ſatis commode uſuros eſſe.

Tubingæ, d. XIV Apr. MDCCLXXIV.

PRÆCOGNOSCENDA.

§. 1.

Omnia, quæ in orbe, quem incolimus, exiſtunt corpora arte divina compoſita, e ſimplicibus conſtantia, nondum mutata, ad tres *claſſes* ſeu *regna* poſſunt redigi.

1) ad *Lapides*, quæ creſcunt ſine partibus viventibus & ſentientibus.
2) ad *Vegetabilia*, quæ creſcunt & vivunt ſine ſentientibus partibus.
3) ad *Animalia*, quæ creſcunt, vivunt & ſentiunt ſimul.

Plenariam horum corporum (quæ *naturalia* etiam vocantur,) cognitionem cum ſuis characteribus & qualitatibus ſuppeditat nobis *Hiſtoriæ naturalis* ſtudium.

§. 2.

Pro diverſitate objecti igitur *Hiſtoria naturalis dividitur* in

1) *Mineralogiam*, quæ lapides, ſ. foſſilia ſ. mineralia,
2) *Botanicam*, quæ vegetabilia,
3) *Zoologiam*, quæ animalia complectitur.

§. 3.

Mineralogiam & Zoologiam heic omittentes, *Botanicæ* ſolummodo inhæremus. In regno *vegetabili* qui ſimilia ſimilibus, & diverſa diverſis nominibus cuique intelligibilibus diſtincte noſcit nominare, deſcribere, eorumque uſus varios indicare, *Botanici* nomen recte meretur.

In plantis vero conſiderandis attentioni ſubjicitur

1) *externa* earum *ſtructura*, quæ hiſtorica eſt & *botanices ſimplicioris* ac puræ fundamentum. Hæc

in eo inprimis verſatur, ut una planta ab altera, facili, expedita, ac certa ratione diſtinguatur, ſingulæ denominentur, & demum in ordinem redigantur.

2) *interna* earum *ſtructura*, quæ cognitio magis eſt phyſica, & fundamentum *phyſiologiæ* plantarum, ſ. doctrinæ de organiſatione vitæ plantarum, (vid. infra §. 19.)

3) denique *utilitas plantarum*, quæ cognitio maxime eſt practica, & fundamentum *botanices applicatæ*, ſpeciatim

a) conſiderato plantarum uſu medico, *botanica* audit *medica*.

b) conſiderato plantarum uſu œconomico, *botanica* eſt œconomica.

§. 4.

In *ſtructura* plantarum *externa* varia occurrunt ſigna *characteriſtica*, unam plantam ab altera diſtinguentia, in quovis ſtatu, in omni conditione conſpicua, ut ſunt *forma*, *numerus*, *ſitus*, *proportio* partium &c.

Signa hæc plantarum characteriſtica ut eo facilius breviusque exprimi poſſint. requiruntur *termini technici*.

Plantæ vero in univerſa tellure, tanta copia reperiendæ, cum adeo diverſæ ſint indolis & conditionis, ut quævis planta ſpeciales qualitates pluresque vel pauciores characteres diſtinctivos contineat, hanc inprimis ob cauſam *gradus* erant determinandi, quibus plantæ inter ſe conveniunt.

§. 5.

1) Plantæ *ſingulæ* (individuæ,) in conſpectum noſtrum prodeunt.

2) Convenientia plurium ejusmodi plantarum conſtituit *ſpeciem*. Differentiæ ſpecierum notabiles a cauſa quadam occaſionali, climate, ſolo, calore, ventis, ortum ducentes vocantur *varietates*; variant plantæ quoad magnitudinem, plenitudinem, criſpationem, calorem, ſaporem, odorem: tot ſunt, varietates, quot differentes plantæ ex ejusdem ſpeciei ſemine productæ ſunt.

3) Species plantarum ſi conveniunt certis eſſentialibus præcipuisque characteribus, efficiunt *genus*.

4) varia ſimilia genera gignunt *ordinem*.

5) varii ſimiles ordines producunt *claſſes*.

§. 6.

§. 6.

In deſcriptione vegetabilium ut alter alterum facile intelligat, quævis planta peculiari inſignienda erat *nomine*, neque vero plane arbitrario, vago, ſed ad certas quasdam regulas compoſito.

Generum nomina conveniunt plerumque ordinum & claſſium nominibus, & inter ea palmam tenent, quæ una vel duabus tantum conſtant vocibus, eſſentialem generis characterem exprimentibus, nec qualitatibus ſingularum hujus generis ſpecierum contradicentibus.

Species plantarum nomine generico determinantur additis characteribus, a reliquis hujus generis ſpeciebus eas diſtinguentibus.

Ejusmodi ſpeciem ſignificat unicum additum epitheton, vel nomen quod vocant *triviale*: e. g. ſalvia pratenſis, nomen plantæ hujus *genus* indicans eſt *ſalvia*, *ſpeciem* vero exprimit nomen *pratenſis*, quæ eſt vox *trivialis*.

§. 7.

Diviſio plantarum ad varios hoſce gradus comparationis inſtituta vocatur *ſyſtema* ſ. *methodus*.

Requiritur itaque vegetabilium ſecundum certos characteres ſ. notas ab ipſo creatore plantis ſingulis impreſſas, per quinque heic convenientia membra (§. 5.) deſcriptio ac diſpoſitio, vegetabilia reſolvens, ignota brevi manifeſtans, oblivioni data momento revocans.

§. 8.

Hæc methodus eſt vel *artificialis*; vel *naturalis*;

Qui 1) *naturalem methodum* ſequuntur, abſtrahunt a characteribus arbitrariis, obſervant plantas, prout cuivis ſe offerunt, vel figura, vel ſapore &c. Qua plantarum complurium obſervatione ad ſimilitudines vel diſſimilitudines earum, ſicque ad ſpecies conſtituendas ducuntur; repetita ſpecierum contemplatio eos ad genera & exinde ad ordines & claſſes aſcendere gradatim jubent.

2) Qui *artificialem* methodum eligunt, primo propriam ſibi delineationem conſtituunt, deinde ad hujus delineationis normam cuivis plantæ locum adnumerant congruum, eas plantas in unam diviſionis ſpeciem redigunt, quæ in conformatione jam determi-

natarum conveniunt, eas vero removent, quæ in hiſce partibus aliter ſunt formatæ. Hac igitur ratione a generali diviſione ad ſpecialem deſcendunt.

§. 9.

Omnibus fere ætatibus fautores ac *cultores* habuit *botanica*, ob fructus quos ſemper exſeruit haud exiguos. Alii plantas promiſcue collegerunt earumque icones varios & ligno & aeri incidendos curarunt, non naturali ſuo ſed nigro colore delinearunt, & ordine arbitrario non concinno vel alphabetico aſſervarunt. Iterum alii in diſponendis plantis uſi fuerunt ordine a tempore florendi, vel a loco natali, vel ab uſu medico, vel ab ordine pharmacopæorum deſumto: porro alii plantas habitu externo convenientes conjunxerunt, & hac ratione genera quædam naturalia ſtabiliverunt. Poſt varia hæc conamina dein CASPAR BAVHINVS plantarum ab herbariis ſeculo decimo quinto ſingulatim deſcriptarum pleniorem & accuratiorem exhibere ſtuduit enumerationem, gramina, graminibus affines, & bulboſas plantas, bulboſis &c. conjunctim tradidit.

§. 10.

Bauhinum ſequentibus temporibus exceperunt alii, qui quam diverſas inierint rationes in adornandis ſyſtematibus botanicis, ſequens tabula oſtendit.

Syſtematici ſunt

I) UNIVERSALES, qui omnes plantarum claſſes methodo condiderunt ſyſtematica, & ſunt

a) *Fructiſtae*, qui a partibus fructificationis, (a pericarpio, ſemine, receptaculo,) ratione fructus ſua compoſuerunt ſyſtemata, ut ſunt

CÆSALPINVS (Anno 1583) MORISONVS (1680) JOH. RAJVS (1686) CHRISTOPH. KNAVTIVS (1687) DILLENIVS (1719) HERMANNVS (1690) HERM. BOERHAVE (1720) MORAND (1744) ERNSTINGIVS (1748) LAVRENT. HEISTERVS (1748) HALLERVS (1742).

b) *Corollaiſtae*, qui a membrana floris interna ſ. corolla petaloſa ſyſtemata ſua compoſuerunt, quoad

1) *numerum*. RIVINVS (1690) RVPPIVS (1726) LVDWIGIVS (1737 CHRISTIAN. KNAVTIVS 1716) HEBENSTREIT (1731) WEDEL (1742) BOEHMER (1750).

2) *figu-*

2) *figuram.* TOVRNEFORTIVS (1719) PLVMIERIVS (1703) VAILLANT (1718) PONTEDERA (1718) KRAMER (1728) SEGVIERIVS (1745).

c) *Calicistae*, quorum syſtema nititur membrana floris externa ſ. calice. MAGNOLIVS (1720) LINNÆVS (1748).

d) *Sexualiſtae*, ratione

1) *ſtaminis* & piſtilli. LINNÆVS (1748) GRONOVIVS (1743) DALIBARD (1749) HILL (1751) GLEDITSCH. (1764).

2) *calicis* & *ſtaminum* ſimul, ROYENVS (1740) LINNÆVS (1748) GMELINVS (1747) WACHENDORF (1747). quoad

3) *fructificationis* totius fragmenta, KLEINIVS (1749) DONATI (1750).

e) Foliorum differentiis claſſes plantarum inſtruxit Sauvages. 1751.

II) PARTIALES, qui unius tantum claſſis syſtema compoſuerunt, ratione

a) *compoſitorum*, VAILLANT (1718) PONTEDERA (1718).

b) *umbellatorum*, ARTEDI (1735) MORISON (1680) CRANZ (1767).

c) *graminum*, RAJVS (1686) SCHEVCHZERVS (1719) MICHELIVS (1729) LINNÆVS (1749) MONTIVS (1719) SCHREBER (1766).

d) *muſcorum*, DILLENIVS (1741) MICHELIVS (1729) HILL (1751).

e) *fungorum*, DILLENIVS (1741) MICHELIVS (1729). BATARRA (1735) HILL (1751) GLEDITSCHIVS (1753) SCHÆFFER (1763).

f) *filicum*, LINNÆVS (1748).

g) *arborum*, fruticum, ſuffruticum, DV HAMEL, DV MONCEAV (1755).

h) *orchidum*, HALLER (1760).

§. II.

(*) Ob anguſtiam harum pagellarum taceo alios autores botanicos, qui ſecundum enumerata hactenus syſtemata vel plantas ſingulas, ordinarias, ſ. rariores ſ. plane novas, vel plantas cujusdam regionis ſ. horti notatu digni, vel hiſtoriam, vel elementa, vel phyſiologiam botanices deſcripſerunt ac pertractarunt. Taceo alios *autores*, qui diverſa nomina vegetabilium a botanicis quondam impoſita, collegerunt, *ſynonymiſtas*, *etymologos* radices & originem nominum genericorum eruentes,

§. II.

Ad illos inprimis tranſeo *botanicos auctores*, qui *naturalem* ſecuti *methodum* in eo collocarunt operam, ut naturales claſſes & ordines, e conjunctis atque ad fructificationis partes diſpoſitis plantarum generibus formatos, conjungerent. Principem qui inter eos locum obtinent, ſunt RAJVS, ROYEN, HALLER.

I. RAII ordo ſummorum generum in plantis.

a) *Herbarum & ſuffruticum*

I. Plantæ ſubmarinæ, e. g. *Millepora*, *Fucus*.
II. Fungi, e. g. *Byſſus*, *Lichen*. III. Muſci.
IV. capillares herbæ, *Adiantum*.
V. herbæ flore ſtamineo ſ. apetalæ, *Equiſetum*.
VI. planipetalæ lacteſcentes, *Hieracium*
VII. flore diſcoide, ſemine pappoſo, *Senecio*,
VIII. corymbiferæ, ſemine non pappoſo, *Bellis*.
IX. capitatæ. *Centaurea*,
X. herbæ flore perfecto ſimplici, ſemine nudo ſolitario, *Valeriana*.
XI. umbelliferæ, *Scandix*. XII. ſtellatæ, *Gallium*.
XIII. aſperifoliæ. *Linum*. XIV. Verticillatæ, *Salvia*,
XV. ſemine nudo, polyſpermæ, *Potentilla*.
XVI. pomiferæ, *Cucumis*.
XVII. bacciferæ, *Rubus*, *Paris*.
XVIII multiſiliquæ, *Delphinium*.
XIX. vaſculiferæ, flore monopetalo, *Veronica*, *Primula veris*, his ſubjunguntur vaſculiferæ, flore dipetalo, *Hedyſarum*.
XX. herbæ tetrapetalæ ſiliquoſæ & ſiliculoſæ, *Lepidium*; quibus ſubjunguntur anomalæ flore tetrapetalo.
XXI. herbæ flore papilionaceo ſ. leguminoſæ, tetrapetalæ, *Vicia*.
XXII. herbæ pentapetalæ vaſculiferæ, *Ceraſtium*.
XXIII. herbæ graminifoliæ floriferæ, vaſculo tricapſulari, *Iris*; (quo & referendæ ſunt bulboſis affines.)

XXIV.

tes, *Lexicographos* nomina diverſarum linguarum colligentes, *botanophilos* anatomicos, internam ſtructuram vegetabilium contemplantes, *hortulanos* culturam vegetabilium tradentes, *botanophilos medicos*, vires & uſum vegetabilium in corpus humanum ſectantes.

XXIV. herbæ graminifoliæ flore ſtamineo ſ. ſtamineæ, *Zea.*
XXV. herbæ anomalæ, aut incertæ ſedis, *Tropaeolum.*

II. *Arborum & fruticum,*

XXVI. arbores arundinaceis foliis, ſ. arundinaceæ, *Betula.*
XXVII. arbores coniferæ, *Abies.*
XXVIII. arbores non coniferæ, *Buxus.*
XXIX. arbores pomiferæ umbilicatæ ſ. fructu umbilicato, *Sorbus.*
XXX. --- bacciferæ umbilicatæ polypyrenæ, *Ribes.*
XXXI. — bacciferæ umbilicatæ monopyrenæ, *Viburnum.*
XXXII. arbores pruniferæ, *Prunus, Ceraſus.*
XXXIII. arbores bacciferæ non umbilicatæ monopyrenæ, *Viſcum.*
XXXIV. arbores pomiferæ non umbilicatæ, *Citrus.*
XXXV. arbores bacciferæ non umbilicatæ polypyrenæ, *Liguſtrum.*
XXXVI. -- fructu ſicco, non ſiliquoſæ, *Fraxinus.*
XXXVII. -- ſiliquoſæ, flore non papilionaceo, *Mimoſa.*
XXXVIII. ---- ---- flore papilionaceo, *Geniſta.*
XXXIX. arbores anomalæ, *Ficus.*

§. 12.

II. ROYENI claſſes plantarum.

1) *Palmae,* 1) ſpadice ramoſo. e. g. *Coccos.* 2) incompletæ, *Acorus.* 3) ſpatha bifida, *Hydrocharis.* 4) ringentes, *Canna.* 5) Gynandræ, *Orchis.* 6) triandræ, *Iris.*
2) *Lilia,* 1) corolla monopetala. *Hyacinthus.* 2) corolla hexapetala, *Tulipa,* 3) caliculata, *Narciſſus.* 4) polygyna, *Veratrum.*
3) *Gramina,* 1) monogyna, *Scirpus.* 2) digyna ſimplicia, *Milium.* 3) digyna compoſita, *Hordeum.* 4) Diclina, *Carex.*
4) *Amentaceae, Salix,* 1) filamentis diſtinctis, *Alnus,* 2) filamentis connatis, *Pinus.*
5) *Umbelliferae,* umbella ſimplici, *Eryngium.* 2) involucro duplici, *Caucalis, Daucus.* 3) involucro unico. *Cicuta,* 4) involucro nullo, *Anethum.*

6) *Compoſitae* ſemifloſculoſæ, *Hieracium*, 2) capitatæ, *Carduus*. 3) floribus nudis, *Gnaphalium*. 4) floribus radiatis, *Aſter*.

7) *Aggregatæ* 1) monopetalæ, *Scabioſa*, 2) pentapetalæ, *Statice*.

8) *Tricoccae* 1) hermaphroditæ, *Euphorbia*, 2) androgynæ, *Ricinus*. 3) mares & feminæ, *Mercurialis*.

9) *Incompletae* 1) flore nudo, *Hippuris*, 2) flore bifido, *Coriſpermum*. 3) flore trifido, *Aſarum*. 4) flore quadrifido, *Urtica*. 5) flore quinque fido, *Polygonum*. 6) flore ſex fido, *Rumex*. 7) flore octifido, *Alchemilla*. 8) flore bis ſex fido, *Hura*.

10) *Fructiflorae* 1) floribus absque umbella ſparſis, *Valeriana*. 2) floribus umbellatis ſ. racemoſis, *Viburnum*. 3) floribus quinquefidis, *Campanula*. 4) floribus quadrifidis, *Adoxa*. 5) floribus trifidis, *Cliffortia*, 6) floribus indiviſis, *Ariſtolochia*. 7) floribus ſtellatis, *Aparine*.

11) *Caliciflorae* 1) floribus monopetalis, *Bryonia*. 2) floribus tetrapetalis, *Philadelphus*, 3) floribus pentapetalis, *Ceraſus*. 4) floribus octopetalis, *Dryas*. 5) floribus polypetalis, *Cactus*.

12) *Ringentes* 1) angioſpermæ, *Antirrhinum*, 2) gymnoſpermæ, *Lamium*.

13) *Siliquoſae* 1) ſiliqua ſubrotunda, *Thlaſpi*. 2) ſiliqua longiſſima, *Cheiranthus*.

14) *Columniferae* 1) calice ſimplici, *Geranium*. 2) calice duplici, *Althæa*.

15) *Leguminoſae*, 1) legumine regulari, *Vicia*. 2) legumine irregulari, *Medicago*.

16) *Oligantherae* 1) ſtaminibus duobus, *Syringa*. 2) ſtaminibus tribus, *Cheiranthus*. 3) ſtaminibus quatuor, *Plantago*. 4) ſtaminibus quinque aſperifoliæ, *Borrago*. 5) ſtaminibus quinque, folliculaceæ, *Aſclepias*, 6) ſtaminibus 5. pericarpio uniloculari, *Lyſimachia*. 7) ſtaminibus 5. pericarpio multiloculari, *Verbaſcum*. 8) ſtaminibus 6. *Berberis*. 9) ſtaminibus 7. *Trientalis*.

17) *Diploſantherae*, 1) antheris bicornibus, *Erica*. 2) floribus caryophyllæis, *Dianthus*, 3) ſtaminibus erectis, *Saxifraga*. 4) ſtaminibus declinatis, *Eſculus*.

18) *Polyantherae*, pericarpio ſimplici, *Papaver.* 2) pericarpio compoſito, *Aquilegia.* 3) pericarpio nullo, *Ranunculus.*
19) *Cryptantherae*, 1) filices, *Equiſetum.* 2) muſci, *Lycopodium*, *Bryum.* 3) Algæ, *Lichen*, 4) fungi, *Phallus.*
20) *Litophyta*, *Spongia*, *Lithoxylon.*

§. 13.

Cell. HALLERI plantarum Claſſes.

I) Plantæ, flore, ſtaminibus & petalis deſtitutæ, ſemine ſolo donatæ, e. g. *Boletus*. *Phallus.*
II) Plantæ, ſtaminibus veris & petalis deſtitutæ, flore aliquo & ſemine donatæ, *Lichen*, *Lycopodium*, *Lunaria*, *Aſplenium.*
III) Plantæ, petalis deſtitutæ, ſemine, flore & veris ſtaminibus donatæ; *Juniperus*, *Salix*, *Atripex.*
IV) Meioſtemones, *Alchemilla.*
V) Diploſtemones, *Chryſoſplenium.*
VI) Polyſtemones, *Mercurialis*, *Ariſtolochia.*
VII) Aquaticæ variæ, *Potamogeton*, *Stellaria.*
VIII) Triſtemones, flore plerumque bifolio, *Gramina*, *Hordeum*, *Lolium.*
IX) Graminibus adfines, *Carex*, *Juncus.*

Ordines cuique Claſſi ab auctore ſubjunctos recenſere non permittit anguſtia hujus compendii.

§. 14.

Cum vero nec paucæ nec parvæ ſint, quæ in completo plantarum ſyſtemate, methodo naturali adſtruendo, hinc inde occurrunt, difficultates. Botanici eo adducti fuerunt, ut, miſſa ejusmodi ſyſtematis cogitatione, plantas ad *ſimplices ordines naturales* ſ. *familias* redigere allaborarent. Et hoc quidem loco principatum tenent Illuſtr. LINNÆVS & Celeberr. ERXLEBEN.

I. LINNÆI ordines naturales ſunt 58.

1) Palmæ e. g. *Coccos*, *Phœnix*, 2) Piperitæ, *Acorus*, *Piper.*
3) Calamariæ, *Scirpus*, *Carex.*
4) Gramina, *Hordeum*, *Avena*, *Poa.*
5) Tripetaloideæ, *Juncus*, *Sagittaria.*
6) Enſatæ, *Gladiolus*, *Iris.*
7) Orchideæ, *Orchis*, *Satyrium.* 8) Scitomineæ, *Curcuma*, *Canna.*

9) Spathaceæ, *Allium*, *Narciſſus*,
10) Coronariæ, *Lilium*, *Tulipa*,
11) Sarmentaceæ, *Convallaria*, *Ariſtolochia*,
12) Holoraceæ, *Beta*, *Polygonum*.
13) Succulentæ, *Sempervivum*, *Sedum*,
14) Gruinales, *Linum*, *Geranium*,
15) Inundatæ, *Potamogeton*, 16) Caliciflorae, *Elaeagnus*,
17) Calicanthemæ, *Epilobium*, *Lythrum*,
18) Bicornes, *Erica*, 19) Heſperideæ, *Philadelphus*,
20) Rotaceæ, *Anagallis*, *Lyſimachia*. 21) Preciæ, *Primula*.
22 Caryophylleæ, *Dianthus*, *Saponaria*,
23) Trichilatæ, *Acer*, *Tropaeolum*,
24) Corydales, *Epimedium*, *Impatiens*,
25) Putamineæ, *Capparis*,
26) Multiſiliquæ, *Paeonia*, *Aquilegia*,
27) Rhœadeæ, *Chelidonium*, *Papaver*,
28) Luridæ, *Verbaſcum*, *Hyoſciamus*,
29) Campanaceæ, *Convolvulus*, *Campanula*,
30) Contortæ, *Vinca*, *Aſclepias*. 31) Vepreculæ, *Daphne*,
32) Papilionaceæ, *Phaſeolus*, *Lathyrus*, *Vicia*,
33) Lomentaceæ, *Polygala*,
34) Cucurbitaceæ, *Elaterium*, *Cucurbita*,
35) Senticoſæ, *Alchimilla*, *Potentilla*, *Roſa*,
36) Pomaceæ, *Ribes*, *Cratægus*, *Pyrus*, *Prunus*,
37) Columniferæ, *Malva*, *Althæa*, *Filia*,
38) Tricoccæ, *Euphorbia*, *Mercurialis*,
39) Siliquoſæ, *Lepidium*, *Thlaſpi*, *Raphanus*,
40) Perſonatæ, *Antirrhinum*, *Euphraſia*, *Scrophularia*,
41) Aſperifoliæ, *Borrago*, *Echium*, *Pulmonaria*, *Cynogloſſum*,
42) Verticillatæ, *Origanum*, *Horminum*, *Lamium*, *Galeopſis*,
43) Dumoſæ, *Viburnum*, *Sambucus*,
44) Sepiariæ, *Liguſtrum*, *Syringa*,
45) Umbellatæ, *Cicuta*, *Cherophyllum*, *Carum*, *Pimpinella*,
46) Hederaceæ, *Hedera*, *Vitis*,
47) Stellatæ, *Aſperula*, *Gallium*,
48) Aggregatæ, *Statice*, *Scabioſa*, *Valeriana*,
49) Compoſitæ.
a) Capitatæ, *Carduus*, *Carlina*,
b) Semifloſculoſæ, *Cichorium*, *Hieracium*, *Leontodon*,
c) Diſcoideæ, *Gnaphalium*, *Tanacetum*, *Tuſſilago*,
d) Oppoſitifoliæ, *Helianthus*, *Tagetes*,
e) Nucamentaceæ, *Artemiſia*. *Micropus*,

50) Amen-

50) Amentaceæ, *Salix*, *Quercus*, *Betula*,
51) Coniferæ, *Pinus*, *Juniperus*,
52) Coadunatæ, *Liriodendron*,
53) Scabridæ, *Urtica*, *Cannabis*,
54) Miſcellaneæ, *Reſeda*, *Poterium*,
55) Filices, *Osmunda*, *Adiantum*,
56) Muſci, *Lycopodium*, *Mnium*,
57) Algæ, *Lichen*, *Riccia*, 58) Fungi, *Agaricus*, *Boletus*.

De re botanica meritiſſimus hic Vir minime omnes plantas ad hos ordines naturales adnumerare audet: in ejus vero ſyſtemate artificiali eo amplius & accuratius plantæ fere omnes deſcribuntur ac recenſentur; quæ præ aliis ſyſtematicis prærogativam tenent.

§. 15.

Celeberr. ERXLEBEN *ordines naturales*, ad quos plantas quam plurimas referre allaborat, ſunt 63.

1) *Verticillatæ*, (quirlförmige Pflanzen) e. g. Origanum, Ajuga, Horminum, Lamium, Galeopſis,
2) *Perſonatæ*, (mit Larvenblumen) Verbena, Euphraſia, Scrophularia, Antirrhinum,
3) *Luridæ*, (betäubende Pfl.) Nicotiana, Hyoſciamus, Datura, Solanum,
4) *Sepiariæ*, (bittere Pfl.) Jaſminum, Liguſtrum,
5) *Jalapæ*, (Jalapen) Mirabilis, Valeriana,
6) *Aggregatæ*, (Scabioſen) Dipſacus, Scabioſa,
7) *Caprifoliæ*, (Geisblätter) Lonicera,
8) *Stellatæ*, (geſtirnte Pflanzen) Rubia, Aſperula,
9) *Cucurbitaceæ*, (kürbisartige Pfl.) Bryonia, Cucurbita, Cucumis,
10) *Campanaceæ*, (glocken) Convolvulus, Campanula Viola.
11) *Umbellatæ*, (Dolden) Carum, Scandix, Chærophyllum, Daucus, Caucalis,
12) *Compoſitæ ſemifloſculoſæ*, (Pfl. mit zungenförmigen Blümgen) Tragopogon, Leontodon, Hieracium, Cichorium.
13) *Compoſitæ capitatæ*, (Pfl. mit kopfförmig-zuſammengefezten Rohrblümgen) Arctium, Carduus, Carlina, Centaurea,
14) *Compoſitæ diſcoidæ*. (Pfl. mit Scheibenblumen) Gnaphalium, Tanacetum, Chryſanthemum, Tuſſilago, Senecio, Bellis,

15) *Com-*

15) *Compoſitæ oppoſitifoliæ*, (Pfl. mit zuſammengeſezten Blumen, und gegeneinander überſtehenden Blättern) e. g. Helianthus, Tagetes.
16) *Compoſitæ nucamentaceæ*, (Pfl mit zuſammengeſezten Blumen und Nüſſen, oder Kapſeln) Artemiſia, Micropus.
17) *Coniferæ*, (zapfentragende Pfl.) Pinus, Juniperus, Equiſetum.
18) *Amentaceæ*, (mit Käzchen) Salix, Quercus, Betula.
19) *Coadunatæ*, (mit faſerichter Wurzel, runden Stamm und Zweigen, der Bewegung der Sonne gleichförmig gedreht) Liriodendrum, Chryſophyllum.
20) *Tricoccæ*, (dreyknöpfige Pfl.) Euphorbia, Mercurialis.
21) *Therebinthinaceæ*, (harzige Pfl.) Piſtacia, Limonia.
22) *Trihilatæ*, (dreynarbige Pfl.) Staphylæa, Tropæolum.
23) *Papilionaceæ*, (Pfl. mit Schmetterlings-Blumen) Polygala, Geniſta, Anthyllis, Trifolium, Lotus, Medicago, Phaſeolus.
24) *Dumoſæ*, (marckige Pfl.) Viburnum, Sambucus.
25) *Drupaceæ*, (Pfl. mit Steinfrüchten) Amygdalus, Prunus.
26) *Pomaceæ*, (Pfl. mit Kernfrüchten) Pyrus, Meſpilus, Cratægus, Ribes.
27) *Senticoſæ*, (dornige Pfl.) Roſa, Rubus, Fragaria, Tormentilla, Geum.
28) *Multiſiliquæ*, (vielſchotige Pfl.) Pæonia, Aquilegia, Delphinium, Trollius, Caltha, Ranunculus, Anemone.
29) *Rhœadeæ*, (mohnartige Pfl.) Berberis, Papaver, Chelidonium, Fumaria.
30) *Siliquoſæ*, (Pfl. mit Schoten) Lepidium, Thlaſpi, Raphanus, Braſſica, Cheiranthus, Heſperis, Eryſimum,
31) *Putamineæ*, (ſchalige Pfl.) Reſeda.
32) *Columniferæ*, (Pfl. mit Säulenblumen) Malva, Althæa, Tilia, Geranium.
33) *Gruinales*, (Storchſchnäbel) Linum.
34) *Succulentæ*, (ſaftige Pfl.) Sempervivum, Sedum, Saxifraga.
35) *Caryophilleæ*, (nelkenartige Pfl.) Dianthus, Saponaria, Lychnis, Statice, Ceraſtium, Stellaria, Alſine.
36) *Preciæ*, (frühjährige Pfl.) Cyclamen, Primula.
37) *Rotaceæ*, (radförmige Blume) Gentiana, Lyſimachia, Anagallis.
38) *Contortæ*, (Pfl. mit zuſammengedrehter Blume) Vinca, Aſclepias.

39) *Aſpe-*

39) *Aſperifoliæ*, (ſcharfblättrige Pfl.) Symphytum, Borrago, Echium, Pulmonaria, Cynogloſſum, Anchuſa, Myoſotis.
40) *Scabridæ*, (rauhe Pfl.) Urtica, Ulmus, Cannabis, Humulus.
41) *Oleraceæ*, (Pfl. mit geballter Blüte) Spinacia, Atriplex, Beta, Amaranthus.
42) *Vaginales*, (Pfl. mit Blatſcheiden) Rumex, Polygonum, Poterium, Plantago.
43) *Vepreculæ*, (Pfl. mit gefärbten Kelchen) Daphne, Oſyris
44) *Bicornes*, (Pfl. mit 2hörnigen Staubbeuteln) Pyrola, Erica, Arbutus.
45) *Arbuſtivæ*, (dichtbewachſene Pfl.) Citrus, Hypericum, Philadelphus.
46) *Calicanthemæ*, (Pfl. mit trocknen Kapſeln) Lythrum, Epilobium.
47) *Calicifloræ*, (Pfl. mit Staubfäden aus dem Kelche) Oſyris, Viſcum.
48) *Inundatæ*, (Waſſer-Pfl.) Potamogeton, Myriophyllum, Hippuris.
49) *Sarmentaceæ*, (ranckige Pfl.) Aſparagus, Ruſcus, Convallaria.
50) *Coronariæ*, (Pfl. mit Kronen ohne Kelche) Tulipa, Lilium, Hyacinthus, Scilla, Ornithogalum.
51) *Spathaceæ*, (Pfl. mit Blumenſcheiden) Colchicum, Levcojum, Narciſſus, Allium.
52) *Scitamineæ*, (einfädige Pfl.) Curcuma, Coſtus.
53) *Orchideæ*, (Orchis-Arten) Epidendron, Satyrium, Orchis.
54) *Enſatæ*, (ſchwerdförmige Blätter) Tradeſcantia, Iris, Gladiolus.
55) *Tripetaloideæ*, (Pfl. mit 3blättrigen Blumenkronen) Sagittaria, Juncus.
56) *Gramina*, (Gräſer) Phalaris, Avena, Poa, Briza.
57) *Calamariæ*, (rohrartige Pfl.) Carex, Scirpus.
58) *Piperitæ*, (pfefferartige Pfl.) Arum, Piper, Callitriche.
59) *Palmæ*, (Palmen-Gewächſe) Phœnix, Elate.
60) *Filices*, (Farnkräuter) Osmunda, Adianthum.
61) *Muſci*, (Mooſe) Lycopodium, Polytrichum.
62) *Algæ*, (Aftermooſe) Lichen, Fucus.
63) *Fungi*, (Schwämme) Boletus, Phallus.

Ipſa vero etiam *natura* ſyſtema quoddam condere videtur. Dividit enim vegetabilia in 7. *Claſſes* ſ. *familias* cuivis facile perſpicuas.

1) *Fun-*

1) *Fungos*, (Pilze, Schwämme,) quæ ſunt plantæ molles, ſucculentæ, membranoſa epidermide tectæ, fibrillis ſubtilibus præditæ, in partes duas, petiolum & pileum diviſæ, ſine foliis, ſemen eſt pulvis ſubtilis, vix viſibilis, in ſubſtantia diſperſus.
2) *Algas*, (Aftermooſe,) his radix, folium & caudex in unum.
3) *Muſcos*, (Mooſe,) his caudex foliis viridibus tectus; his anthera absque filamento, remota a flore femineo, deſtituto piſtillo, ſemina vero propria tunica cotyledonibusque carent.
4) *Filices*, (Farnkräuter,) radix adeſt ſine caudice, ſed e radice progerminans ſtylus folii eſt loco caudicis, frondes ſunt fructificantes averſo latere, granorum minimorum forma.
5) *Gramina*, (Gräſer,) his folia ſimpliciſſima, longitudinaliter acuminata, fibris parallelis compoſita, culmum articulatum vagina quaſi involventia, calix glumoſus, ſemen unicum.
6) *Palmæ*, (Palmen,) his caudex ſimplex, apice frondoſus, fructificationes in ſpadice cum ſpathà.
7) *Plantæ*, ſunt reliquæ plantæ, quæ priores intrare nequeunt familias, dividuntur hæ, in
   a) *herbaceas* (Kräuter,) quæ quotannis ſupra radicem pereunt, cum radix omnis herbæ perennis infra terram gemmam proferat:
   b) *frutices*, (Sträuche,) his caudex multifidus, ligneus aſcendit ſupra terram absque gemmis.
   c) *ſuffrutices*, (Stauden,) his caudices duri lignoſi, quovis anno defloreſcentes, tempore vernali vero noviter e radice ſe evolventes.
   d) *Arbores*, (Bäume,) e radice unicus ligneus caudex his aſcendit ſupra terram cum gemmis.
1) Ex his ratione temporis *plantae* quædam ſunt *perennes*, quæ per plures annos e radicibus quovis anno producunt truncos, folia, flores, variasque alias partes. e. g. *Lilium*, *Iris*, *Malva*.
2) *Biennes*, quæ radicibus ſecundo anno adhuc floreſcunt & dein cum radice pereunt. *Tragopogon*, *Secale*.
3) *Annuæ*, quæ primo anno floreſcunt, mox eodem anno plane pereunt. *Phaſeolus*, *Piſum*.

§. 16.

§. 16.

Hactenus de methodo naturali. Supereſt, ut ad delineandam *artificialis methodi* originem & uſum nos convertamus. Plantas adhuc notas ad naturalis ſyſtematis claſſes & ordines cum commode omnes referre non poſſent Botanici, de condendis ſyſtematibus artificialibus cogitarunt, in quibus una, pluresve plantæ partes præcipuum diviſionis objectum conſtituebant, & omnes dein plantas ad ejusmodi claſſem ſ. ordinem referebant, quarum partes determinatas iſtiusmodi diviſioni convenire videbant. Plantarum partes cum diverſimode determinari poſſint & dividi, varia quoque nata ſunt ſyſtemata artificialia, aliis ad diverſam ſtructuram fructus, aliis ad florum ſtructuram, aliis denique ad alias plantæ partes in adornando ſyſtemate reſpicientibus. Genera quidem & ſpecies in methodo artificiali plerique requirunt naturalia, teſte *Linnaeo*, ordines vero & claſſes poſſunt eſſe arbitrariæ. Præcipua *ſyſtemata artificialia*, tyroni ſcitu neceſſaria, ſunt 1) TOVRNEFORTII & 2) Illuſtriſſ. LINNÆI.

§. 17.

I) TOVRNEFORTII plantarum *claſſes*, petalis & ſtaminibus florum fundatæ, ſunt XXII. *Ordines*, a fructu deſumti.

1) Herbæ & ſuffrutices flore monopetalo, campaniformi, *Lilium convallium*, *Convolvulus*, *Malva*, *Cucurbita*, *Campanula*, *Belladona*, *Althaea*, *Aſclepias.*

2) Herbæ & ſuffrutices flore monopetalo, infundibuliformi & rotato. *Nicotiana*, *Primula veris*, *Valeriana*, *Veronica*, *Solanum.*

3) Herbæ & ſuffrutices flore monopetalo, anomalo. *Ariſtolochia*, *Euphraſia.*

4) Herbæ & ſuffrutices flore monopetalo, labiato. *Lamium*, *Marrubium*, *Origanum*, *Teucrium.*

5) Herbæ & ſuffrutices flore polypetalo, cruciformi, *Burſa paſtoris*, *Levcojum*, *Raphanus*, *Chelidonium*, *Paris.*

6) Herbæ & ſuffrutices flore roſaceo, *Papaver*, *Myoſotis*, *Geum*, *Sedum.*

7) Her-

7) Herbæ & ſuffrutices, flore polypetalo, roſaceo, umbellato, *Daucus*, *Chærophyllum*, *Coriandrum*, *Caucalis*.
8) Herbæ & ſuffrutices, flore polypetalo, caryophyllæo, *Linum*, *Statice*.
9) Herbæ & ſuffrutices flore liliaceo, *Colchicum*, *Iris*, *Lilium*, *Tulipa*.
10) Herbæ & ſuffrutices flore polypetalo papilionaceo, *Lathyrus*, *Vicia*, *Lotus*, *Melilotus*, *Medicago*, *Phaſeolus*.
11) Herbæ & ſuffrutices, flore polypetalo, anomalo. *Balſamina*, *Viola*, *Reſeda*, *Delphinium*, *Aquilegia*.
12) Herbæ & ſuffrutices, flore floſculoſo, *Cardnus*, *Gnaphalium*, *Scabioſa*.
13) Herbæ & ſuffrutices flore ſemifloſculoſo, *Hieracium*, *Cichorium*.
14) Herbæ & ſuffrutices, flore radiato, *Tuſſilago*, *Millefolium*, *Carlina*.
15) Herbæ & ſuffrutices, flore apetalo ſ. ſtamineo, *Aſarum*, *Atriplex*, *Avena*, *Urtica*, *Cannabis*.
16) Herbæ & ſuffrutices, qui floribus carent, & ſemine donantur, *Aſplenium*, *Osmunda*.
17) Herbæ & ſuffrutices, quorum flores & fructus vulgo deſiderantur, *Muſcus*, *Fucus*.
18) Arbores & frutices flore apetalo, *Fraxinus*.
19) Arbores & frutices flore amentaceo, *Quercus*, *Fagus*, *Alnus*, *Betula*.
20) Arbores & frutices flore monopetalo, *Erica*, *Acacia*, *Viburnum*.
21) Arbores & frutices, flore roſaceo, *Berberis*, *Rubus*, *Prunus*, *Ceraſus*, *Pyrus*.
22) Arbores & frutices flore papilionaceo, *Geniſta*, *Cytiſus*.

§. 18.

11) Illuſtr. LINNÆVS in ſyſtemate ſuo artificiali vegetabilia omnia ad *Claſſes*, in ſexu plantarum fundatas, & ad *ordines*, a numero ſtyli ſ. ſtigmatis deſumtos adornare allaboravit.

Cla-

§. 18.

CLAVIS SYSTEMATIS SEXUALIS ILL. LINNÆI, AD CLASSES RESPICIENS

NUPTIÆ PLANTARUM. Actus generationis incolarum Regni vegetabilis.

Floreſcentia.

I. *PUBLICÆ.* Nuptiæ, omnibus manifeſtæ, aperte celebrantur.

Flores unicuique viſibiles. Die Blumen der Pflanzen einem jeden ſichtbar.

1. MONOCLINIA. Mariti & uxores uno eodemque thalamo gaudent.

Flores omnes hermaphroditi ſunt, & ſtamina cum piſtillis in eodem flore.

Zwitter mit Staubfäden und Stempeln in einer Blume.

α. DIFFINITAS. Mariti inter ſe non cognati.

Stamina nulla ſua parte connata inter ſe ſunt.

Die Staubfäden ſind mit keinem ihrer Theile unter ſich verwachſen.

a. INDIFFERENTISMUS. Mariti nullam ſubordinationem inter ſe invicem ſervant.

Stamina nullam determinatam proportionem longitudinis inter ſe invicem habent.

Haben kein genaues Verhältnis der Länge unter ſich.

1. MONANDRIA. Einmännige.
2. DIANDRIA. zwey — —
3. TRIANDRIA. drey — —
4. TETRANDRIA. vier — —
5. PENTANDRIA. fünf — —
6. HEXANDRIA. ſechs — —
7. HEPTANDRIA. Siebenmännige.
8. OCTANDRIA. acht — —
9. ENNEANDRIA. neun — —
10. DECANDRIA. zehn — —
11. DODECANDRIA. zwölf -
12. ICOSANDRIA. zwanzig -
13. POLYANDRIA. vielmännige.

b. SUBORDINATIO. Mariti certi reliquis præferuntur.

Stamina duo ſemper reliquis breviora ſunt. Zwey Staubfäden ſind kürzer als die übrigen.

14. DIDYNAMIA. zweymächtige.
15. TETRADYNAMIA. viermächtige.

β. AFFINITAS. Mariti propinqui & cognati ſunt.

Stamina cohærent inter ſe invicem aliqua ſua parte vel cum piſtillo.

Und mit einem Theil unter ſich, oder mit dem Stempel verwachſen.

16. MONADELPHIA. Einbrüdrige.
17. DIADELPHIA. zwey — —
18. POLYADELPHIA. viel — —
19. SYNGENESIA. Vereinigte.
20. GYNANDRIA. Weibermännige.

2. DICLINIA (a δὶς bis & κλίνη thalamus, duplex thalamus.)

Mariti & Feminæ diſtinctis thalamis gaudent.

Flores maſculi & feminei in eadem ſpecie. Männliche und Weibliche in einer Art.

21. MONOECIA. Einhäuſige.
22. DIOECIA. zwey — —
23. POLYGAMIA. Vielehige.

II. CLANDESTINÆ. Nuptiæ clam inſtituuntur.

Flores oculis noſtris nudis vix conſpiciuntur. Nicht kenntlich.

24. CRYPTOGAMIA. Verborgene Ehe.

CLASSIVM CHARACTERES.

I. MONANDRIA. a μόνος unicus; & ἀνὴρ maritus. Maritus unicus in matrimonio.
Stamen unicum in flore hermaphrodito. Ein Staubfaden in einer Zwitterblume.

II. DIANDRIA. Mariti duo in eodem conjugio.
Stamina duo in flore hermaphrodito. Zwey Staubfäden in einer Zwitterblume.

III. TRIANDRIA. Mariti tres in eodem conjugio.
Stamina tria in flore hermaphrodito. Drey Staubfäden in einer Zwitterblume.

IV. TETRANDRIA. Mariti quatuor in eodem conjugio.
Stamina quatuor in eodem flore cum fructu. Vier Staubfäden in einer Zwitterblume.
(Si Stamina 2 proxima breviora sunt, refertur ad Cl. 14.)

V. PENTANDRIA. Mariti quinque in eodem conjugio.
Stamina quinque in flore hermaphrodito. Fünf Staubfäden in einer Zwitterblume.

VI. HEXANDRIA. Mariti sex in eodem conjugio.
Stamina sex in flore hermaphrodito. Sechs Staubfäden in einer Zwitterblume.
(Si ex his Stamina 2 oppositа breviora, pertinet ad Cl. 15.)

VII. HEPTANDRIA. Mariti septem in eodem conjugio.
Stamina septem in flore eodem cum pistillo. Sieben Staubfäden in einer Zwitterblume.

VIII. OCTANDRIA. Mariti octo in eodem thalamo cum femina.
Stamina octo in eodem flore cum pistillo. Acht Staubfäden in einer Zwitterblume.

IX. ENNEANDRIA. Mariti novem in eodem thalamo cum femina.
Stamina novem in flore hermaphrodito. Neun Staubfäden in einer Zwitterblume.

X. DECANDRIA. Mariti decem in eodem conjugio.
Stamina decem in flore hermaphrodito. Zehn Staubfäden in einer Zwitterblume.

XI. DODECANDRIA. Mariti duodecim in eodem conjugio.
Stamina duodecim ad novendecim in flore hermaphrodito. 12 bis 9zehn Staubf. in einer Zwitterbl.

XII. ICOSANDRIA. ab εἴκοσι viginti & ἀνὴρ. Mariti viginti communiter, sæpe plures.
Stamina calici (non receptaculo) insident flori

Hermaphrodito. mehr als Zwölf Staubfäden, welche in den Kelch, nicht in den Boden einer Zwitterblume eingefügt ſind.

XIII. POLYANDRIA. a πολύς & ἀνήρ. Mariti viginti & ultra in eodem cum femina thalamo.
Stamina receptaculo inſerta a 20 ad 1000 in eodem, cum piſtillo flore, mehr als Zwölf Staubfäden, die in den Boden einer Zwitterblume eingefügt ſind.

XIV. DIDYNAMIA. a δὶς bis, & δύναμις potentia. Mariti quatuor, quorum 2 longiores, & 2 breviores.
Stamina quatuor: quorum 2 proxima longiora ſunt. Zwey Staubfäden ſind länger.

XV. TETRADYNAMIA. Mariti ſex, quorum 4 longiores in flore hermaphrodito.
Stamina ſex: quorum 4 longiora, 2 autem oppoſita breviora. Vier Staubfäden ſind länger und zwey kürzer.

XVI. MONADELPHIA. a μόνος unicus, & ἀδελφὸς frater. Mariti, ut fratres, ex una baſi proveniunt.
Stamina filamentis in unum corpus coalita ſunt. Die Träger der Staubbeutel ſind in 1 Körper zuſammengewachſen.

XVII. DIADELPHIA. Mariti e duplici baſi, tamquam e duplici matre, oriuntur.
Stamina filamentis in duo corpora connata ſunt. Die Träger der Staubbeutel ſind in zwey Körper zuſammengewachſen.

XVIII. POLYADELPHIA. Mariti ex pluribus, quam duabus, matribus orti ſunt.
Stamina filamentis in tria, vel plura, corpora coalita. Die Träger der Staubbeutel ſind in 3. oder mehr Körper zuſammengewachſen.

XIX. SYNGENESIA. a σύν ſimul, & γένεσις generatio. Mariti genitalibus fœdus conſtituerunt.
Stamina antheris (raro filamentis) in cylindrum coalita. Die Staubbeutel ſind in einer Walze zuſammengewachſen.

XX. GYNANDRIA. a γυνὴ femina & ἀνὴρ maritus. Mariti cum feminis monſtroſe connati.
Stamina piſtillis (non receptaculo) inſident. Die Staubbeutel ſizen auf dem Stempel, nicht auf dem Boden.

XXI. MONOECIA. a μόνος unicus, & οἰκία domus. Mares habitant cum feminis in eadem domo, ſed

ſed diverſo thalamo. Flores maſculi & feminei in eadem planta ſunt. Männl. und Weibl. auf einer Pflanze.

XXII. DIOECIA. Mares & feminæ habitant in diverſis thalamis & domiciliis.
Flores maſculi in diverſa planta a femineis pronaſcuntur. Männl. und Weibl. auf verſchiedenen Pflanzen.

XXIII. POLYGAMIA. a πολὺς, & γάμος nuptiæ. Mariti cum uxoribus & innuptis cohabitant in diſtinctis thalamis. Flores hermaphroditi & maſculi aut feminei in eadem ſpecie. Zwitter, männliche und weibliche Blumen in einer Art.

XXIV. CRYPTOGAMIA. a κρυπτὸς occultus, γάμος nuptiæ. Nuptiæ clam celebrantur.
Flores intra fructum vel ſingulari modo occultati. Die Theile der Fructification laſſen ſich nicht unterſcheiden.

ORDINES cujuscunque Claſſis.

Claſſ. I. MONANDRIA.
Ord. 1. Monogynia, einweibige. 2. Digynia, zweyw.

Cl. II. DIANDRIA.
Ord. 1. Monogynia, einweib. 2. Digynia, zweyweib. 3. Trigynia, dreyweibige.

Cl. III. TRIANDRIA.
Ord. 1. Monogynia, einweibige. 2. Digynia, 2weib. 3. Trigynia, 3weibige.

Cl. IV. TETRANDRIA.
Ord. 1. Monogynia, einweibige. 2. Digynia, 2weib. 3. Tetragynia, 4weibige.

Cl. V. PENTANDRIA.
Ord. 1. Monogynia, einweibige. 2. Digynia, 2weib. 3. Trigynia, 3weibige. 4. Tetragynia. 4weibige. 5. Pentagynia, 5weibige. 6. Polygynia, vielweib.

Cl. VI. HEXANDRIA.
Ord. 1. Monogynia, einweibige. 2. Digynia, 2weib. 3. Trigynia, 3weibige. 4. Tetragynia, 4weibige. 5. Polygynia, vielweibige.

Cl. VII. HEPTANDRIA.
Ord. 1. Monogynia, einweibige.

Cl. VIII. OCTANDRIA.
Ord. 1. Monogynia, einweibige. 2. Digynia, 2weib. 3. Trigynia, 3weibige. 4. Tetragynia, 4weib. 5. Polygynia, vielweibige.

Claſſ. IX. ENNEANDRIA.
Ord. 1. Monogynia, einweibige. 2. Trigynia, 3weib.
3. Hexagynia, 6weibige.
Cl. X. DECANDRIA.
Ord. 1. Monogynia, einweibige. 2. Digynia, 2weib.
3. Trygynia, 3weibige. 4. Pentagynia, 5weib.
5. Decagynia, 10weibige.
Cl. XI. DODECANDRIA.
Ord. 1. Monogynia, einweibige. 2. Digynia, 2weib.
3. Polygynia, vielweibige.
Cl. XII. ICOSANDRIA.
Ord. 1. Monogynia, einweibige. 2. Digynia, 2weib.
3. Trygynia, 3weibige. 4. Tetragynia, 4weib.
5. Pentagynia, 5weibige. 6. Polygynia, vielw.
Cl. XIII. POLYANDRIA.
Ord. 1. Monogynia, einweibige. 2. Digynia, 2weib.
3. Trigynia, 3weibige. 4. Tetragynia, 4weib.
5. Pentagynia, 5weibige. 6. Hexagynia, 6weib.
7. Polygynia, vielweib.
Cl. XIV. DIDYNAMIA.
Ord. 1. Gymnoſpermia, mit nackenden Saamen.
2. Angioſpermia, mit bedeckten --- --- ---
3. Polypetala, vielblättrig.
Cl. XV. TETRADYNAMIA.
Ord. 1. Siliculoſa, mit Schötgen.
2. Siliquoſa, mit Schooten.
Cl. XVI. MONADELPHIA.
Ord. 1. Pentandria, fünfmännige. 2. Decandria, 10.m.
3. Polyandria, vielmännige.
Cl. XVII. DIADELPHIA.
Ord. 1. Hexandria, 6männige. 2. Octandria, 8männ.
3. Decandria, 10männige.
Cl. XVIII. POLYADELPHIA.
Ord. 1. Pentandria, 5männige. 2. Icoſandria, 20männ.
3. Polyandria, vielmännige.
Cl. XIX. SYNGENESIA.
Ord. 1. Polygamia æqualis, gleiche Vielehe.
2. --- --- ſuperflua, übrige --- ---
3. --- --- fruſtranea, vergebliche ---
4. --- --- neceſſaria, nöthige --- ---
5. --- --- ſegregata, getrennte ---
6. --- --- monogamia, einfache ---
Cl. XX. GYNANDRIA.
Ord. 1. Diandria, 2männige. 2. Triandria, 3männige.
3. Te-

3. Tetrandria, 4männige. 4. Pentandria, 5männ.
5. Hexandria, 6männige. 6. Decandria, 10männ.
7. Polyandria, vielmännige.

Claſſ. XXI. MONOECIA.

Ord. 1. Monandria, einmännige. 2. Triandria, 3männ.
3. Tetrandria, 4- --- 4. Pentandria, 5----
5. Hexandria, 6-- --- 6. Polyandria, viel--
7. Monadelphia, einbrüdrige.
8. Polyadelphia, vielbrüdrige.
9. Syngeneſia, vereinigte.

Cl. XXII. DIOECIA.

Ord. 1. Diandria, 2männige. 2. Triandria, 3männige.
3. Tetrandria, 4-- -- 4. Pentandria, 5--- ---
5. Hexandria, 6-- -- 6. Octandria, 8-- -- --
7. Enneandria, 9 -- -- 8. Decandria, 10-- -- --
9. Icoſandria, 20- -- 10. Polyandria, viel-- --
11. Monadelphia, einbrüdrige.
12. Syngeneſia, vereinigte.
13. Gynandria, weibermännige.

Cl. XXIII. POLYGAMIA.

Ord. 1. Monœcia, einhäuſige. 2. Dicœcia, zweyhäuſ.
3. Tricœcia, 3häuſige.

Cl. XXIV. CRYPTOGAMIA.

Ord. 1. Plantæ. 2. Filices. 3. Muſci.
4. Algæ. 5. Fungi. 6. Lithophyta.

ORDINES a Feminis ſeu Piſtillis, ut claſſes a Maribus ſeu Staminibus, deſumuntur; in Claſſe Syngeneſiæ autem a cæteris differunt Ordines. e. gr.

MONOGYNIA, einweibige, Digynia, 2weib. Trigynia, 3weib. &c. a γυνὴ femina, præpoſitis numeris græcis μόνος, δὶς, τρεῖς, τέσσαρες. &c.

i. e. *Piſtillum* 1. 2. 3. 4. *&c. Numerus hic piſtilli deſumitur a Baſi ſtyli;* (griffel) *ſi ſtylus autem deficiat, a numero Stigmatum* (narben) *calculus fit.*

POLYGAMIA ÆQVALIS conſtat multis nuptiis, conjugia pura contrahentibus.

i. e. *multis floſculis, ſtaminibus & piſtillis inſtructis. Flores ejusmodi maximam partem vulgo* Floſculoſi *dicuntur.*

POLYGAMIA SPURIA, ubi thalami vere nuptorum diſcum occupant, & ambitum cingunt thalami meretricum maritis deſtitutarum, ut a maritis uxoratis fœcundentur.

i. e; *ubi floſculi hermaphroditi diſcum occupant, & marginem cingunt floſculi feminei, ſtaminibus deſtituti, idque triplici modo:*

(*a*) SUPERFLUA dicitur, cum feminæ maritatæ fertiles ſunt, & familiam propagare queunt; adeo ut meretricum auxilium videatur ſuperfluum.

i. e. *cum flores diſci hermaphroditi ſtigmate inſtruuntur & ſemina proferunt; flores quoque feminei radium conſtituentes ſimiliter ſemina ferunt.*

(*b*) FRUSTRANEA dicitur, cum feminæ maritatæ fertiles ſunt & ſpeciem propagare queunt; Meretrices autem ob defectum vulvæ, veluti caſtratæ, imprægnari nequeunt.

i. e. *cum flores diſci hermaphroditi ſtigmate inſtruuntur & ſemina proferunt; floſculi vero radium conſtituentes, quum ſtigmate careant, ſemina proferre nequeunt.*

(*c*) NECESSARIA dicitur, cum feminæ maritatæ, ob genitalium labem & vulvæ defectum ſteriles, familiam propagare nequeunt; meretricibus autem a maritis feminarum fœcundatis, uxorum locum ſupplentibus, ſobolemque læte propagantibus.

i. e. *cum flores hermaphroditi ob defectum ſtigmatis piſtilli, ſemina perficere nequeunt; floribus autem femineis in radio ſemina perfecta proferentibus.*

§. 19.

(*) *Figuras* claſſium ſyſtematis Linnæi Tabula I. addidi, ut via tanto facilior redderetur iis, qui idem adoptare velint: quemadmodum olim ille ſuo ſyſtemati & generibus plantarum easdem præfixit. Figura 24. repræſentat *Ficus* ſtructuram, ſ. ſuperficiem internam floſculis innumeris ornatam, quam recentior & accuratior obſervatio ad Claſſem 23*tiam* amandavit: quod ii, licet in *Ficu carica* (vulgari) & aliis ſpeciebus calici carnoſo, orificio, ad umbilicum ſquamis munito, vix patulo incluſi, non illico in conſpectum prodeant, nihilofecius calice diſſecto viſibiles ſint: quod in *Ficu indica*, & aliis idem orificium adeo amplum exiſtat, ut digitum admittat. (Linn. amœn. ac. T. I. Diſſ. II. §. VI.)

§. 19.

Enarratis hactenus botanices fatis, tranſimus jam ad plantas, earumque *partes externas* indicandas ac terminis congruis deſcribendas.

De *partibus internis*; de *organiſatione* vitæ plantarum pauca quædam recenſere ex Ill. Linnæi Syſt. Nat. T. II. non videtur a re noſtra alienum eſſe.

VEGETATIO fit radiculis ſugentibus tincturam aquoſam Humi, quæ calore quotidie addito pellitur per *Corticem*, unde nutritio Plantæ, exhalante ſuperfluo, deponente interiore pariete *Librum*, quotannis ſecedentem in ſubſtantiam *Ligneam*, ſuſtentaturam Caudicem adſcendentem, intra quam *Medulla* multiplicativa, baſi deliqueſcente, apice infinita, quam concipio faſciculum fibrarum iſoſcelem accreſcentem, in quo vis fortior rumpit extimas fibras, extrorſum divergentes penetrantes in corticem, terminatas gemma ſimiliter multiplicativa; ex obſtaculo corticis oritur *Folium* expanſum, aërem reſpirans, ſolem reſpiciens, motibus venti exercitandum, nunquam renaſciturum; ubi vero vis minus pellens, medullares fibræ convergunt, protrudendo aperiunt ſubſtantiam Corticis in *Calicem*, Libri in *Corollam*, Ligni in *Stamina*, Medullæ in *Piſtillum*, terminante vegetationem nova vita, collectis filis in *Semina* ultima Medullæ.

FLOS, *Planta interior* nuda, exuta Larua Herbæ mera metamorphoſi, inſtar Inſecti alligati volitantis, coleoptrato Calice, alaribus Corollis, conſtat ſolis viſcerum genitalibus Staminibus & Piſtillis, quorum germina adoleſcant in fœcundum ovarii Pericarpium gravidum ovis ſeminum.

FLORESCENTIA ſiſtit nuptias Vegetabilium generantes, dum *Pollen* veſiculare inſperſum rorido *Stigmati*, rumpitur ab humidi contactu, efflatque elaterem, abſorbendum ad Semina, novam vitam reſuſcitando.

GERMINATIO fit diſperſis Seminibus, abſorbentibus aquam, ruptis membranis a bibulis tumentibusque cotyledonibus; dum hæ lactent *Corculum*, usquedum fœtus *Roſtellum* radiculas exſerat, quo erigatur *Plumula* accreſcens in herbam anni, terminatam gemma, intra quam ſecundi anni cum gemmis tertii.

NATVRA creata, continuato Semine, ope elementorum, modificat Terras in *Vegetabilia*; vegetabilia in *Animalia*, nec contra; utraque reſolvit iterum in *Terras*, circulo perenni aucto.

VITA Medullaris, fungoſa, adſcendens, multiplicatione, diviſibilitate terminoque infinita, in creatione accenſa, incarcerata intra *Corpus* Corticale, nutritivum, deſcendens, terrenis adhærens, a primordio ſuo occulte feſtinat lenteque verſus minimam reſiſtentiam ad ſummum ſuum exitum; quo vero hoc ſe coarctans fragilius, eo clauſtra ſua citius reſerat metamorphoſin ſubituræ, quæque evaſura ſeſe cum corpore copulat, ut in novas diſpergenda vitas circulus perennet.

Plantarum partes *externæ* ſunt,

1. Radix. 2. Truncus. 3. Fulcra. 4. Folia.
5. Flos. 6. Fructus. 7. Gemmæ.

Quævis pars diverſum habet *uſum*.

a) Quatuor priores ſunt plantarum *partes vegetativæ*.

b) Flos & fructus ſunt *partes fructificationis*.

c) Gemmæ *continuationi partium* inſerviunt.

Singulæ hæ partes externæ, aliæ ſub aliis ſchematibus, in plantis deprehenduntur. Ut igitur verbis exprimi & cum aliis communicari poſſet hæc ipſa diverſitas partium externarum, termini requirebantur certi, quos ſequens tabula exhibet.

DE-

TERMINI BOTANICI

EORVMQVE

TRANSLATIO GERMANICA

DESCRIPTIO

ILLVSTRATIO PER EXEMPLA

CVM INDICE

LATINO ET GERMANICO.

DELINEATIO PLANTÆ.

I. THEORIA.

GENUS Nomen *ſelectiſſimum.*
Character naturalis, eſſentialis, artificialis.
Claſſis Ordoque *Syſtematis præſtantiſſimi.*
Ordo naturalis *demonſtrandus.*
SPECIES. Nomen triviale.
Differentia ſpecifica *demonſtranda: certiſſima, breviſſima.*
Synonyma ex deſcriptione *ſ.* figura *ſelecta;* vernacula.
CRITICA. Etymologia nominis *generici, ſpecifici.*
Inventor *cum* tempore.
Eruditio hiſtorica, critica, antiqua.

II. DESCRIPTIO.

RADIX *duratione* annua, biennis, perennis.
figura a. fibroſa, ramoſa, fuſiformis, præmorſa.
b. repens, articulata, dentata, perpendicularis, horizontalis.
c. globoſa, tuberoſa, faſcicularis, palmata.
d. bulboſa, granulata.
TRUNCUS *ſpecie* Caulis, Culmus, Scapus, Stipes.
duratione herbaceus, ſuffruticoſus, fruticoſus, arboreus.
ſolidus, inanis, fiſtuloſus,
menſura a. linearis, unguicularis, pollicaris, palmaris, ſpithameus, dodrantalis.
pedalis, orgyalis.
(proportio *ad folia reliquasque partes.*)
b. craſſities *ex ſimili notiſſimo.*
directione a. erectus, ſtrictus, rigidus, laxus, obliquus, adſcendens, declinatus, incurvatus, nutans, diffuſus, procumbens, ſtoloniferus.
b. ſarmentoſus, radicans, repens.
c. ge-

c. geniculatus, flexuoſus, ſcandens, volubilis: *ſiniſtrorſum, dextrorſum.*

figura a. teres, ſemiteres, compreſſus, anceps, 3-10 angulatus, acutangulus, obtuſangulus.

b. 3-6 gonus, 3-5 queter.

veſtitu nudus, aphyllus, foliatus, vaginatus, ſquamoſus, imbricatus.

ſuperficie a. ſuberoſus, rimoſus, tunicatus,

b. lævis, ſtriatus, ſulcatus,

c. glaber, ſcaber, muricatus, tomentoſus, villoſus, hiſpidus hirtus, piloſus, aculeatus, ſpinoſus, urens.

d. ſtipulatus, membranatus, bulbiferus.

compoſitione a. enodis, ſimpliciſſimus, ſimplex, integer.

b. articulatus, prolifer, dichotomus, brachiatus.

c. ſubramoſus, ramoſus, ramoſiſſimus.

d. virgatus, paniculatus, faſtigiatus.

e. patens, divaricatus.

RAMIS a. ſtructura Caulis, Frondis.

b. alternis, diſtichis, ſparſis. confertis, oppoſitis, verticillatis.

c. erectis, coarctatis, divergentibus, divaricatis, deflexis, reflexis, retroflexis, fulcratis.

d. altitud. caulis, longis, brevibus, patentibus.

FOLIA

determinatione *loco* radicalia, caulina, ramea, axillaria, floralia, ſeminalia.

numero unicum, duo, tria, pauca, plurima.

ſitu a. alterna, diſticha, bifaria, ſparſa, conferta, imbricata, faſciculata, bina, terna, quaterna, quina, confluentia, approximata, remota.

b. oppoſita, decuſſata, ſtellata, verticillata,

dire-

directione a. erecta, ſtricta, rigida, adpreſſa, patentia, horizont. aſſurgentia, inflexa,
reclinata, recurvata, revoluta, dependentia.
b. obliqua, adverſa, verticalia, reſupinata.
c. ſubmerſa, natantia, radicantia.
inſertione a. petiolata, peltata.
b. ſeſſilia, adnata, connata, decurrentia, amplexicaulia, perfoliata, connata, coadunata, vaginantia.
ſtructura *figura* a. ſubrotunda, orbiculata, ovata, ovalia.
b. oblonga, parabolica, cuneiformia, ſpatulata.
c. rotundata, lanceolata, ſubulata, linearia, aceroſa.
angulis integra, 3-5angularia, deltoidea, rhombea, trapeziformia.
ſinubus a. cordata, reniformia, lunata, ſagittata, haſtata, runcinata, panduriformia.
b. fiſſa, 2-5loba, 2-5fida, 3-5partita, palmata, lyrata, pinnatifida, ſinuata,
laciniata, ſquarroſa.
margine a. integerrima, crenata, ſerrata, ciliata,
dentata, ſpinoſa, cartilaginea.
b. repanda, lacera, eroſa, dædalea.
apice a. obtuſa, emarginata, retuſa, præmorſa, truncata.
b. acuta, acuminata, cuſpidata, mucronata, cirroſa.

ſuper-

Ob, loco *obverſe*, e. gr. obcordata, obovata, &c.
Sub, loco *fere*, e. gr. ſubcordata, ſubovata, &c.
Coadunantur ſæpe figuræ ejusdem diviſionis, non vero diverſæ, bene lanceolato-ovata, ovato-lanceolata &c.
male lanceolato-acuta, ovato-mucronata.

ſuperficie a. pagina : ſuperiore, inferiore, nuda, glabra, nitida, lucida, colorata.
b. nervoſa, trinervia, &c. triplinervia, enervia, lineata, ſtriata, ſulcata,
c. venoſa, rugoſa, bullata, lacunoſa, avenia.
d. punctata, papilloſa, papuloſa, viſcida.
e. villoſa, tomentoſa, ſericea, lanata, barbata, piloſa, ſcabra, hiſpida, aculeata, ſtrigoſa.

expanſione, plana, canaliculata, concava, convexa, cucullata, plicata, undata, criſpa.

ſubſtantia a. *membranacea*, ſcarioſa, gibba, teretia, depreſſa, compreſſa, carinata.
b. compacta, tubuloſa, pulpoſa, carnoſa.
c. triquetra, ancipitia, linguiata, enſiformia. ſubulata, acinaciformia, dolabriformia.

menſura, breviſſima, longiſſima, *reſpectu ad caulem*, *articuloſve*.

duratione, decidua, caduca, perſiſtentia, perennia, ſempervirentia.

Compoſitione *Compoſita* articulata, conjugata.
Digitata, binata, ternata, quinata.
Pedata.
Pinnata, bijuga, trijuga, quadrijuga, &c. *cum* impari, abrupte, cirrhoſa.
Foliolis oppoſitis, alternis, interruptis, decurſivis.

Decompoſita, *Supradecompoſita*, bigemina, biternata, bipinnata, tergemina, triternata, tripinnata.

FUL-

FULCRA: Petiolus, Stipulæ, Cirrhus, Pubes, Arma, Bractea, Pedunculus.

PETIOLVS *figura* linearis, alatus, clavatus.
membranaceus, teres, ſemiteres, triqueter, canaliculatus.
magnit. breviſſimus, brevis, mediocris, longus, longiſſimus.
inſert. inſertus, adnatus, decurrens, amplexicaulis, vaginans, appendiculatus.
direct. erectus, patens, aſſurgens, recurvatus.
ſuperf. glaber, aculeatus, nudus.
articulatus, ſpineſcens.

STIPVLÆ a. geminæ, ſolitariæ, nullæ.
b. laterales, extrafoliac. intrafoliac. oppoſitifoliæ.
c. caducæ, deciduæ, perſiſtentes, ſpineſcentes.
d. ſeſſiles, adnatæ, decurrentes, vaginantes.
e. ſubulatæ, lanceolatæ, ſagittatæ, lunatæ.
f. erectæ, patentes, reflexæ.
g. integerrimæ, ſerratæ, ciliatæ, dentatæ, fiſſæ.
h. breviſſimæ, mediocres, longæ.

CIRRHVS a. axillaris, foliaris, petiolaris, pedunculares.
b. ſimplex, trifidus, multifidus.
c. convolutus, revolutus.

PVBES a. pili, lana, barba, tomentum, ſtrigæ.
b. ſetæ, ſimplices, hamoſæ, ramoſæ, plumatæ, ſtellatæ.
c. hami, glochides.
d. Glandulæ, Utriculi.
foliaceæ, petiolares, pedunculares, ſtipulares.
e. viſcoſitas, glutinoſitas.

ARMA a. *Aculei* recti, incurvi, recurvi.
b. *Furcae* bifidæ, trifidæ.
c. *Spinae* terminales, axillares, calycinæ, foliares, ſimplices, diviſæ.
d. *Stimuli* pungentes, urentes.

BRACTEÆ a. coloratæ, caducæ, deciduæ, perſiſtentes.
b. una, duæ, plures. c. *Coma.*
d. Foliorum *caetera addenda.*

PEDVNCVLVS partialis (a-e), communis, Pedicellus.
a. *loco* radicalis, caulinus, rameus, petiolaris, cirrhiferus, terminalis, axillaris, oppoſitifol. lateriflorus, interfoliaceus, ſuprafol.
b. *ſitu* alternus, ſparſus, oppoſitus, verticillatus.
c. *numero* ſolitarius, geminatus, umbellula *ſeſſilis.*
d. *directione* adpreſſus, erectus, patens, cernuus, reſupinatus, declinatus, nutans, flaccidus, adſcendens. pendulus, ſtrictus, flexuoſus, retrofractus.
e. *menſura* brevis, breviſſimus, longus, longiſſimus.
f. *multiflorus*, uniflorus, biflorus, triflorus, &c. multiflorus.
g. *ſtructura* teres, triqueter, tetragonus, filiformis, attenuatus, clavatus, incraſſatus, nudus, ſquamoſus, foliatus, bracteatus, geniculatus, articulatus.

INFLORESCENTIA.

Flores terminales, laterales, ſparſi, ſeſſiles, pedunculati, unicus, ſolitarius, terni &c. copioſi, erecti, cernui, nutantes, verticales, horizontales.

a. VERTICILLVS a. ſeſſilis, pedunculatus.
b. nudus, involucratus, bracteatus. c. confertus, diſtans.

b. CAPITVLVM a. ſubrotundum, globoſum, dimidiatum.
b. folioſum, nudum. Faſciculus.

c. SPICA a. ſimplex, compoſ. ſpicillis, glomerata.
b. ova-

b. ovata, ventricoſa, cylind. interrupta.
c. imbricata, articulata, ramoſa linearis, ciliata, foliacea, comoſa.

d. CORYMBVS ſimplex, compoſitus.
e. THYRSVS nudus, foliatus.
f. RACEMVS a. ſimplex, compoſitus.
b. unilateralis, pedatus, conjugatus.
c. erectus, laxus, dependens.
d. nudus, foliatus.
g. PANICVLA Trunci ſtructura.

FRUCTIFICATIO ex *numero*, *figura*, *proportione*, *ſitu*, partium.

Simplex. Compoſita ex Floſculis.

CALYX. *Perianthium* fructificationis, floris, fructus;
Proprium a. monophyllum, polyphyllum.
b. 2-5fidum, 2-5partitum integrum.
c. tubuloſum, patens, reflexum, inflatum.
d. abbreviatum, longum, *longitud. tubi.*
e. obtuſum, acutum, ſpinoſum, aculeatum.
Commune imbricatum, ſquarroſum, calyculatum.
Involucrum a. univerſale, partiale, proprium.
b. monophyllum, polyphyllum.
Gluma a. uniflora, 2-multiflora.
b. univalvis, bivalvis, multivalvis.
c. colorata, glabra, hiſpida.
Ariſta a. mutica, terminalis, dorſalis.
b. recta, tortilis, geniculata, recurvata.
Amentum ſquamoſum, nudum.
Spatha univalvis, bivalvis, dimidiata.
Calyptra recta, obliqua.
Volva approximata, remotiſſima.

COROLLA *Petali* a. Tubus ſ. Ungues, Limbus ſ. Laminæ.
b. monopetala, 2-6-polypetala.

c. regularis, irregularis, inæqualis.
d. globoſa, campanul. infundibuliform. rotata, hypocrateriformis.
ringens, perſonata: labio ſuperiore & inferiore.
cruciata, concava, patens.
Papilionacea: vexillo, alis, carina.
e. Compoſita: ligulata, tubuloſa, radiata. f. Color.

Nectarium proprium, petalinum.

STAMINA *Filamenta* numero, figura, inſertione: æqualia, inæqualia, connata.
Antherae diſtinctæ, connatæ, laterales.
loculi, apertura.
Pollen figura.

PISTILLVM *Germen* ſuperum, inferum.
Stylus numero, proportione, diviſione, figura.
Stigma numero, figura.

PERICARPIVM *Capſula*: valvulæ, loculamenta, diſſepimenta. bicapſularis &c. bilocularis &c. tricocca.
Siliqua figura, compreſſa, toruloſa, articulata.
Diſſepimentum parallelum, transverſum.
Legumen figura, articulata, 1-2 locularis.
Folliculus univalvis, bivalvis, figura.
Drupa ſucculenta, ſicca
Pomum figura, loculamenta.
Bacca monoſperma &c. nidulantia ſemina.
Strobilus figura totius, ſquamarum.

SEMEN numero, figura, loculis, ſuperficie, conſiſtentia. Hilum, Corculum.

Corona: Pappus: ſtipitatus, capillaris, plumoſus, cauda, hamus, calyculus.
Nux unilocularis, bilocularis &c.
Arillus cartilagineus, ſucculentus.

RECEPTACVLVM fructificationis, floris, fructus.
Commune a. nudum, punctatum, piloſum, paleaceum.
b. planum, convexum, conicum, ſubulatum.

Com-

Compoſitus flos.
Aggregatus flos.
Umbella a. ſimplex, compoſita ex *Univerſali* *Partialique*, prolifera.
b. concava, faſtigiata, convexa.
c. erecta, nutans.
Cyma nuda, bracteata.
Spadix a. uniflorus, multiflorus.
b. ſimplex, ramoſus.

III. HABITUS.

GEMMATIO *Bulbus* ſolidus, tunicatus, ſquamatus, caulinus.
origine petiolaris, ſtipularis, corticalis.
contento foliaris, floralis, communis.

VERNATIO conduplicata, convoluta, involuta, revoluta,
imbricata, equitans, obvoluta, plicata, reclinata, inclinata, circinalis.

ÆSTIVATIO convoluta, imbricata, conduplicata, valvata, inæquivalvis.

SOMNUS connivens, involvens, circumſepiens, muniens,
conduplicans, includens, divergens, dependens,
invertens, imbricans.

TORSIO a. conformis, difformis.
b. dextra, ſiniſtra, reciproca.
c. reſupinata, circinalis.

VARIATIO coloris, magnitudinis, pubeſcentiæ, ætatis.
Externa: plicata, faſciata.
latifolia, tenuifolia, criſpa.
mutica.
Interna: a. mutilata, grandiflora.
b. multiplicata, plena, prolifera.
c. vivipara, bulbigera.

SPONSALIA Mas, Femina, Androgyna, Hermaphrodita.
Generationis *myſteria*.

SEMINATIO *Seminis* cauda, ala, pappus,
hamuli, gluten, curvatio.
Pericarpii baccatio, inflatio, viſcoſitas, elaſticitas, *ſtructura*.

PLACENTATIO Dicotyledonis, Acotyledonis, Polycotyledonis.

IV. LOCUS.

CLIMA boreale, orientale, occidentale, mediterraneum, auſtrale, indicum, alpinum.
SOLUM marinum, lacuſtre, maritimum, littorale, paluſtre, inundatum, uliginoſum, ceſpitoſum, alpinum, nemoroſum, ſylvaticum, arvenſe, pratenſe, campeſtre, montanum, ruderale, cultum.
TERRA Humus, Argilla, Creta, Arena, Paraſitica.

V. TEMPUS.

GERMINATIO dierum, menſium, annuum, bienne.
FRONDESCENTIA *Vernatio* præcox, æqualis, ſerotina.
Autumnatio. præcox, lenta, cunctanea.
CALENDARIUM. 1. Germinat. Frondeſcentiæ, Floreſcentiæ.
2. Groſſificationis, Maturationis, Meſſis.
3. Exſolationis, Defoliationis, Congelationis.
4. Brumalis, Glacialis, Regelationis.
HOROLOGIUM a. Vigiliæ meteoricæ, tropicæ, æquinoctiales.
b. tempus apertionis, recluſionis.
DURATIO *Plantae* caducæ, ſenſiles, perpetuæ.
Flores ephemeri, tridui, menſtrui.
Fructus præcoces, ſerotini, annui.

VI. QUALITAS.

ODOR inodorus, fragrans, ambroſiacus, alliaceus, aromaticus, viroſus, hircinus, teter.
SAPOR ſiccus, ſtipticus, amarus, ſalſus, acris, aquoſus, pinguis, acidus, dulcis, viſcoſus.
COLOR a. hyalinus, albus, cinereus, niger, luteus, ruber, cæruleus, viridis.
b. mutabilis, autumnalis.
CONSISTENTIA. a. exſucca, carnoſa, ſuccoſa, glutinoſa.
b. aquoſa, viridis, alba, lutea, rubra.

VII.

VII. UTILITAS.

NATURALIS Oeconomia naturæ,
ſympathia l. antipathia.
Pan *mammalium phytiphagorum domeſticorum*,
Pandora *inſectorum*.

ARTIFICIALIS *culinaris*: Radices, Olera, Fructus.
Officinalis a. ſimplicia, præparata,
b. pretium, locus.
Medica: Vires, Viſus.
Oeconomica inſtrumentalis.
paſtoralis, tinctoria
culturæ: cerealium, medicarum,
hortorum, arborum,
ſepium, pratorum.

TERMINOLOGIA BOTANICA

LATINA GERMANICA

NEC NON

TERMINORVM

DESCRIPTIO ET EXEMPLA.

I. RADIX.

1. RADIX (Wurzel,) eſt pars plantæ, qua ad locum natalem adjungitur, quæ plantam nutrit, in terra eſt, ſub terra creſcit.

Radix aliis partibus plantæ adhærens nec terræ eſt *planta paraſitica*, (Schmarozer-Pflanze,) *Epidendrum*, *Viſcum*.

Radix quævis circumdatur Cuticula ſ. Epidermide, (Oberhaut,) denſa, ſæpius pellucida. Sub hac cuticula eſt Cortex, (Rinde,) Lignum, (das eigentliche Holz,) Medulla, (Kern, Mark,) carnoſa, (fleiſchigtes Mark) lignoſa, (holzigtes, troknes Mark.)

In radice occurrit, a) *Caudex deſcendens*, (Hauptwurzelſtamm,) ſub terra ſeſe ſenſim ſubducens, cum ramis, (Aeſten,) fibrillis, (Zaſern,) radiculis ſeu fibrillis minimis (Nebenfaſern.) Ob variam ſtructuram variis nominibus diſtinguitur.

b) *Caudex aſcendens* pars radicis extra terram; in arboribus vocatur *truncus*, (Stamm.)

2. *Duratione* eſt

annua, (einjährig) quæ cum caule quotannis perit, & per ſemina propagatur: *Gramina* plurima, *Phaſeolus*.

biennis, (zweyjährig,) quæ primo anno vegetat, altero fructificat & perit. *Tragopojon*, *Secale*.

perennis, (ausdaurend,) quæ productione novarum gemmarum (166) quotannis novam herbam profert: *Glechoma hederacea*, *Viola odorata*.

3. *Fi-*

Figura

a) *ſimplex* (einfach) figura 129. b. ſi in nullas partes divisa eſt. *Scabioſa ſucciſa.*

fibroſa, figura 130. b. (dünn zaſericht, faſericht) quæ conſtat tantum radiculis fibroſis, ceu filamentis. *Veronica beccabunga, Plantago lanceolata.*

ramoſa (äſtig) figura 130. a. quæ in laterales ramos dividitur. *Plantago pſyllium.*

fuſiformis (ſpindelförmig, gerade in die Erde kriechend) fig. 129 b. eſt oblonga craſſa, attenuata. *Daucus, Paſtinaca, Raphanus.*

praemorſa, (abgebiſſen, ohne Spize,) eſt deorſum truncata, nec attenuato apice terminata: *Scabioſa ſucciſa, Plantago, Valeriana.*

repens (kriechend) fig. 131. quæ longe ſub terra excurrit, & radiculas hinc inde dimittit: *Triticum repens, Gramen officin.*

articulata, (gegliedert,) internodiis geniculata, vel hinc inde internodiis incraſſata: *Convallaria polygonatum, Triticum repens.*

dentata, (gezähnt, aus mehreren aneinander hangenden Stücken) acumina recta brevia radicis conſiſtentia, ſpatio remota habens.

perpendicularis, (ſenkrecht, pfalförmig:) fig. 129. b. quæ recta deſcendit. *Rapa.*

horizontalis, (wagrecht) qua ſub terra transverſim extenditur. *Iris.*

c) *globoſa*, (rund, kugelförmig) ſubrotunda radiculis lateralibus. fig. 129. a. *Ranunculus. Chaerophyllum. Braſſica rapa.*

tuberoſa, (knollig, knotig,) fig. 128. quæ ſubrotundis conſtat corporibus in faſciculum collectis, e partibus carnoſis filo quaſi connexis. *Paeonia, Helianthus, Solanum tuberoſum*, ſ. eſculentum.

faſcicularis, *faſciculata*, (bündelförmig, aus verſchiedenen miteinander verbundenen fleiſchigten Stücken zuſammengeſezt) colligens filamenta (radiculas) recta parallela approximata, e partibus carnoſis baſi ſeſſili connexis. *Orchis abortiva, Ranunculus ficaria.*

palmata, (handförmig) longitudinaliter in plures partes ſubæquales, lobatas, carnoſas divi-

ſa verſus ortum, ubi cohærent in unum: *Orchis latifolia maculata.*

6. d) *bulboſa*, (zwiebelwurzel) gaudens ſubſtantia ſingulari molliuſcula, ſucculenta: Tunicata, (häutig) *Allium ſativum*, *cepa*: Squamoſa, (ſchuppich), *Lilium*: Duplicata (doppelt *Fritillaria.* Solida, (ganz) *Tulipa.* Bulbus, (Zwiebel) ubi radix craſſior ac truncus, fig. 125.

granulata, (körnig, kleine Körner) conſtans granis bulboſis, numeroſis: ſeu particulis carnoſis adſperſa. *Saxifraga granulata.*

TRVNCVS (Stamm)

7. Eſt pars plantæ ex radice exſurgens ſupra terram fructificationem aut & ſimul folia proferens: Organum multiplicans plantas;

Truncus extrorſum circumdatur *cuticula*, (Oberhaut) ſub hac

Cortex, (Rinde) *Lignum*, (Hartholz) *Liber*, (Splint, die innere Rinde zunächſt am Holze) eſt cortex compactior, e parte cartilaginoſa corticis ortus, a ligno ipſo per telam celluloſam ſeparatus.

Vaſa cartilaginoſa per hyemem majorem duritiei gradum acquiſita, motu ſuccorum frigore fere ſublato, formant *Alburnum*, (neue Holzlage,) Circa lignum plantæ noviter ſe generantes accreſcentiæ *Annulum* formant, quæ ætatem, (Alter, Jahr,) plantæ, arborum inprimis indicant.

Medulla, (Mark,) a qua vita plantæ dependet; in radice medulla hæc plantarum ſub terra formant ramos, rami trunci, inciſi in articulo, terræ inſerti, ramos hoc modo ſub terra novos gignunt: Operatio hæc vocatur *Submerſio*, (das Ablägen der Gewächſe.)

Medulla eſt vel *carnoſa*, vel *lignoſa.*

8. *Specie*

Caulis (Stengel) truncus proprius herbæ, & flores & folia elevans: in herbis flexilis, mollis. fig. 116. 117.

Cauleſcens planta, quæ caule inſtruitur.

Acaulis herba, (ſtiellos) cui caulis deeſt & flos immediate radici inſidet.

Cau-

Caudex, in palmis truncus proprius.

Culmus, (Halm bey Gräſern) fig. 114. truncus proprius graminis, elevans folia fructificationemque. *Briza*, *Poa*, *Feſtuca*, *Carex*. (Plantæ *Culmiferae*, *Calamiferae*, (Halmgewächſe.)

Scapus, (Schaft,) fig. 113. truncus univerſalis, ſuculentus, elevans fructificationem, nec folia. *Convallaria majalis*, *Hyacinthus botryoides*, *Tuſſilago farfara*. *Narciſſus*, *Pyrola*.

Stipes, (Strunk, Stiel,) truncus proprius palmis, filicibus, fungis, baſis frondem (24) exſerens; eſt truncus foliis plane circumdatus, ſ. in folia tranſiens.

Duratione.

herbaceus, (Krautartig) quotannis, aut bienniis periens: mollis, flexilis, non lignoſus. *Globularia vulgaris*, *Plantago pſyllium*, *Aſparagus officinalis*.

ſuffruticoſus, *frueſcens*, (ſtaudig) ſi ſtirps, ſeu planta caulem per hyemem ſervet, & in eo germinet, ſi humilis gemmis orbatus. *Solanum dulcamara*.

fruticoſus, (Strauchig) perennis, ſi plures ab una radice duriores & humiliores caules prodeant. *Spartium ſcoparium*, *Echium fruticoſum*.

arboreus, (Baumartig, einſtämmige Pflanze,) ſi ſingularis craſſus, & in magnam proceritatem ſurgat; perennis caudice ſimplici. *Alcea arborea*.

ſolidus, (dicht) interne farctus. Conſtans ſubſtantia, continua, ſolida, medulla compacta. fig, 126. *Sambucus*.

inanis, (locker) nulla ſubſtantia medullari, vel nonniſi maxime poroſa cellulari repletus.

fiſtuloſus, (hohl, röhrig) interne tubuloſus, formans cavum cylindraceum. *Conium maculatum*, *Phellandrium aquaticum*, *Arundo*.

farctus, (voll angefüllt,) qui totus ſubſtantia repletus.

Menſura

) ſecundum longitudinem: Pedis *Pariſini*, *Anglicani*, *Suecici*.

linearis (linea una menſuræ pariſinæ,) eſt lunulæ longitudo ab unguis radice verſus unguem extenſa.

ungui-

unguicularis (lineæ 6, ſive uncia $\frac{1}{2}$)
pollicaris (uncia una pariſ.) eſt longitudo aut diameter extimi articuli pollicis.
palmaris (unciæ 3 pariſ.) diameter 4 digitorum transverſorum parallelorum dempto pollice.
ſpithameus (unciæ 7,) qui æquat ſpatium inter apicem pollicis & indicis extenſum.
dodrantalis (unc. 9.) æquans ſpatium inter apicem pollicis & digiti minimi extenſum.
pedalis (unc. 12.) comprehendens ſpatium a flexura cubiti ad baſin pollicis. *Hieracium, Auricula.*
orgyalis, (pedes 6) valens hexapodam, ſeu humanam altitudinem, menſuram inter manus expanſas. *Malva arborea, Helianthus.*
proportio ad folia, reliquasque partes, ejusdem individui.

b) ſecundum craſſitiem:
exprimitur *ſimili notiſſimo*, v. c. *pollicis*, *femoris*, *capitis humani.*

11. *Directione*, ſ. *Situ.*

a) *erectus*, (gerad, aufrecht) adſcendens recta, fere ad perpendiculum ſe attollens. fig. 117. *Verbaſcum thapſus. Ranunculus aconitifolius, Aſparagus officinalis.*
ſtrictus, (ſenkrecht) nec minimum a recta deflectens, firmus. ſ. perpendicularis absque flexura. *Alcea roſea.*
laxus, (ſchwankend) ex debilitate vel gracilitate flexilis, libere in arcum nutans. *Juncus.*
rigidus, (ſteif) minime flexilis. *Carex vulpina.*
obliquus, (ſchief) oblique ſe erigens, rectus cæterum, nec a perpendiculari aut horizontali linea diſcedens.
adſcendens, (verſchieden gekrümmt, auffteigend) cum quadam curvitate ſucceſſiva ab horizonte ſuperiora verſus recedens, ſ. ramis arcuatim ſurſum verſis. *Vicia cracca, Cytiſus nigricans.*
declinatus, ſ. *inclinatus*, *reclinatus*, (gekrümmt verſchieden, niedergebogen) prius adſcendens, dein terram verſus ſe flectens, flexionis angulo patentiſſimo inſtar carinæ naviculæ, ſ. arcuatim deſcendens. *Potentilla aurea.*

inc ur-

incurvatus, inflexus, (einwärts gekrümmt) dum primum erectus, dein arcuatur. ſ. introrſum nutans.

nutans, (überhängend) parte reflexa perpendiculariter pendula. ſ. apice extrorſum reflexus. Hieracium auricula.

diffuſus, (weitſchweifig) ramis patentibus. *Fumaria officinalis, Geniſta tinctoria.*

procumbens, (geſtreckt, ſeitwärts niederliegend) horizontaliter ſupra terram, debilis terræ innitens. *Anagallis arvenſis. Vinca minor. Ranunculus arvenſis. Aſperugo procumbens.*

decumbens, (niederliegend) primum paulo erectus, dein ſuper terram extenſus. Thymus ſerpyllum.

ſtoloniferus, (Wurzel ſproſſen an der Seite,) ramo gemmifero radices agente, novamque herbam producente: turiones (Wurzel, Sproſſen,) ad radicem edens: *Ajuga reptans, Viola odorata.*

2. b) *ſarmentoſus*, (rankig) ſubnudus, repens, absque radiculis hinc inde demiſſis: ſ. filiformis geniculis radicantibus. fig. 131. *Vitis vinifera, Clematis vitalba.*

Vimina, racemi, (Ranken, Reben.)

radicans, (wurzelnd) ramis radices proferens, ſ. altis ſe affigens radiculis lateralibus. fig. 112. *Hedera helix.*

repens, (kriechend) radiculas hinc inde exſerens procumbendo ſuper terram. *Potentilla anſerina, Lyſimachia nummularia.*

3. c) *geniculatus*, (Knieförmig) internodiis interruptus. *Gramina, Galeopſis.*

flexuoſus, (gebogen) ſecundum articulos horſum vorſum flexus, ſ. a gemma ad gemmam. Solanum dulcamara.

ſcandens, (kletternd) adſcendendo ad vicina corpora, plantas &c. tenaculis ſe ſuſtentans. *Clematis vitalba, Vitis, Hedera helix.*

volubilis, (gewunden) fig. 115. ſpiraliter adſcendens per ramum alienum.

Siniſtrorſum (, ſecundum ſolem vulgo fig. 115. (a ſiniſtra ad dextram.) *Humulus lupulus, Lonicera periclimenum.*

Dextror-

Dextrorſum) , contra motum ſolis : *Convolvulus*, *Phaſeolus*. Si te in centro ſpiræ conſiſtere & meridiem reſpicere concipias.

14. *Figura*

a) *teres*, (rund) qui cylindricus eſt inſtar baculi, angulis deſtitutus. *Ranunculus aconitifolius.*

ſemiteres, (halbrund) ad cylindricum accedens.

compreſſus, (zuſammengedrukt) ut utrinque longitudinaliter ac lateraliter planus ſit. *Potamogeton compreſſum*, *Anagallis latifolia.*

anceps, (zweyſchneidig) angulos duos opponens acutiusculos inſtar gladii ancipitis. Convallaria polygonatum, *Medicago falcata.*

3--10 *angulatus*, (eckigt) pluribus quam duobus angulis cavis longitudinaliter excavatus. *Vaccinium*, *Myrtillus*, Campanula trachelium.

acutangulus, (ſcharfeckig) angulis ſcindentibus acutis: *Scrophularia nodoſa.*

obtuſo angulatus, (ſtumpfeckig) margine angulato obtuſo.

15. b) *di-tri-tetra-penta-hexa-polygonus*, *ſeu triquadr-quinq-ſex-mult-angularis* ex numero angulorum longitudinalium, prominentium, æqualiter a ſe diſtantium. e. g. Trigonus, Ranunculus flammula. Tetragonus, Ajuga alpina.

tri-quadri-quin-queter, 3--4--5 latera plana obtinens, (3--4--5--ſeitig.)

16. *Veſtitu.*

nudus, (nackend) deſtitutus foliis, ſquamis, ſtipulis, aliisque excreſcentiis: ſæpe non abſolute) reſpective ad aliam ſpeciem ita dicitur. fig. 113. *Euphorbia*, *Cactus*, *Cuſcuta.*

aphyllus, (blätterlos) foliis carens. fig. 117.

foliatus, (mit Blättern) foliis inſtructus. fig. 115. *Veronica beccabunga*, Delphinium conſolida.

vaginatus, (mit Blattſcheiden) ſi folia inferius vaginam formant, ſ. foliorum vaginis cinctus. *Iris*, *Carex vulpina.*

ſquamoſus, (ſchuppicht) foliolis ſquamas referentibus. fig. 111. *Lilium.*

imbricatus, (bedeckt) foliis vel foliolis, uno alterum tegentibus, vel uno alteri inſtar tegularum

larum tecti, incumbentibus, ſ. tectus ut ſuperficies non appareat. fig. 115. *Tuſſilago farfara.*

17. *Superficie.*

a) *ſuberoſus*, (korkartig) extus qualitate ſuberis, ſ. cortice molliore exteriore, ſed elaſtico indutus.

rimoſus, (rizig) rimas ſponte agens cortice exteriore.

tunicatus, (hautig) conſtans cortice, tunica quaſi ſuperaddita tecto, ſ. membranis veſtitus. f. 127.

18. b) *laevis*, (eben) ſuperficie æquali. *Ranunculus aconitifolius.*

ſtriatus, (geſtreift) ſulcis, vel coſtis ſuperficialibus exiguis diſtantibus ſecundum longitudinem notatus, ſ. lineis excavatis tenuiſſimis inſcriptus. *Rumex criſpus, & acetoſella, Geniſta tinctoria.*

ſulcatus, (gefurcht) ſulcis profundis, latis, excavatis exaratus.

19. c) *glaber*, (glatt) ſuperficie polita, ſ. lævi lubrica, nuda. *Ranunculus arvenſis, Carex vulpina.*

ſcaber, (rauh) punctis rigidiuſculis eminentibus exaſperatus. *Cannabis, Humulus, Lupulus*, Gallium mollugo.

muricatus, (zackig) ſpinis non pungentibus munitus, ſ. punctis ſubulatis adſperſus. *Fagi ſylvaticae* fructus.

tomentoſus, (filzig) villis intertextis vix conſpicuis tectus: unde ſæpius albidus: plantæ marinæ, & campeſtres ventis expoſitæ. Anemone pulſatilla, Verbaſcum thlapſus.

lanatus, (wollicht) pilis intricatis curvatis, quaſi tela aranearum indutus.

villoſus, (rauhhaarig) pilis mollibus conſpicuis pubeſcens. Teucrium chamepithys, *Ceraſtium vulgatum.*

hirſutus, (zottig) pilis rigidis compactis præditus. *Silene nutans*, Hieracium auricula.

hirtus, (kleinhaarig) ſi pili exigui & longe diſtant. *Ceraſtium ſuffruticoſum, Caucalis, Daucus carota.*

hiſpidus, (ſtachelicht, borſtig) ſetis rigidis aſperſus. *Crepis foetida, Echium vulgare.*

aculea-

aculeatus, (dornicht) fig. 123. acúleis (84) munitus; e cortice excreſcentes facile quæ completæ ſe ſeparant: conſtant materia ſpongioſa, duriori cortice circumdati. *Roſa*, *Berberis*.

piloſus, (haaricht) pilis ſimplicibus, diſtinctis, elongatis, obductus. *Lamium purpureum*.

ſpinoſus, (ſtachelicht) fig. 121. ſpinis (85) armatus. Prunus ſpinoſa.

urens, (brennend) ſpicis urentibus præditus e præmatura evolutione gemmæ orientes. *Urtica*.

20. d) *ſtipulatus*, (mit Blattanſätzen) ſtipulis (68) f. 118. b. auctus. *Papilionaceae* ſeu *Leguminoſae* pleræque. *Amygdalus perſica*, Polygonum perſicaria.

membranatus, (hautig) ſ. complanatus more folii, alatus, membranis longitudinalibus inſtructus. *Scrophularia aquatica*.

bulbiferus, (knollig) corpuſcula bulboſa proferens. *Allium ſcorodopraſum*, *Allium carinatum*, in umbella; *Ranunculus ficaria* in axillis ad ramulorum exortum.

21. *Compoſitione*

a) *enodis*, *aequalis*, (ohne Knoten) qui continuus eſt, nec nodis nec geniculis interceptus.

ſimplex, (glatt, einfach, der keine Aeſte hat) continua ſerie verſus apicem extenſus. *Aquilegia vulgaris*.

ſimpliciſſimus, (ſehr einfach) ramis vix ullis apparet.

integer, (ganz, vollkommen) non diviſus, ſimpliciſſimus ramis vix ullis anguſtatis.

22. b) *articulatus*, *geniculatus*, (gegliedert) conſtans articulis fig. 114. qui ſunt intervalla juncturis, nodisve (geniculis) diſtincta. *Oxalis*, *Hibiſcus*, *Piper*.

prolifer, (ſproſſend, mit ſproſſenden Gipfel) ex apicis centro emittens tantum ramos; Cætera, ut in inte[illegible]o. *Pinus*.

dichotomus, (zweytheilig) fig. 116. bifariam ſemper diviſus: *Valeriana locuſta*, *Ceraſtium ſuffruticoſum*.

brachiatus, (armförmig ins Creuz) fig. 117. ramis decuſſatim oppoſitis. *Mercurialis annua*.

23. c) *ſubramoſus*, (halbäſtig) ramis perpaucis lateralibus.
ramoſus, (äſtig) ramis pluribus lateralibus. *Veronica beccabunga.*
ramoſiſſimus, ſ. *ſubdiviſus*, (ſehr äſtig) ramis plurimis absque ordine gravidus. *Gallium ſaxatile.*
d) *virgatus*, (ruthenförmig) ramuſculis inæqualibus debilibus, flexilibus, copioſis, fere faſciculatis præditus. *Betula alba*, *Antirrhinum geniſtifolium.*
paniculatus, (büſchelförmig getheilt) paniculæ (103) modo diviſus. ſ. ramis variis ſubdiviſis.
faſtigiatus, (horizontalgleich) cum ramos ita attollit in faſciculum, ut ſuperne æquales altitudine evadant, ac ſi horizontaliter detonſi eſſent, & ſic *faſtigiati* fiunt flores, cum petioli ita attollunt fructificationes in faſciculum &c. *Dianthus*, *Silene.*
e) *patens*, (abſtehend, klaffend) ſi trunci plures ad radicem enati angulis acutis a ſe divergunt.
divaricatus, (auseinander geſperrt) oppoſitus *coarctato*, caulibus pluribus ad terram enatis a ſe maxime diſtantibus, ſ. a trunco ad angulum obtuſum deſcendentes.
24. *Ramis*, ſ. *Brachiis*; (Aeſte) quæ ſunt partes caulis.
a) *ſtructura caulis*, (Stamm) unde emergunt.
ſtructura frondis, (Zweig) ſ. 108. quæ eſt trunci ſpecies coadunata ex ramo, folio & ſæpius fructificatione filicibus & palmis propria: *Aſplenium ſcolopendria*, *Filix officinalis.*
Subtiles continuationes frondium, vocantur *palmites*, (Reiſer) palmites longæ vocantur *flagella*, (Waſſergeſchoſs, Ruthen) ex his excreſcentes rami in ſequenti anno, *Malleolus*, *Surculus*, *Germen* (Sprößlinge.)
25. b) *alternis*, (wechſelsweiſe) cum unus poſt alterum, tanquam per gradus exit, circa ramum.
diſtichis, (nach zwey Seiten) ſi utrinque e regione ſolum oriuntur. ſ. duo latera rami tantum reſpicientes, licet undique inſerti.
ſparſis, (ohne gewiſſe Ordnung, zerſtreut) ubi plures absque ordine certo prognaſcuntur.
confertis, (gedrängt) cum ita copioſi, ut truncum occupent totum, vix relicto ſpatio contrarii

remotis. ſ. plurima totum fere occultantia ramum vel caulem.

oppoſitis, (gegeneinander überſtehend) cum duo per paria decuſſatim e regione in trunco collocantur.

verticillatis, (geſchöſſig, quirlförmig) cum plures quam duo verticillatim truncum ambiunt, ad genicula.

ternis, *quaternis*, *quinis*, *ſenis*, *ſeptenis*, *octonis*, qui ſpecies numeri verticillatorum ſunt. *Aſperula odorata.* *Gallium.*

26. c) *erectis*, (aufrecht) qui ad angulum acutiſſimum trunco adſtant, ſ. fere ad perpendiculum. *Delphinium conſolida*, *Helianthus.*

coarctatis, (zuſammengezogen) cum multi ſecundum longitudinem accumbunt trunco, vel angulis acutiſſimis, vel verſus ſummitatem prodeuntes, in directione ſua pergunt.

divergentibus, (abweichend) prioribus oppoſitis, quorum diſtantia juxta extenſionem increſcit, ſ. a trunco ad angulum rectum diſcedentes.

divaricatis, (auseinander geſperrt) ſine ordine angulisque maximis obtuſis a ſe invicem a trunco diſcedunt. *Cucubalus bacciferus.*

deflexis, (abgebogen) curvatis ita, ut extremitate ſua inferiores fiant, in arcum deorſum inclinati.

reflexis, *inflexis*, (rückwärts gebogen) cum extremitate introrſum ad truncum vergunt, ſ. perpendiculariter dependentes.

retroflexis, (hin und her gebogen) contrario modo extrorſum, ſ. horſum vorſum divaricati.

fulcratis, (geſtüzt) ubi deflexi ita, ut ad terram vel radicem usque deſcendant: *Ficus*, *Gallium ſylvaticum.*

27. d) *Altitudine* caulis.

longis, qui caulem longitudine ſuperant.

brevibus, qui caule minores.

patentibus, qui ad angulum acutum exeunt.

FOLIA (Blätter.)

28. Sunt organa motus in plantis: Sunt partes vegetationis cauli vel radici oppoſitæ: & in longi-

gitudinem latitudinem ſeſe extendentes, colore quam maxime viridi.

Folia formantur e cortice, cujus pars ſpongioſa in formam folii extenditur, & vaſis cartilagineis corticis ſub forma nervorum, venarum, circumdatur.

Inter epidermidem duplicem cujuscunque *folii*, erumque leviter adhærentem, eſt *rete*, ſæpe duplex, nflatum ex vaſis minimis, e trunco in folium tranuntibus.

Rete ſuperius, ramis magis cylindricis conflatum, e parte lignoſa trunci, & *inferius* ramis magis planis conſtans, ex interna medullari corticis parte originem ſuam trahere videtur.

Tela cellulosa combinat hæc duo *retia*; inter hanc nt contentæ veſiculæ, ſuccum nutritium plantæ conentes. Superfluum aquoſum, nutritioni plantæ non ſerviens, exhalat e foliis plantarum, multis inprimis æditarum foliis: aquoſum hoc planta ſi non amittit, erſus radicem omne aquoſum tendit & putredini ſubcta eſt talis planta. Multum aquoſi ex aëre quods plantæ folium attrahit: partes nutrientes haud exiuas planta quævis hoc modo acquirit, probant hoc antæ marcidæ, locis humidis reviviſcentes.

9. DETERMINATIONE, non a propria ſtructura notam adquirit folium, ſed Loco, Situ, Inſertione aut Directione.

Loco (Urſprung nach) quo adnectuntur folia parti plantæ.

1) *radicalia*, (Wurzelblätter) e radice:
2) *caulina*, (Stamm-Stengel Blätter) *e caule*,
3) *ramea*, (Aſtblätter) f. 90. e ramis enaſcuntur.
4) *axillaria*, (Achſelblätter) ex *axillis*, ſcilicet & ramum inter & caulem ex angulo prodeunt ſupra; ſ. quæ ad rami exitum inſeruntur. *Subaxillaria*, (Winkelblätter) infra prodeunt ex angulo &c.
5) *floralia*, (Blumenblatt) f. 91. ad florum exortum inſeruntur, vel & ipſis pedunculis adhærent, perſiſtentia ſua a bracteis caducis diſtincta.

6) *seminalia*, (Saamenblätter) f. 88. quæ primo ex semine emergunt, caduca. f. quæ antea cotyledon fuerunt & primum in planta.

30. NVMERO, 1. 2. 3. pauca, plurima, numerosa numerosissima, *gemina*, trina, &c. duo, ter ex eodem caule prodeuntia folia.

31. SITV, qui est dispositio foliorum in plantæ caule.

a) *alterna*, (25) (wechselweisgesezte Blätter, abwechselnd) f. 88. ad 90. 104. per gradus circum ramum exit. unum post alterum. *Borrago officinalis*, *Linum usitatissimum.*

disticha, (25) (in zwey Reihen, zweyzeilig) si omnia folia duo latera rami tantum respiciunt, licet undique inserta. *Pinus*, *Abies.*

bifaria, (in zwey Reihen gerad stehende) si disticha, angulo recto orta, recta se extendunt. f. ad latera rami oppositа tantum enata. *Lycopodium complanatum.*

sparsa, (zerstreut) in nulla posita ordine. *Epilobium angustifolium.*

conferta, (gedrängt) si numerus tam insignis ut ramus vel caulis totus obtegatur.

fasciculata, (Buschblätter in besondern Büscheln stehende Blätter) f. 107. si plura distincta folia ex eodem puncto prodeunt. *Pinus larix.*

Species: *bina*, *terna*, *quaterna*, *quina* &c.

imbricata, (wie Dachziegel aufeinander liegend) f. 106. si conferta & erecta (33) ut invicem se quoad partem dimidiam tegant. *Euphorbia paralias.*

confluentia, (zusammenhängende) cum distincta, basim versus acuto angulo connascuntur.

coadunata, (zusammengefügt) quæ invicem annectuntur ut basi concrescant.

approximata, (genähert, dicht beysammen stehende) exiguo spatio inter singulorum exortum relicto, f. ad se invicem proxime accedentia.

remota, (entfernt von einander) priorum contraria, f. spatio a se invicem distantia. *Polypodium fragile.*

82. b) *Oppositа*, (Gegenblätter, gegeneinander überstehende) f. 82. ad 86. 103. cum caulina folia

lia duo per paria decuſſatim e regione collocantur. *Veronica teucrium, Epilobium hirſutum.*

decuſſata, (ins Creuz ſtehende Blätter, kreuzförmig) ita diſpoſita oppoſite, ut planta, verticaliter inſpecta, folia quadrifariam vergant.

ſtellata, (ſternförmig, Sternblätter) ſtellis ſimiles.

verticillata, (Wirbelblätter) f. 101. 102. cum folia plura quam duo verticillatim (in eadem altitudine) caulem ambiunt. *Lilium, Martagon.*

Species: terna, quaterna, quina, ſena, octona, pro numero ſtellatorum ad genicula ramorum: 2 und 2, 3 und 3, 4 und 4 &c. *Aſperula odorata.*

ſquamoſa, (Schuppenblätter) ſub forma ſquamarum folia inſerta ſunt cauli.

33. DIRECTIONE.

a) *erecta*, (gerad, aufrecht) arrecta f. 83. quæ ad angulum acutiſſimum cauli aſſident, ſ. fere ad perpendiculum. *Colchicum autumnale.*

ſtricta, (ſenkrecht) augent rectorum, ſeu recta extenſorum ſignificationem, ſ. omnino perpendiculare absque flexura. *Tragopogon pratenſe.*

rectiſſima, idem notant.

rigida, (ſteif) ob firmitatem vix flexilia. *Gallium uliginoſum.*

adpreſſa, (angedruckt) cauli ſecundum totam longitudinem valde arcte accumbunt, ſeu cum diſcus folii approximatur cauli.

patentia, (abſtehend) f. 84. contraria prioribus, ſeu recta ad angulum acutum cauli aſſident. *Erica tetralix, Sedum album.*

horizontalia, (gerade auffſtehend) f. 85. angulo recto a caule diſcedunt. *Lactuca viroſa.*

aſſurgentia, (aufwärts gebogen, aufſteigend) arcuatim erecta, ſeu primum declinata, verſus apicem demum erecta.

inflexa, incurva, (einwärts gebogen) f. 82. dum ſurſum arcuantur verſus caulem.

reclinata, (zurükgebogen, unterwärts gekrümmt) f. 86. quæ deorſum curvantur, ut apices fiant baſi inferiores.

reflexa, oppoſita inflexis.

recurvata, (überwärts gekrümmt) ſita reclinatim, ut arcus ſurſum ſe elevat. *Plantago pſyllium.*

revoluta, (zurük-zuſammengerollt) f. 87. quæ deorſum revolvuntur, ſ. in ſpiram recurvata. *Vaccinium oxycoccos*, *Teucrium ſupinum.*

dependentia, (niederhangende) quæ terram recta apice ſpectant.

declinata, (herunter gebogen) deorſum inflexa inſtar carinæ naviculæ.

34. b) *obliqua*, (ſchräg, ſchief) cum baſis cœlum, apex horizontem reſpicit. *Fritillaria.*

adverſa, (umgedreht, ſeitwärts gewendet) quæ latus non cœlo, ſed meridiei obvertunt. *Amomum.*

verticalia, *obverſa*, (vertical) quorum baſis anguſtior ita, ut baſis concipiatur, ubi nunc apex. e. g. obverſe ovata, obverſe cordata ſ. verticaliter ovata, cordata.

loco *obverſe* ponitur ſimpliciter *ob*, ſicut loco *fere* ponitur *ſub*; ſic:

obovata, *ſubovata*
-- *cordata*, -- *cordata*, *Siſymbrium Naſturtium.*

reſupinata, (verkehrt) cum folii interior ſeu ſuperior pars (alias caulem ſpectans) terram, inferior (averſa) cœlum ſpectat.

35. c) *ſubmerſa*, *demerſa*, (untergetaucht) infra aquæ ſuperficiem abſcondita. *Ranunculus aquatilis.*

natantia, (Schwimmblätter) aquæ ſuperficiei incumbentia. *Nymphaea*, *Potamogeton.*

radicantia ſ. *radicata*, (wurzlend) quæ radices agunt, ſeu quæ radiculas immittunt in ſubſtantia ipſius folii. *Saxifraga cotyledon.*

36. INSERTIONE (Zuſammenhang).

a) *petiolata*, (Stielblätter) f. 93. ſi petiolus (62) annectitur folio, ad marginem baſeos. *Campanula trachelium*, *Verbaſcum nigrum.*

peltata, ſ. *umbilicata*, (ſchildförmig) f. 92. ſi petiolus (non margini ſeu baſi) diſco folii inſeritur. *Tropaeolum majus.*

37. b) *ſeſſilia*, (auffizend) f. 94. ſi folia petiolo carent, & immediate cauli annectuntur. *Veronica teucrium*, *Chamaedrys*, *Cynogloſſum officinale*, *Saponaria*, *Vaccaria.*

inſer-

inſerta, (in den Stengel eingefügt, auffizend) inſident cauli.

adnata, (angewachſen) f. 94. cum ampliori baſeos ſuperficie annectuntur.

coadnata, (vereinigte Blätter) ſi plura folia inter ſe concreſcunt.

connata, (gegen über ſtehend zuſammengewachſen) f. 98. ubi folia oppoſita (32) inter ſe connata in unum, in baſi utrinque, *Lonicera*, *Eupatorium*.

decurrentia, (herunterlaufend) f. 95. ſi baſis folii ſeſſilis, dein ultra baſin extendatur deorſum per caulem. *Carduus*, *Symphytum officinale*, *Verbaſcum thapſus*.

amplexicaulia, (den Stengel umgebend, den Stamm umfangend) f. 96. ſi baſis folii undique ambiat latera caulis transverſim. *Salvia pratenſis*, *Hyoſciamus niger*.

ſemi - vel ſub - amplexicaulia a prioribus gradu minore differunt. *Hyoſcyamus niger*.

perfoliata, (durchwachſene Blätter, ein Blatt das vom Stengel durchſtochen) f. 97. ſi baſis folii undique cingat transverſim caulem. *Bupleurum rotundifolium*. (ſ. perfoliata off.)

vaginantia, (Scheideblätter) f. 99. ſi baſis folii format tubum cylindricum, caulem veſtientem: *Gramina*, *Polygonum*, *Rumex*.

38. *Structura*.

FIGVRA.

a) *orbiculatum*, (kreisrunde, circulförmig) f. 1. cujus diameter longitudinalis, æqualis transverſalis a peripheria circinnata. *Geranium ſanguineum*.

ſubrotundum, (rundlecht) f. 2. cujus figura orbiculato proxime accedit. *Ranunculus hederaceus*, *Cardamine pratenſis*.

rotundum, (rund) quod angulis privatur: *Polygala amara*.

ovatum, (eyrund, eyförmig) f. 3. cujus diameter longitudinalis ſuperat transverſalem, baſi ſegmento circuli circumſcripta, apice vero eodem anguſtiore. *Veronica chamaedrys*, *Salvia officinalis*, *Scabioſa ſucciſa*.

ovale, (oval) f. ellipticum, (elliptiſch) f. 4. cujus diameter longitudinalis ſuperat transverſalem, ſuperiore & inferiore extremitate anguſtiore. *Sedum maximum*, *Vicia ſylvatica.*

39. b) *oblongum*, (länglicht, ablang) f. 5. cujus diameter longitudinalis aliquoties ſuperat transverſalem, & utraque extremitas ſegmento circuli anguſtior. *Salvia pratenſis*, *Verbaſcum nigrum*, *Poeonia officinalis*, *Rumex acetoſa.*

parabolicum, (paraboliſch) f. 110. cujus diameter longitudinalis ſuperat transverſalem, & a baſi ſurſum anguſtatur in ſemiovatum.

ellipticum, (elliptiſch) lanceolatum, latitudine ovati folii.

cuneiforme, (keilförmig) f. 45. cujus diameter longitudinalis ſuperat transverſalem, & ſenſim deorſum (verſus baſim) anguſtatur. *Apium graveolens*, *Portulaca oleracea.*

ſpathulatum, (ſpatelförmig) f. 109. cujus figura ſubrotunda, baſi anguſtiore lineari elongata.

digitatum, (gefingert) digiti formam continens. *Helleborus viridis*, *Eupatorium cannabinum.*

auritum, (geöhrt) auris formam æquans. *Jungermannia complanata.*

pubeſcens, quod quadam pubis ſpecie notatum eſt. *Plantago media*, *Lonicera xyloſteum.*

teſſellatum, quod maculis teſſellatis pictum eſt.

acutum, (ſpizig) angulum acumine præditum continens. *Scorzonera laciniata.*

40. c) *rotundatum*, *rotundum* (gerundet) quod angulis privatur. *Lactuca ſativa.*

lanceolatum, (lanzetförmig) f. 6. eſt oblongum utrinque ſenſim verſus extremitatem attenuatum: *Gratiola officinalis*, *Gallium aparine*, *Plantago lanceolata*, *Lyſimachia vulgaris*, *Tulipa.*

ſubulatum, (pfriemenförmig) f. 8. eſt inferius lineare, verſus apicem vero ſenſim attenuatum, *Antirrhinum glaucum.*

lineare, (linienförmig, gleich breit) f. 7. æquali ubique latitudine, interdum utraque extremitate tantum anguſtatur. *Gallium verum*, *Peucedanum officinale*, *Dianthus arenarius.*

aceroſum, (Dangeln, Nadelblatt) f. 105. eſt lineare perſiſtens, totum annum durans. *Pinus*, *Juniperus*, *Taxus*, *Abies*.

glanduloſum, quod glandulas inſidentes gerit, in ſerraturis. *Salix perſica*.

41. ANGVLIS,

integrum, (ungetheilt) eſt indiviſum, angulis & ſinubus carens. *Scabioſa ſucciſa*.

triangulare, (dreyeckigt) cum tot anguli prominentes ambiunt diſcum. *Chenopodium rubrum*.

quadrangulare, (4eckig)

quinquangulare, (5eckig)

deltoideum, f. 58. (deltaförmig) rhombeum eſt ex 4 angulis, e quibus laterales minus a baſi diſtant, quam reliqui. *Populus nigra*.

rhombeum, (rhomboidiſch) cujus 4 latera parallela æqualia. *Chenopodium vulvaria*.

trapeziforme, (trapezenförmig) cujus latera nec æqualia, nec parallela.

42. SINVBVS, quoad comparationem.

a) *cordatum*, (herzförmig) f. 10. eſt ovatum (38), baſi excavatum, deſtitutum angulis poſticis. *Veronica teucrium*, *Pulmonaria officinalis*, *Convallaria bifolia*.

reniforme, (nierenförmig) f. 9. eſt ſubrotundum (38) baſi excavatum, angulis deſtitutum. *Campanula rotundifolia*, *Aſarum europaeum*.

lunatum, *lunulatum*, (mondförmig) f. 11. eſt ſubrotundum (38) baſi excavatum, angulis poſticis notatum.

ſagittatum, (pfeilförmig) f. 13. eſt triangulare (41) baſi excavatum, angulis poſticis inſtructum. *Convolvulus arvenſis*, *Rumex acetoſa*, *Erica vulgaris*.

haſtatum, (ſpieſsförmig) f. 15. eſt triangulare (41) baſi lateribusque excavatis, angulis patulis. *Rumex*, *Solanum dulcamara*.

capillare, (haargleich) capillis conveniens.

ſetaceum, (borſtig, ſeitenförmig) ſetæ formam continens. *Aſparagus officinalis*.

runcinatum, (ſchlichthobelförmig) labiis elevatis. *Siſymbrium*, *Iris*, *Eryſimum officinale*.

panduriforme, (geigenförmig) eſt oblongum, (39) inferne latius, lateribus coarctatum.

43. b) *fiſſum*, (geſpalten) eſt diviſum ſinubus linearibus, marginibusque rectis.

2--3--4--5--*fidum* } 2--3--4--5ſpaltig) Spe-
multifidum(vielſpaltig) { cies fiſſi a numero fiſſurarum: Multifidum, *Aeſculus hippocaſtanus*. Trifidum, *Reſeda lutea*.

lobatum, (lappig, in Lappen getheilt) f. 17. 19. eſt diviſum verſus medium in partes diſtantes, marginibus convexis. *Hedera helix*, *Viburnum-opulus*.

2-3-4-5 *lobum* a numero loborum: trilobum, *Reſeda phyteuma*. Quinquelobum, *Geranium ſylvaticum*. *Obſolete lobatum*, ſi lobati læve veſtigium monſtret.

partitum, (getheilt) f. 28. eſt diviſum usque ad baſin. *Dracocephalum auſtriacum*.

2--3--4--5. partitum (getheilt) a numero laciniarum; multipartitum, *Ranunculus polyanthemos*.

palmatum, (handförmig) f. 22. eſt longitudinaliter in partes plures ſubæquales diviſum verſus baſin, qua tamen cohærent in unum. ſ. potius in lobos ſubæquales ultra dimidium ſubdiviſum. *Vitis vinifera*, *Ranunculus ſceleratus*.

lyratum, (leyerförmig) f. 76 eſt transverſim diviſum in lacinias ita ut ſuperiores majores ſint, & inferiores remotiores minores. *Geum urbanum*, *Siſymbrium arenoſum*.

pinnatifidum, (ausgezackt, in Querſtücke getheilt) f. 23. eſt transverſim diviſum laciniis horizontalibus oblongis. *Scabioſa arvenſis*, *Heracleum ſphondylium*.

ſinuatum, (ausgehölt) f. 25. quod lateribus ſinus dilatatos admittit. *Hyoſcyamus niger*, *Myagrum perenne*.

diſſectum, ſ. *inciſum*, inciſuras, ſectiones continens. *Liguſticum leviſticum*.

laciniatum, (zerriſſen, zerſtückt) f. 24. varie ſectum in partes, partibus itidem indeterminate ſubdiviſis. *Verbena officinalis*, *Eryngium campeſtre*.

ſquar-

ſquarroſum, (ſparricht) ſi laciniæ in omnem partem divaricantur, ſ. diviſum in lacinias elevatas nec plano parallelas.

44. MARGINE, qui eſt extrema ora folii ad latera, intacto diſco folii.

a) *integerrimum*. (glatträndig, mit einem glatten Rande verſehen) f. 42. cujus margo extimus integer absque omni crena eſt, ſ. margine continuo lineari nec minimum ſecto. *Lonicera xyloſteum.*

crenatum, (ausgezackt, gekerbt) f. 38. cujus margo angulis neutram extremitatem reſpicientibus ſecatur. *Ajuga reptans*, *Teucrium chamaedrys.*

duplicate crenatum, (doppelt gekerbt) angulis minoribus inſertis majoribus. *Ranunculus auricomus.*

inciſum, (geſpalten) diviſum. *Tanacetum vulgare.*

obtuſe inciſis f. 36. obtuſis *acute* f. 35. acutis } angulis.

duplicate f. 33. angulis ipſis rurſus eodem modo ſectis.

ſerratum, (ſägförmig, ſägartig gezähnt) f. 31. quod margine inciſo, angulis acutis imbricatis (16) extremitatem reſpicientibus notatur. *Veronica teucrium*, *Primula auricula*, *Rhamnus alaternus*, *Pyrus Malus.*

duplicato-ſerratum, (doppelt ſägförmig) angulis minoribus ſerratis, inſertis majoribus.

ciliatum, (mit Haaren eingefaſst, gefranzt, behaart) f. 50. cujus margo ſetis parallelis longitudinaliter obvallatur. *Erica tetralix*, *Sempervivum tectorum.*

dentatum, (gezähnt) f. 30. quod acumina horizontalia, folii conſiſtentia ſpatio remota habet.

bi -- dri -- quadri -- multidentatum. *Veronica chamaedrys*, *Primula veris.*

ſpinoſum, (ſtachelicht) quod margine exit in acumina duriora, rigida, pungentia. *Acacia*, *Dracocephalum auſtriacum.*

cartilagineum, (knorplicht) f. 34. cujus margo cartilagine, a ſubſtantia folii diverſiſſima firmatur.

45. b)

45. b) *repandum*, (ausgeſchweift) f. 29. margine flexuoſo attamen plano, ſ. cujus margo angulis ejusque interjectis ſinubus, circuli ſegmento inſcriptis terminatur. *Chenopodium glaucum*.
lacerum, zerriſſen) quod margine varie ſectum eſt, ſegmentis difformibus.
eroſum, (zernagt) f. 21. cum folium ſinuatum (43) margine, ſinus alios minimos obtuſos, laciniasque inæquales adquirit. *Chenopodium album*.
daedaleum, (verworren) (*Daedalus*) ingenio fabræ celeberrimus artis. Ovid. Si & repandum, flexuoſum lacerumque ſimul.

46. APICE.
a) *obtuſum*, (ſtumpf) f. 40. quod terminatur quaſi intra ſegmentum circuli. *Rumex obtuſifolius*, *Sedum album*.
emarginatum, (ausgeſchnitten, ausgezackt) f. 45. quod terminatur crena. *Acer campeſtre*.
retuſum, (zugeſtumpft) fig. 46. quod terminatur ſinu obtuſo. *Potentilla verna*, *Vicia ſativa*.
praemorſum, (abgebiſſen) quod obtuſiſſimum terminatur inciſuris inæqualibus.
truncatum, (abgeſtuzt, abgeſchnitten) quod linea transverſali definit. *Convolvulus ſepium*.

47. b) *acutum*, (ſpizig, ſcharf) f. 41. quod terminatur angulo acuto. *Convolvulus arvenſis*, *Rumex criſpus*.
acuminatum, (ſcharf zugeſpizt) f. 42. quod terminatur apice ſubulato. (40) *Lamium album*.
cuſpidatum, (pfriemenförmig, in eine ganz feine Spize geendigt, lang oder zart geſpizt) eſt acuminatum, ſed acumine (non folii conſiſtentia) rigidiuſculo. ſ. terminatum apice ſetaceo.
mucronatum, (an der Spize ſtachlicht, ſteif geſpizt) ſpecies prioris, ſed acumine longiori pungente, ſ. terminatum mucrone exſtante: *Gallium uliginoſum*, *Aparine*.
cirrhoſum, (gablicht) f. 72. 73. quod terminatur cyrrho. *Lathyrus*.

48. SVPERFICIE.
a) *pagina ſuperiore*, quæ caulem ſuperiorem reſpicit, ni folium tortum ſit, utplurimum cœlum.

infe-

inferiore, quæ caulem inferiorem ſeu radicem & terram ſpectat: hæc aliis quoque *pars prona* l. averſa audit.

nudum, (nakend) excreſcentiis piloſis, verrucoſis, ſetis, ſetaceis, &c. deſtitutum. *Daphne cneorum*, *Galega officinalis*.

glabrum, (glatt) quod ſuperficie lævi lubrica eſt absque omni inæqualitate. *Plantago major*, *Primula auricula*, *Datura ſtramonium*.

nitidum, (glänzend) quod glabritie lucidum eſt. *Angelica canadenſis*.

lucidum, (hell) vitri inſtar, major præcedentis gradus, ſ. quaſi illuminatum. *Hypericum perforatum*.

coloratum, (anders als grün gefärbt) quod alium colorem, quam viridem induit: *Amaranthus tricolor*.

49. b) *nervoſum*, (ſ. *enerve*) (nervigt, wenn die Rippen (nervi) nur einfach ohne ſich untereinander zu vereinigen) ſ. 53. cum vaſa ſimpliciſſima absque ramulis extenduntur a baſi verſus apicem. *Scorzonera humilis*.

trinervatum, *trinerve*, (dreyfach aderig) tribus nervis *in baſi* folii concurrentibus. *Dianthus carthuſianorum*, *Stachys annua*.

triplinerve, cum tria vaſa ſingula ſtatim alia tria apice ſuo exporrigunt, ſ. nervoſum tribus nervis *ſupra baſin* concurrentibus.

enerve, (ohne Nerven) quod hujus ſpeciei vaſis caret, ſ. nervoſo trinervato oppoſitum.

lineatum, (mit Linien durchzogen) quod lineas diſtinctas exhibet, (nec tamen profundas, nec eminentes, ſ. nervis depreſſis exclavatum.

ſtriatum, (geſtreift) cum lineæ ſuperficiales excavatæ, longitudinales, parallelæ inſcriptæ ſunt.

ſulcatum, (gefurcht) ſ. 60. quod angulis numeroſis totidemque interjectis ſinubus longitudinaliter exaratur. ſ. lineis profundis excavatum. *Gallium verum*.

50. c) *venoſum*, (adrig, wenn ſie einem Nez gleichen) ſ. 52. cum vaſa diſcurrentia evadunt ramoſiſſima, & anaſtomoſes nudo oculo exhibent. *Viburnum lantana*.

rugo-

rugoſum, (runzlicht) f. 51. cum venæ foliorum contractiores evadunt, quam diſcus, ut interjecta ſubſtantia adſcendat. *Veronica Chamaedrys*, *Primula veris.*

bullatum, (blaſenförmig) naſcitur ex rugoſo, cum diſcus (non ambitus) multiplicetur, ut inter rugas contractas, ab altera parte concavas, adſcendat ſubſtantia inſtar conorum ſubtus concavorum. *Salvia*, *Ocymum baſilicum.*

lacunoſum, (vertieft) quod inſcriptas foveas habet, ſ. diſco depreſſo inter venas interjectas. *Lichen ſaxatilis.*

avenium, (ohne Adern) cum vaſis ramoſis caret, ſ. venoſo oppoſitum.

51. d) *punctatum*, (punctirt, gedipfelt) quod punctis excavatis adſperſum eſt. *Alyſſum montanum*, punctato echinatum, *Hypericum perforatum.*

papilloſum, (warzicht) f. 54. quod tegitur punctis veſicularibus, carnoſis.

papuloſum, (mit kleinen Blaſen bedeckt) tuberculis, ſæpe coloratis, farctis exaſperatum: ſ. tectum punctis veſicularibus.

viſcidum, (klebrigt) humore non fluido ſed tenaci oblinitum. *Senecio viſcoſus.*

52. e) *villoſum*, (zottig, rauh) quod pilis mollibus pubeſcit. *Prunus inſititia*, *Sorbus domeſtica.*

tomentoſum, (filzig) f. 48. villis intertextis vix conſpicuis tegitur, unde ſæpius albidum, uti plantæ marinæ & campeſtres ventis expoſitæ: *Tuſſilago*, *Verbaſcum*, *Cynogloſſum officinale*, *Viburnum lantana.*

ſericeum, (ſeidenartig) quod villis intertextis conſpicuis tectum, ſ. tectum pilis adpreſſis molliſſimis.

lanatum, (wollicht) ſericeum villis attactu & aſpectu rudioribus albeſcentibus, ſ. indutum quaſi tela araneæ, (pilis ſponte curvatis,) *Salvia*, *Sideritis*, *Althaea.*

barbatum, (bartigt) villis pilisve parallelis, prolixis, confertis, fere faſciculatis, inſtar barbæ hirci. *Aſclepias vincetoxicum.*

pilo-

piloſum, (haarigt) f. 47. pilis diſtinctis elongatis tectum ſuperficie. *Hieracium*, *Piloſella*, *Veronica teucrium*, *Juncus piloſus*.

ſcabrum, ſ. *aſperum*, (rauh) cum tubercula rigidiuſcula per diſcum folii ſparguntur. *Gallium aparine*, *Pulmonaria officinalis*.

hiſpidum, *ſtrigoſum*, (ſteif borſtig f. 49. cum ſetæ rigidiuſculæ, fragiles, aſperæ per diſcum folii ſparſæ ſunt. *Lycopſis arvenſis*, *Echium vulgare*.

aculeatum, (ſtachelicht) cum acumina pungentia, rigida occupant diſcum. *Gallium uliginoſum*.

ſtrigoſum, (ſteif dornicht) gradu majori hiſpidum, acuminibus rigidis lanceolatis.

53. EXPANSIONE

planum, (flach) quod utramque ſuperficiem ubique parallelam gerit ſ. æqualem. *Anthericum ramoſum*. *Juncus piloſus*, *Thymus ſerpyllum*.

canaliculatum, (riemenförmig) fig. 61. ex ſulco profundo ſecundum totam longitudinem excavatum in dimidiatum fere cylindrum.

cylindricum, (wellenförmig)

concavum, (hohl, ausgehöhlt, vertieft) cum margo folii arctior fit, quam ut diſcum circumſcribat, unde deprimitur diſcus.

convexum, (erhaben) quod in diſco magis elevatum eſt.

cucullatum, (haubenförmig, kappenförmig) cujus latera baſin verſus arcte connivent, ſuperne apice explicata. *Geranium africanum*.

plicatum. (gefalten) f. 37. cum diſcus folii verſus marginem ad angulos adſcendit & deſcendit, ſ. diſco plicis acutis alternatim flexo : *Alchemilla*.

undulatum, (wellenförmig, erhabene Blätter) cum diſcus folii marginem verſus convexe adſcendit & deſcendit. *Rumex criſpus*, *Inula pulicaria*.

undatum, (ſtumpf geſpalten) ſi diſcus plicis obtuſis alternatim flexus.

criſpum, (kraus) f. 39. ſi peripheria folii evadit major, quam diſcus admittit, ut undulatum fiat, ſ. margine luxuriante ut diſcus evadat lon-

longior, ſua rachi. (*Obſ.* folia criſpa omnia monſtroſa ſunt.)

rugoſum, (runzlicht) f. 51. cum venæ foliorum contractiores evadunt, quam diſcus, ut interjecta ſubſtantia adſcendat. *Salvia.*

54. SVBSTANTIA folii conſideratur ſecundum latera.

a) *membranaceum*, (häutig) quod inter utramque ſuperficiem nulla evidenti pulpa ſcatet, ſ. ſubſtantia propria folii. *Lathyrus ſylveſtris.*

alatum, (an den Seiten bebrämt) aliis præditum.

inſertum, (eingefügt) ſi cauli inſeritur.

ſcarioſum, *aridum*, (trocken) albida, ſicca ſubſtantia, arida, tactu ſonora, alias quid cicatricibus hinc inde exaſperatum, ut eſt liber albus, *Betulae albae*, (vulgaris.)

gibbum, (höckricht) quod utramque ſuperficiem facit convexam mediante copioſiore pulpa. *Sedum acre.*

teres, (rund, kuglicht) f. 62. quod maxima ex parte cylindricum eſt.

Semicylindraceum eſt teres, ſed altero latere longitudinaliter planum. *Allium cepa.*

depreſſum, (eingedruckt) quod in diſco magis deprimitur, quam ad latera.

compreſſum, (zuſammengedrukt) quod a lateribus marginalibus oppoſitis comprimitur, ut ſubſtantia folii major fiat, quam diſcus.

confertum, (gedrängt) cum ita copioſa folia, ut caulem occupent totum. *Antirrhinum linaria.*

carinatum, (rückgrädig, mit einer erhabenen Schärfe, nachenförmig) ſi pars prona (48) diſci prominet longitudinaliter. *Gallium aparine.*

55. b) *compactum*, *craſſum*, (dicht, dick) quod ſubſtantia firma, ſolidaque conſtat.

tubuloſum, *cavum*, (hohlröhrig) quod interne (ſi detruncetur) cavitatem habet.

pulpoſum, (ſaftig, markig) quod interne molli pulpa repletum. *Succulentae plantae*, *Sedum.*

carnoſum, (fleiſchigt) quod interne firmiori fere carnoſa pulpa refertum, inſtar pomi. *Fragaria veſca*, *Antirrhinum glaucum.*

tenue, (dünn) *nervoſum*, (ſenig) nervis præditum.

venoſum, (aderig) veras habens.

56. c)

56. c) *triquetrum*, (dreyſeitig) f. 59. cujus tria latera longitudinalia plana ſunt in folio ſubulato.
anceps, (zweyſchneidig) quod duos angulos prominentes longitudinales, diſco convexiore admittit.
lingulatum, *linguiforme*, (zungenförmig) eſt lineare carnoſum obtuſum, ſubtus convexum, margine ſæpius cartilagineo. *Meſymbryanthemum*, *Aſplenium*.
enſiforme, (ſchwerdförmig) eſt anceps a baſi verſus apicem attenuatum. *Iris pſeudacorus*, *Gladiolus communis*.
ſubulatum, (pfriemenförmig) f. 8. eſt inferius lineare, teres, at verſus apicem ſenſim attenuatum: hocce farctum eſt, illud (40) planum, vix farctum. *Sedum rupeſtre*, *Scorzonera anguſtifolia*.
acinaciforme, (ſäbelförmig) f. 56. eſt compreſſum, carnoſum, altero margine convexo anguſto, altero rectiore craſſiore. *Meſymbrianthemum*.
dolabriforme, (hobelförmig) f. 57. eſt compreſſum, ſubrotundum, obtuſum, extrorſum gibbum, acie acuta, inferne teretiuſculum. *Meſymbrianthemum*.

57. MENSVRA.
relativa breviſſimum, longiſſimum } reſpectu caulis, articulive.
abſoluta (10)

58. DVRATIONE.
1) *deciduum*, (abfallend) ſi ante maturitatem fructus cadit. ſ. peracta unica æſtate caſurum. *Vaccinium*, *Myrtillus*.
2) *caducum*, (hinfällig) brevi decidens nec per integram æſtatem permanens, ante vel ſtatim poſt explicationem floris, i. e. *defoliatio*, ſi autumno decidunt folia, & *frondeſcens*, ſi verno tempore creſcunt.
3) *perſiſtens*, (verbleibend) peracta æſtate non caſurum.
4) *perenne*, (ausdaurend) per aliquot annos virens. *Roſa ſempervirens*.
5) *ſempervirens*, (immer grün) per omnia tempora anni virens. *Vinca pervinca*.

59. COMPOSITIONE, quæ reſpicit folia plura in uno petiolo, ſecundum *ſtructuram* aut *gradus*.
Structura conſiderat foliorum inſertionem.
Folium ſimplex, cum petiolus ſimplex indiviſus unicum profert folium.
compoſitum, (vielfach, zuſammengeſezt) cum petiolus (62) indiviſus, ſ. ſimplex profert plus quam unicum folium, & e plurimis *foliolis* (Blättgen) conſtat. *Ranunculus bulboſus & repens*.
articulatum, (mit Gelenken verſehen, gegliedert) f. 100. cum folium unum alterius ex apice excreſcit.
conjugatum, (gepaartes Blat) f. 73. cum petiolus ſimplex utroque latere annectit foliolum unicum pinnatum.
digitatum, f. 66. (gefingert) cum petiolus ſimplex apice annectit foliola plura. *Ranunculus ſceleratus*.
binatum, (zweyfach) f. 63. eſt digitatum foliolis duobus. *Aſarum europaeum*.
trinatum, *ternatum*, (dreyfach) f. 64. 65. eſt digitatum foliolis tribus.
quinatum, (fünffach) eſt digitatum foliolis quinque. *Ranunculus aconitifolius*.
pedatum, (fuſsförmig) fig. 67. cum petiolus bifidus latere tantum interiore annectit foliola plura. *Paſſiflora*, *Arum*, *Helleborus niger*.
bijugum, (zweypaarig) eſt pinnatum foliolis ex utroque latere binis.
tri-quadri-quinque-ſejugum &c. (3. 4. 5. 6. paarig) ternis quaternis quinternis & decem &c. foliolis.
pinnatum, (federartig, gefiedert) f. 68. ad 75. cum petiolus ſimplex lateribus annectit foliola plura. *Valeriana officinalis*, *Pimpinella ſaxifraga*.
pinnatum cum impari, (gefiedert mit einem ungepaarten Blättgen) fig. 68. eſt pinnatum, terminatum foliolo impari unico.
pinnatum cirrhoſum, (gefiedert mit Gabeln) f. 72. 73. eſt pinnatum terminatum cirrho. (76)

pinnatum abruptum, (abgebrochen gefiedert) f. 69. eſt pinnatum, terminatum neque cirrho, neque foliolo. *Sine extremo*, (ohne Endblatt) *cum extremo*, (mit Endblatt).

pinnatum oppoſite, (gefiedert mit überſtehenden Blättern) f. 68. 69. foliolis oppoſitis.

pinnatum alterne, (mit wechſelweiſen Blättern) fig. 70. foliolis alternis.

pinnatum interrupte, (ungleich gefiedert fig. 71. foliolis interruptis, iisque alternis minoribus.

pinnatum decurſive, (herunterlaufend gefiedert) fig. 74. foliolis decurrentibus per petiolum.

pinnatum articulate, (gelenkweiſe gefiedert) fig. 75. foliolis ex articulorum junĉturis prodeuntibus.

ramoſum, (äſtig) ramis præditum.

alatum, (geflügelt) alis præditum.

o. GRADVS conſiderant ſubdiviſionem petioli communis.

decompoſitum, (gedoppelt, doppelt zuſammengeſezt) cum petiolus ſemel diviſus annectit foliola plura. *Ruta graveolens, Ranunculus arvenſis.*

bigeminum, *bigeminatum*, (zwey-doppelt) cum petiolus dichotomus (22) apicibus annectit foliola quatuor.

biternatum, *duplicato ternatum*, (zweygedritt) f. 77. cum petiolus affigit tria foliola ternata. *Epimedium.*

bipinnatum, *duplicato pinnatum*, (doppelt gefiedert, zweydoppelt) fig. 78. cum petiolus lateribus affigit foliola pinnata. *Anemone pulſatilla & pratenſis*, *Tanacetum vulgare.*

1. *Supra decompoſitum*, (3fach zuſammengeſezt) cum petiolus aliquoties diviſus annectit plurima foliola. *Spiraea aruncus.*

tergeminum, *triplicatobigeminum*, (dreyfachgedoppelt) cum petiolus trifidus apicibus annectit foliola quatuor, nempe utroque apice foliola duo, & inſuper ad divaricationem petioli communis foliola 2.

triternatum, *triplicatoternatum*, (dreygedritt) fig. 79. cum petiolus affigit tria foliola biternata.

tripinnatum, *triplicatopinnatum*, (dreyfachgefiedert) f. 80. cum petiolus affigit plura foliola bipinnata.

tripinnatum cum impari, f. 81. (ungleich dreyfa
gefiedert) petiolus affigens folia tripinnata
æqualiter.

FVLCRA PLANTARVM
(Stüzen der Pflanzen.)

62. Sunt adminicula plantæ pro commodiore fuſtent
tione, quibus licet privata, planta raro per
Species, Petiolus, Stipulæ, Cirrhus, P
bes, Arma, Bractea, Pedunculus.

Petiolus, Pediculus, (Blätterſtiel) eſt trunci ſp
cies annectens & elevans folium nec fructi
cationem.

Uniflorus petiolus, (einblümiger Blumenſtiel) un
cum florem gerens.

Bi -- tri -- multiflorus, (vielblümiger) varios flor
gerens.

Faſtigiati flores cum petioli ita attollunt fructif
cationes in faſciculum, ut ſuperne æquale
altitudine evadant, ac ſi horizontaliter de
tonſi eſſent. *Dianthus*, *Silene*.

Conglomerati flores fiunt, cum petiolus ramoſu
flores ferat absque ordine arcte congeſtos &
compactos, adeoque oppoſiti paniculæ diffuſæ

63. FIGVRA,

linearis, (gleichbreit) planus, ſecundum totam
longitudinem æqualiter latus: *Citrus medica*
(Limonium off.)

alatus, (gebrämt) qui latere utrinque membrana au
ctus eſt, ſ. lateribus dilatatus. *Citrus aurantium*

clavatus, (keulförmig) extremitate ſuperiore
verſus apicem incraſſatus, ut clavam referat

membranaceus, (häutig) compreſſus tenuis ita, u
inter utramque ſuperficiem nulla evidenti pul
pa ſcateat.

teres, (rund) (54) *ſemiteres*, (halbrund) illi ac
cedens proxime.

angulatus, (eckigt) angulos habens.

triqueter, (dreyſeitig) (56) canaliculatus, (53)

64. MAGNITVDINE.

relativa, *breviſſimus*, *brevis*, *mediocris*, *longiſſi
mus*, *longus*, habito ſcilicet reſpectu ad ipſius
folii extenſionem longitudinalem. Sic

breviſ

breviſſimus, [ſehr kurz] ſi longitudo folii multoties ſuperet longitudinem petioli, ſ. qua magnam partem non attingens longitudinem folii.
brevis, [kurz] ſi nondum longitudinem folii attingit.
mediocris, [mittelmäſſig] ſi longitudo utriusque æqualis.
longus, [lang] ſi longitudinem folii ſuperet.
longiſſimus, [ſehr lang] ſi aliquoties ſuperet longitudinem folii.
abſoluta. [10] [vollkommen]

INSERTIONE

inſertus, [in den Stamm eingefügt, gerade aufgeſezt] ut baſi ſua non latiorem plagam occupet, ac ipſius craſſities eſt, & quaſi junctura articulari adhæreat, ſ. perpendiculariter ramo inſidens. *Arbores.*
adnatus, [oben angewachſen] quando baſi latiori ita cohæret, ut absque laceratione caulis epidermidis avelli nequeat.
decurrens, [den Stamm herunterlaufend.]
amplexicaulis, [den Stamm umhangend.]
vaginans, [37] [in einer Scheide ſtekend.]
appendiculatus, [mit Anhängen verſehen] appendice quadam auctus, ſ. ramentis foliaceis ad baſin. *Dipſacus piloſus.*

DIRECTIONE

erectus, ſ. *arrectus*, [aufrecht.]
patens, [abſtehend.] *aſſurgens*, [auffſteigend.]
recurvatus, [überwärts gekrümmt.]
patulus, [ausgebreitet] ramulos undique diſpergit, ut remotos ferat flores, oppoſitus coarctato.

SVPERFICIE.

glaber, [glatt.] *aculeatus*, [dornicht] [19.]
articulatus, [gegliedert] [22] qui articulo unico inſtruitur. *Oxalis*, *Hibiſcus.*
nudus, [nackend] ſpinis, aculeis orbatus.
ſpineſcens, [ſtachlicht] ſpinas leviores, rariores promens.

STIPVLÆ, [Blattanſäze, Afterblätter, Stüzen] ſ. 118. b. ſunt ſquamæ baſi petiolorum, aut pedunculorum utrinque enaſcentes. *Papilionaceae*, *Roſa*, *Liriodendron.*

a) *geminae*, [paarweiſe, doppelt] ſi binæ diſtinctæ juxta ſe locentur, ſ. utrinque ſolitariæ plerisque, ſ. duæ & duæ per paria.

ſolitariae, [einzeln] ſi unica ad eandem baſin locata, ſ. ſimplices ſparſæ. *Melianthus* interne. *Ruſcus* externe.

nullae, *aſperifoliae*, Didynamiæ, Orchideæ, *praeſentes*, papilionaceæ, Icoſandriæ.

69. b) *laterales*, [ſeitwärts] ad latus petioli aut pedunculi.

extrafoliaceae, [unter den Blättern] ſi extra & intra folia oriuntur. *Diadelphia*, *Alnus*, *Betula*, *Tilia*.

intrafoliaceae, [über dem Blatt] ſi intra & ſupra folii ortum exiſtunt. *Ficus*, *Morus*.

oppoſitifoliaceae, [gegen dem Blatt über] ſi utrinque foliorum oppoſitorum petiolis adhærent, aut ſi folio e regione opponuntur.

70. c) *caducae*, [bald abfallende, hinfällig] ante foliorum caſum cadentes.

deciduae, [abfallend] cum foliis: *Ceraſus*, *Padus*.

perſiſtentes, [bleibend, über Jahr daurend] adhuc in planta emortua, poſt defoliationem reſtantes: *Diadelphia*, *Icoſandria*, *Polygynia*.

ſpineſcentes, [ſtachlicht] apicibus duris acutis pungentes.

71. d) *ſeſſiles*, [ſizend].

adnatae, [angewachſen] *Roſa*, *Rubus*, *Potentilla*.

decurrentes, [herunterlaufend].

vaginantes, [mit Scheiden]. [37]

72. e) *ſubulatae*, [pfriemenförmig].

lanceolatae, [lanzetförmig].

ſagittatae, [pfeilförmig].

lunatae, [mondförmig] [42].

73. f) *erectae*, [aufrecht]. *reflexae*, [gebogen].

patentes, [abſtehend] [33].

74. g) *integerrimae*, [glatträndig].

ſerratae, [ſägartig gezähnt].

ciliatae, [gefranzt]. *dentatae*, [gezähnt] [44].

fiſſae, [geſpalten] [43].

75. h) *breviſſimae*, [ſehr kurz].

mediocres, [mittelmäſſig].

lon-

longae, [lang] [64] reſpectu petioli foliive, ſi ille deficiat pedunculi.

76. CIRRHVS, [Gabel, ranken] f. 118. a., eſt vinculum filiforme, ſpirale, quo planta tenuis alio corpori alligatur. *Vitis*, *Phaſeolus*, *Bryonia*, *Piſum*.

Capreoli, carbiculæ, viticuli, [Gäblein, Schlingeln].

a) *axillaris*, [Winkelgabel] [29].

foliaris, [Blattgabel] f. 72. 73. enatus ex ſubſtantia folii, & plerumque ex ipſius apice.

petiolaris, [Blattſtielgabel] ex petiolo.

peduncularis, [Blumenſtiel-Gabel] ex pedunculo.

77. b) *ſimplex*, [einfach] non diviſus, continuo extenſus longitudinaliter.

bifidus, [zweyſpaltig].

trifidus, [dreyſpaltig] in 3 partes.

multifidus, [vielſpaltig] in partes diviſus diverſas.

78. c) *convolutus*, [zuſammengerollt] verſus caulem introrſum, in annulos contortus.

revolutus, [zurückgebogen] ſpira dimidio itinere retorta, ſ. a caule extrorſum convolvitur.

79. PVBES, ſ. Pubeſcentia, [Ueberzug] eſt excreſcentia ſ. armatura plantæ, qua ab externis præcipue aëris injuriis defenditur, ſ. hirſuties omnis in planta.

a) *pili*, [Haare] ſunt excreſcentiæ filiformes, valde flexiles, elaſticæ tamen, diſtinctæ, ſ. ductus excretorius plantæ ſetaceus.

lana, [Wolle] ſunt pili curvi, denſi, ſ. eſt excreſcentia filiformis, conferta, tenerior inſtar telæ araneæ obtegens plantam; defendit a nimio æſtu; *Verbaſcum thapſus*.

barba, [Bart] excreſcentia piloſa, parallela, prolixa, faſciculata ut *hirci*.

tomentum, [Filz] eſt excreſcentia conſtans villis intertextis vix conſpicuis, ſervat plantas a ventis, coloris ſæpius incani. *Populus alba*, *Medicago*.

Incanum, [weiſslecht] quod colorem glaucum habet, & fere argenteum, ex ſuperficie ſingulari prodeuntem.

villus, [fein Haar] eſt excreſcentia piloſa ſed longe tenerior.

ſtrigae, ſunt pili rigidiuſculi planiuſculi, ſ. excreſcentia ſetoſa, rigida, declinata, inſtar linguæ felis, arcent animalcula & linguas. *Hibiſcus.*

ſcabrities componitur particulis vix conſpicuis adſperſis plantarum ſuperficiei.

80. b) *Setae*, [Borſten] ſunt excreſcentiæ pilis ſimiles, ſed rigidæ, inflexiles, erectæ.

ſimplices, [einfach] [77]

hamoſae, [hackenförmig] apice reflexæ, animalibus facile adhærentes.

ramoſae, [äſtig] ſ. *furcatae*, alias rurſus diviſas exerentes; ſubdiviſæ quaſi in ramulos. *Verbaſcum.*

plumatae, ſ. *plumoſae*, [federicht] villoſæ compoſitæ, ſ. inſtar plumæ ex utroque latere oppoſito alias ſimplices, ceu rhachi communi annectentes.

ſtellatae, [ſternförmig] ſi ſetæ ſimplices ſetam communem ambiunt ſ. decuſſatim diſpoſitæ [32]

81. c) *Hami*, [Hacken] ſunt ſetæ apice ſimplici arcuatim reflexæ; ſ. mucrones acuminati curvati. *Arctium lappa. Geum urbanum.*

Glochides, [Widerhacken] ſunt ſetæ apice duplici, [non arcuatim] angulatæ reflexæ: inſtar cuſpidis teli retrorſum aculeati, ſ. mucrones apice retrorſum multidentati.

Triglochides, [dreyfach widerhackend] ſunt glochides tricuſpides.

82. d) *Glandulae*, [Drüſen] f. 118. c. 119. ſunt papillæ humorem excernentes, *Salix alba* [officin.] in foliorum ſerraturis infimis. *Braſſica*, *Cheiranthus*, ad baſin ſtaminum.

Veſicularis, *Meſimbrianthimum.*
Globularis, *Atriplex.*
Seſſilis ſtipitata, *Porus.*

Utriculi, [Schlauch] ſunt vaſcula repleta, liquore ſecreto.

Foliaceae, [Blätchen] [f. 118. c.] in foliis ſitæ: tum eorum ſerraturis: *Salix*, ex baſi, Amygdalus communis; tum baſi, *Cucurbita*, *Impatiens*; tum dorſo, *Tamarix*; tum ſuperficie, *Pinguicula.*

Con-

Concavae, [hohl] f. 118. c.
Petiolares, [blätterſtielförmig] f. 119. in petiolis obtinent. *Viburnum opulus.*
Pedunculares, [blumenſtielförmig] in pedunculis.
Stipulares, [blattanſazförmig] in ſtipulis.
Capillares, (haarförmig) *Ribes*, *Antirrhinum*, *Scrophularia*, *Ceraſtium.*

83. e) *Viſcoſitas*, [klebricht] ſi humor craſſus partes obliniat. *Paris*, *Silene.*
Glutinoſitas, [leimig] ſi humor craſſus & tenax partes oblinit & lubricat. *Ceraſtium viſcoſum*, *Senecio viſcoſus*; *Gemmae* foliorum, præcipue plantarum reſinoſarum. *Populus nigra.*
Reſina, [Harz] in ſpiritu vini ſolubilis, in igne comburens, *Therebinthina.*
Gummi, [Kleber, Gummi,] in aqua ſolubilis, non in ſpiritu vini, in igne non comburens. *Gummi* Arabicum, *Ceraſorum*, *Prunorum.*
Gummi reſina, [harzigter Kleber] mixtum e reſina & gummi, aliquid in ſpiritu vini, aliquid in aqua ſolubile. *Aloe.*

84. ARMA, [Waffen] ſunt excreſcentiæ lædentes, quibus ab animalium attactu defenditur planta.
a) *aculei*, [Dornen] f. 122 123. ſunt mucrones pungentes plantæ, ejusdem cortici tantum affixi. *Roſa*, *Berberis*, *Rubus*, *Ribes.*
recti, [gerade] flexuris deſtituti.
incurvi, [einwärts gekrümmt] verſus caulem, introrſum flexi.
recurvi, [auswärts gekrümmt] verſus radicem extrorſum reflexi f. 123.
b) *Furcae*, [Gabeln] f. 123. b. priorum ſpecies, aculei diviſi in plures, baſi uniti: hinc *bifidae*, *trifidae*, a numero diviſionis. *Ribes groſſularia.*

85. c) *Spinae*, [Stacheln] f. 121. ſunt mucro plantæ ex ligno ſeu ipſa ſubſtantia plantæ protruſus: Ramorum, *Prunus ſpinoſa*, *Ononis*, *Cichorium.* Foliorum, *Aloe*, *Carlina*, *Cynara*, *Juniperus.* Calycis, *Carduus*, *Galeopſis.* Fructus, *Agrimonia*, *Datura.*
terminales, [an die Spize des Stammes] in apicibus ramorum, foliorum &c.

axillares, [in die Winkel] [29]
calycinae, [auf dem Kelche] ex ipſo calyce, ejus laciniis foliolisve prognatæ.
foliares, [auf dem Blatte] ex foliis.
ſimplices, [einfach] f. 121. a. [77]
diviſae, [getheilt] f. 121. b. apice partitæ.

86. d) *ſtimuli*, [Brennſpizen] ſunt armatura nonniſi nudas partes lædentes, pungentes, urentes. *Urtica urens.*

87. BRACTEÆ, [Dekblätter, Nebenblätter] f. 120. ſunt folia floralia ſequentis anni, colore & figura recedentia a ceteris, *Tilia*, *Salvia*, *Fumaria bulboſa*, *Horminum.*

a) *coloratae*, [gefärbt] alio quam viridi colore pictæ, *caducae*, [hinfällig] *deciduae*, [abfallend.]
perſiſtentes, [verbleibend] [70] reſpectu florum & fructus.

b) *Una*, *duae*, *plures.*

c) *Coma*, [Zopff] conſtat bracteis, quæ caulem terminant, magnitudine inſignes. *Lavendula*, *Salvia*, *Stoechas*, *Fritillaria*, *Imperialis*, *Bromelia*, *Ananas.*

d) *Caetera*, foliorum attributa ſunt.

88. PEDVNCVLVS, [Blume und Fruchtſtiel] eſt truncus partialis elevans fructificationem, nec folia, elevans florem & truncum.

1. *partialis*, [beſondere Blumenſtiel, wenige Blumen haltend] aliquot flores pedunculi communis proferens. a--e) etiam *pedicellus* dictus [Blumenſtielgen) f. 132. 149. 145. unicam ſuſtentat plerumque fructificationem, vel ex alio communi enatus eſt. f. 135. b.
Scapus, [Blumenſchaft] pedunculus radicatus, caulis faciem induens.

2. *communis*, [allgemein, viele Blumen haltend) f. 163. 164. 165. 167. qui plures fructificationes ſuſtinet, ſ. communis pluribus floribus.

a) *Loco*
radicalis [auf der Wurzel] immediate ex ipſa radice exſurgens.
caulinus, [auf den Stamm] ex caule.
rameus, [auf dem Aſt] ex ramis.

petio-

petiolaris, [auf dem Blatſtiel] ex petiolo enatus. *Hibiſcus.*

cirrhiferus [rankenförmig] promens una cirrhum. [76] *Vitis*, *Cardioſperum.*

terminalis [an der Spize] qui ramum vel caulem terminat.

axillaris [an dem Winkel] [29] ex ala, ſcilicet inter folium & caulem, aut inter ramum & caulem.

oppoſitifolius, [dem Blatt gegen über] qui folio e regione opponitur, *Phytolaca*, *Solanum dulcamara*, *Vitis*, *Geranium*, *Ranunculus aquatilis.*

laterifolius, [dem Blatt zur Seiten] ad latus baſeos folii locatus. *Aſperifoliae* ut *Symphitum*, *Pulmonaria.*

interfoliaceus, [zwiſchen dem Blatt] cum interfolia oppoſita alternatim collocatur. *Aſclepias vincetoxicum.*

ſupraſoliaceus, [über dem Blatt] ſupra folium.

extraſoliaceus, [auſſer dem Blatt] extra folium.

89. b) *Situ*

alternus, [wechſelsweiſe] [31.]

ſparſus, [zerſtreut] ubi plures absque ordine prognaſcuntur.

oppoſitus, [einander gegen über] [32.]

verticillatus, [quirlförmig] ſi plures quam duo in eadem altitudine caulem ambiunt. *Marrubium.*

90. c) *Numero.*

ſolitarius, [einzeln] qui unicus eſt in loco.

geminatus, [doppelt] qui duplex eſt in eodem loco.

umbellula ſeſſilis, [einfache Dolde] quum plures pedunculi ſeſſiles [94] ambitum æqualem facientes ex eodem loco ſeu centro prodeunt.

91. d) *Directione.*

adpreſſus, [angedrückt,] *erectus*, [aufrecht] [33.]

coarctatus, [zuſammengehäuft] cujus idea ad numero plures, ſive in eodem loco ſitos, ſive ſparſos faſtigiantes applicanda eſt, ſi extremitate, quemadmodum baſi parum a ſe diſtant, vel ferme paralleli exiſtunt.

patens, [abſtehend] ſi continuo a ſe magis divergunt, plures ex eodem loco enati.

cernuus, [gebeugt] cum apice incurvatur, ut flos verſus latus alterum vel terram nutet; nec poſſit erectus attolli ob curvaturam ſtrictam pedunculi; *Carduus nutans*, *Helianthus annuus*, *Scabioſa alpina*.

reſupinatus, [verkehrt] [34.]

declinatus, [niedergebogen] [11.]

nutans, [überhängend] [94.]

flaccidus, [welk] cum ita debilis ut a proprio floris pondere dependeat.

adſcendens, [in die Höhe ſteigend] primum paulo declinatus, demum recta ſurſum fertur.

pendulus, [niederhängend] perpendiculariter terram verſus, ſ. laxus ut cum folio deorſum tendat.

ſtrictus, [ſenkrecht] [33.]

flexuoſus, [gebogen] [13] a flore ad florem flexus.

retroſractus, [mit Gewalt heruntergezogen] vi quaſi ad dependentiam redactus.

recurvatus angulo acuto ſtrictiſſimo.

multiflorus, [vielblumig] pro numero florum quos profert pedunculus ſingulus.

Uni-bi-tri-florus &c. [1. 2. 3. blumig.]

92. e) *Menſura*.

relativa, breviſſimus, longus, longiſſimus, reſpectu ad magnitudinem floris 64.

abſoluta, [vollkommen] [10.]

93. f) *Structura*.

teres, [rund] [15] triqueter, [dreyſeitig,] tetragonus, [viereckig] [15. b.]

filiformis, [fadenförmig] tenuis & æqualiter ubique craſſus inſtar fili.

attenuatus, [verdünnt] verſus apicem ſeu florem parum tenuior factus.

incraſſatus, [verdickt] florem verſus, contrarius priori ut plerumque obtinet in floribus cernuis, apice ſenſim majorem molem acquirens, *Tragopogon*.

clavatus, [keilförmig] prope florem clavæ inſtar incraſſatus, verſus apicem,

nudus, [nakend] bracteis, foliis, aut ſquamis, aut quadam pubis ſpecie deſtitutus.

ſquamoſus, [ſchuppicht] [16.]

folia-

foliatus, (blättericht) foliis tectus.
bracteatus, (mit Deckblätter) (87) bracteis instructus.
geniculatus, (knieförmig) (13) internodiis interruptus.
articulatus, (gegliedert) (22.)

INFLORESCENTIA, (Blumenstand.)

94. Est modus quo flores pedunculo plantæ annectuntur. s. quæ pedunculo fructificationem promit.
Flos, (Blume) est ea plantæ pars filamentosa & membranosa, quæ a reliquis colorum elegantia & subtiliori fabrica distinguitur, fructumque semper antecedit. (Schäffer.)
Modus florendi dictus anteceſſoribus.
Efflorescentia, (Blütezeit) tempus in quo flos adest in planta.
Defloratio, (das Abblühen) tempus quo flores in planta absunt.
Partes floris sunt Calyx. Corolla, Stamen, Pistillum: *Fructus* sunt Pericarpium, Semen, Receptaculum. Partes *fructificationis* sunt flos, fructusque.
Essentia floris in anthera & stigmate constat.
Essentia fructus in semine, quod consistit in corculo, cotyledoni annexo, & ab eodem involuto, dein tunica propria arcte vestitur.
Essentia fructificationis in flore & fructu consistit.
Essentia vegetabilium in fructificatione constat.
Fructificatio gaudet Anthera, Stigmate & Semine.
Fructificatio constat plantarum genitalibus, sic floreſcentia est generatio; fructus vero generatio, partus. (Linnæus.)

I. in genere Flores,
terminales, (an der Spize des Stengels sizende) (88.)
laterales, (an die Seite des Stengels sizende) lateri caulis affixi.
unilaterales, *secundi*, si unum idemque latus respiciunt.
anomali, (ungleichförmig) *Convallaria poliganum.*
sparsi, (zerstreut) (89.)

sessi-

ſeſſiles, (unmittelbar am Stengel ſizende) pedunculo deſtituti;
pedunculati, (geſtielte) pedunculo inſtructi.
unicus, (einzeln) in eodem caule.
ſolitarius, (einzeln geſtellt) ſeparatus loco a reliquis in eodem caule adſtantibus.
bini-terni-&c. (doppelte, 3fache) copioſi ubi totidem floſculi arcte ſibi aſſident in eadem ſerie: *Daphne*, *Mezereum*.
erecti, (aufrecht) ferme perpendiculariter cœlum reſpicientes.
cernui, (gebückt, bogicht) (61) in arcum directi.
nutantes, (überhängend) terram magis reſpicientes quam cernui.
verticales, (ſcheitelförmig) perpendiculariter terram verſus directi.
horizontales, (waſſergleich) limbo ſuo horizonti paralleli.

95. II. in Specie.
VERTICILLVS, (Knopf, Quirl) f. 166. ſit ex floribus numeroſis ſubſeſſilibus, caulem annulatim ambientibus.
a) *ſeſſilis*, (feſtſizend) ſi floſculi ſeſſiles (94) absque pedicellis manifeſtis.
pedunculatus, (geſtielt) (94) pedunculis flores elevantibus.
b) *nudus*, (nackend) involucris bracteis &c.
bracteatus, (mit Deckblätter,) bractea inſtructus. (87)
involucratus, (umhüllt) involucro (112) munitus.
c) *confertus*, (dichte gedrängt,) conſtans floſculis plurimis, denſe arcteque conjunctis, ſ. pedunculis approximatis.
diſtans, (los, entfernt) modo priori contrario, ſ. pedunculis remotis.

96. CAPITVLVM, (Köpfgen, Büchſe) conſtat floribus plurimis in globum ferme congeſtis. *Trifolium*.
a) *ſubrotundum*, (halbrund, rundlecht) accedens figuræ ſphæricæ, fere globoſum.
globoſum, (kugelförmig) ſphæram adæquans, ab omni parte rotundatum.
dimidiatum, (geſpalten, halb kugelförmig) ſi capituli dimidium exhibeat, ſ. ab altera parte rotundum, ab altera planum.

b) *ſo-*

b) *folioſum*, (blätterig) cui foliola vel accumbunt vel interſerta ſunt. ſ. ſoliis intermixtis floribus.

nudum, (nackend) foliis & ſetis deſtitutum.

faſciculus, (bund, bündelweiſe) colligit flores erectos, parallelos, faſtigiato (23) approximatos. *Dianthus barbatus.*

97. SPICA, (Aehre) f. 165. conſtat floribus ſeſſilibus, ſparſim alternis, pedunculo communi ſimplici aſſidentibus.

ſpicula, (Aehrgen) graminibus eſt partialis ſpica, quam locuſtam dixere alii.

ſecunda, (einſeitig) floribus ad unum latus verſis.

diſticha, (getheilt) floribus ad utrumque latus ſpectantibus.

a) *ſimplex*, (einfach) quando flores ſolitarii aſſident uni eidemque pedunculo, continua indiviſa ſpica.

compoſita, (zuſammengeſezt) ſpicillis (ſpicis minoribus) pluribus, ex pedunculo communi ſubdiviſo, enatis, & pedunculo inſidentibus.

glomerata, (büſchelweiſe vertheilt) ubi ſpicillæ confertæ concurrunt ad conſtituendam ſpicam communem ſeu compoſitam, ſ. ſpicillis varie congeſtis.

unica, (einzeln) in caule facit caulem monoſtachyum (σαχυς ſpica.)

multae, (viel) in caule eodem caulem polyſtachium.

98. b) *Ovata*, (eyförmig, eyrund) ad figuram ovi accedens (38.)

ventricoſa, (bauchicht) ſi utraque extremitate anguſtior, medio intumeſcat corpore, ſ. a lateribus gibba.

cylindrica, (walzenförmig) ſi rotunda per totam longitudinem æqualiter craſſa ſit.

interrupta, (unterbrochen) alternatim nulla, aut ſaltim multum, per intervalla anguſtata, (59) ſ. ſpicis minoribus alternis diſtantibus.

99. c) *imbricata*, (gedeckt) ſi floſculis, uno lateri incumbentibus conflata ſit, ut ſe invicem quoad partem tegant.

articulata, (gefiedert) (22.)

ramo-

ramoſa, (äſtig) ramos ſpicatos promens, ſ. varie diviſa.

linearis, (gleich breit) eſt compreſſa æquali ubique latitudine.

ciliata, (gefranzt) interjectis ciliis ſeu pilis (79) exſtantibus munita, ſ. margine ſetis parallelis longitudinaliter digeſtis obvallatur.

foliacea, (blätterig) foliolis in ea diſperſis.

comoſa, (zopfig) terminata coma (87.)

100. CORYMBVS, f. 163. (Krone, Strauſs, Büſchel) fit ex ſpica dum ſinguli flores petiolis propriis oblongis inſtruuntur, ſitu elevato proportionali. *Spiraea*, *Braſſica*.

ſimplex, (einfach) dum pedunculi ſinguli non ſubdividuntur.

compoſitus, (zuſammengeſezt) cum pedunculi primores alios plures minores gignunt, ſitu ſervato eodem.

101. *Thyrſus*, (ſpiziger Strauſs, wann die Stiele des Büſchels kurz, eyförmig) eſt pannicula coarctata in formam ovatam, *Syringa*, *Tuſſilago petaſites*.

nudus, (nackend, blos) deſtitutus foliis, ſquamis.

foliatus, (beblättert) foliis veſtitus.

102. RACEMVS, (Traube, Ranke) f. 164. pedunculo ramis lateralibus brevibus conſtat: *Vitis*, *Ribes rubrum*, *Phytolacca*.

a) *ſimplex*, pedunculo ramisque indiviſis. *Phytolacca*.

compoſitus, pedunculo ramisve diviſis in plures, *Chenopodium viride*, *Vitis vinifera*.

b) *unilateralis*, (einſeitig) pedicellis unico in latere ſitis ſeu affixis, ſ. flores omnes ad alterum latus inſerti.

ſecundus, (gebogen nach einer Seite gerichtet,) pedicellis unico in latere incurvatis, ſ. flores omnes ad alterum latus flexi.

pedatus, (geſtüzt, gepfählt) cum pedunculus communis racemos minores annectit, ut folium ped. (59.)

conjugatus, (verbunden,) (59.)

c) *erectus*, (aufrecht) (26) *laxus* (ſchlapp) *flaccidus*, (ſchwankend) *oppoſitus ſtricto*. (33)

depen-

dependens, *pendulus*, (herabhangend) contrarius erecto. *Ribes rubrum.*

d) *nudus*, (nackend) foliis deſtitutus, *foliatus*, (blätterig) foliis auctus.

103. PANICVLA, (Büſchel, Riſpe, Ripe, Straus,) f. 167. fructificatio ſparſa in pedunculis diverſe ſubdiviſis, *Gramina plurima* ut *Panicum*, *Milium*.

diffuſa, (ausgeſtreut) cum divaricantur, aut valde divergunt pedicelli.

coarctata, (eingeſpannt) cum pedicelli fere ſibi exiſtunt paralleli.

caetera, trunci & ramorum declarat ſtructura.

FRVCTIFICATIO
(Entſtehung der Frucht.)

104. Eſt vegetabilium pars temporaria, generationi dicata, antiquum terminans, novum incipiens.

Fructus, eſt pars plantæ annua florisque cohærens & ſuccedens, qui, ubi ad perfectionem pervenit, ſponte a planta abſcedit, & commoda nutrice exceptus, novæ plantæ facit initium.

Fructeſcentia, (Saamenzeitigung) tempus in quo ſemina matureſcunt.

Pelta, (Schild) eſt fructificatio plana, margini folii plerumque adglutinata.

Tuberculum, (Anſaz) eſt fructificatio conſtans punctis ſcabris, ex pulvere quaſi congeſtis. *Lichen.*

Scutellum, (Schüſſele) eſt fructificatio articulata, concava, margine undique elevato. *Lichen.*

Differt in ſingulis partibus. *Numero*, *Figura*, *Proportione*, *Situ.*

Dignoſcitur anthera, ſtigmate & ſemine, ad Linnæum.

Simplex, (einfach) conſtat floribus ſeparatis paucis.

compoſita, *aggregata*, (gehäuft) conſtat floſculis, eidem receptaculo inſidentibus, ſtructuræ ſingularis, pluribus confluentibus.

Syngeneſia (claſſis) Linnæi, ſeu *Symphyantherae* Gleditſchii; ſeu *gymnomonoſpermae* Scopoli; ſeu *compoſitae* Royenii, Tournefortii.

Partes ſunt VII. Calyx (105.) Corolla (120). Stamen (127) Piſtillum (133) Pericarpium (139) Semen (148) Receptaculum (155.)

105. CALYX, (Kelch, die äuſſere Bedeckung der Blume) eſt cortex plantæ in fructificatione præſens.

Calyx ad numerum naturaliſſimum in tot ſegmenta, quot *corolla* dividitur, quibus *filamenta* reſpondent, ſingulo ſingulis *antheris* inſtructo. *Piſtilli* autem divilio cum pericarpii loculis aut ſeminum receptaculis convenire ſolet. *Lyſimachia*, *Linum*.

Calyx ad figuram naturaliſſimam minus patens continet *corollam* ſenſim dilatatam, ſtaminibus & piſtillis erectis, ſenſim attenuatis inſtructam, hiſce, *excepto calyce* pericarpium intumeſcit & extenditur, ſeminibus refertum.

Calycem, corollam minorem profert proportio naturaliſſima, cum ſtaminibus & piſtillis longitudine æqualibus, ſi flos erectus eſt.

Nutans flos gerit piſtillum ſtaminibus longius.

Decumbens, ſtamina piſtillaque ad latus inferius declinata.

Adſcendens vero ſtamina piſtillaque ſub latere ſuperiore recondita.

Perianthium quoad ſitum naturalem involvit *receptaculum*, cui corolla alternatim adnaſcitur, huic autem interius reſpondent *filamenta*, quorum apicibus *antherae* incumbunt, centrum receptaculi occupat *germen*, cujus apici *ſtylus* inſidet, ſummo ſtigma gerens, hiſce decidentibus germen in pericarpium excreſcit, *calyce* ſuſtentatum, includens *ſemina*, adnexa fructu, receptaculo. *Receptaculum* floris frequentius ſubnaſcitur, rarius circumnaſcitur vel ſupernaſcitur.

Calyx eſt thalamus vel præputium. *Corolla* aulæum vel nymphæ. *Filamenta* vaſa ſpermatica, ſuccum ad antheras deferentia. *Antherae* teſtes. *Pollen* genitura. *Stigma* vulva. *Stylus* vagina. *Germen* ovarium. *Seminium* rudimentum. *Pericarpium* ovarium fœcundatum. *Semen* ovum.

Terra

Terra eſt plantarum ventriculus. *Radix* vaſa chylifera. *Truncus* oſſa.

Folia Pulmones, *Calor*, Cor. Hinc planta animal inverſum veteribus dicta eſt.

Duratio.

caducus (abfallend) calyx ad primam explicationem floris cadens. *Papaver*, *Epimedium.*

deciduus, (ganz abfallend) cum corolla decidit cum calyce. *Tetradynamia*, *Berberis.*

perſiſtens, (ausdaurender Kelch) ad maturitatem fructus permanens. *Didynamia.*

geminus, (doppelter Kelch) ubi duo calyces, in nudis nullus.

Calyx vel *nullus* adeſt, *Tulipa*, *Lilia.*

1. *ſimplex*, (einfach) *Primula.*

duplex, (doppelt) *geminus. Malva*, *Hibiſcus.*

triplex, (dreyfach.)

Polygamia ſegregata, (wenn bey einigen zuſammengeſezten Blumen ein jedes Blümchen ſeinen eigenen Kelch hat.)

PERIANTHIVM, (Blumendecke, unmittelbar unter dem Blatt) calyx plantæ fructificationi contiguus. (περι circa ανθος flos,) *Bractea* enim pro perianthio ſæpe & facile aſſumitur ut in *Helleboro*, *Nigella hepatica.*

α) *Fructificationis*, (Befeuchtungs-Blatt) ſtamina germenque includens.

β) *Floris*, (Blumenkelch) ſtamina, (127) absque germine continens.

γ) *Fructus*, germen, *piſtillum*, (133) absque ſtaminibus fovens.

Perianthium a bractea differt, quod illud maturo fructu ſi non prius marceſcat; foliola floralia non idem.

106. I. *Proprium*, (beſondere) quod unice aut α) aut β) aut γ) ſuſtinet, ſ. quemlibet florem reſpiciens.

a) *monophyllum*, (einblätterig) conſtans folio unico, baſi integro, (limbo licet ſæpe diviſo,) μονος, unus, & φυλλον folium. *Datura*, *Primula.*

di--2--tri--3. tetra--4. penta--5. hexa--6. hepta--7. octo--8. ennea--9. deca-10. &c. phyllum, (blätterig) prioris 2--3--fpecies a totidem foliolis ad baſin usque diſtinctis inſtructæ, numeris græcis præpoſitis enunciatæ: diphyllum, *Papaver*, *Fumaria*. 3phyll. *Tradeſcantia*. 4phyll. *Epimedium*. 5phyll. *Ciſtus*, *Adonnis*. 6phyll. *Berberis*. 7. 8. 9. 10. &c. phyllum, *Hibiſcus*.

polyphyllum, (vielblätterig) dicitur, ſi ultra numerare piget. πολυς multus ſ. pluribus foliis conſtans.

107. b) *fiſſum*, (geſpalten) quoad inciſuras, eſt monophyllum, (106) plus minus ad mediam partem verſus baſin diviſum, ſinubus linearibus totidemque marginibus rectis.

bi--tri--quadri--quinque--fidum &c. multifidum, ejusdem ſpecies ſunt. 2--3. vielſpaltig, *bi--tri--multidentatum*, (2--3. vielzähnig.)

partitum, (getheilt) eſt monophyllum diviſum ut *fiſſum*, ſed ultra medium, ſæpe fere usque ad baſin, laciniis tamen in baſi manifeſte etiamnum cohærentibus.

bi--tri--&c. multi--partitum, (2--3. vielmal getheilt) *integrum*, (ungetheilt) eſt monophyllum indiviſum, ſinu omni deſtitutum, prioribus contrarium.

ſerratum, (gezähnt) dentes habens, *Hypericum*.

ciliatum, (gefranzt) ciliis impletum, *Centaurea*.

108. c) *tubuloſum*, (röhrig) quod cavum ad figuram cylindri, ſeu fiſtulæ accedit.

patens, (flach, abſtehend) cujus laciniæ divergunt, aut limbus late expanſus eſt, ſ. ad angulum acutum cauli inſidens.

reflexum, (zurückgebogen) laciniis aut limbo retrorſum flexis.

inflatum, (hohl, ut Blaſe, aufgeblaſen) cavum inſtar veſicæ inflatæ tumens.

aequale, *inaequale*, *globoſum*, (kugelrund) *clavatum*, (keilförmig) *erectum*, (gerad) *integrum*, (ganz) *ſerratum*, (ſägförmig) *acutum*, (ſtumpf) *truncatum*, (abgeſtuzt).

109. d) *abbreviatum*, (verkürzt) *longum*, (lang) longitudinem tubi non attingens. (a proportione ad ungues tubumve corollæ.)

110. e) *obtuſum*, (ſtumpf) baſi (46) *Nymphaea.*
acutum, (ſpizig) baſi (47) *Primula.*
Acuminatum apice, (geſpizt) *Hyoſciamus.*
ſpinoſum, (ſtachlicht) armatum ſpinis. (85)
aculeatum, (dornicht) aculeis, (84) armatum.
quoad durationem perſiſtens, (beſtändig).
deciduus, (abfallend) cum flore, *caducus* -- (abfallend) cum fructu.
ſuperum, (obere) cui germen ſub receptaculo,
inferum, (untere) cui germen *ſupra receptaculum.*

111. II. *Commune*, (gemeinſchaftliche) quod plures floſculos congregatos ſimul includit: *aggregatae*, ut *Scabioſa*; *Syngeneſiae*, ut *Taraxacum.*
imbricatum, (ziegelförmig, übereinanderliegende Schuppen) (31) ſquamis ſeu foliolis calycinis variis ſuperimpoſitis. *Taraxacum*, *Lactuca*, *Hieracium*, *Sonchus.*
ſquarroſum, ſquamoſum, (ſchuppenförmig, von einander abſtehende Schuppen) ex ſquamis undique divaricatis, patentiſſimis conſtructum: *Carduus*, *Conyza*, *Helianthus.*
ſcarioſum, (wie vertrocknete Schuppen) ſquamis margine membranaceis, aridis, ſonoris.
turbinatum, (Birn oder kräuſelförmig) obverſe conicum.
calyculatum, ſ. *auctum*, (ſparricht, mit einem Zuſaze verſehen, vielfach) ubi ſeries foliorum (ſquamarum) breviorum diſtincta exterius baſin calycis cingit: *Crepis*, *Coreopſis*, *Dianthus.*

112. INVOLVCRVM. (Umſchlag bey den floribus umbelliferis) eſt calyx umbellæ a flore remotus. f. 135. involucrum ſæpe deeſt, (bey den Dolden, Hülle.)
a) *univerſale*, (allgemein) f. e. quod umbellæ univerſalis baſi ſubſtratum. *Eryngium*, *Daucus.*
partiale, (beſondere) f. b. quod umbellulæ partiali ſubjacet: *Scandix cerefolium.*
proprium, (eigen) (perianthium) floſculo partiali umbellæ, ſ. cuilibet flori ſubjectum.

b) *mono -- &c. poly -- phyllum* (106. 107.) *Bupleurum*, Diphyllum, *Euphorbia*, *triphyll. Butomus*, *Alisma.*

tetraphyllum, *Cornus.* *pentaphyllum*, *Daucus.* *hexaphyllum*, *Haemanthus.*

113. GLVMA, (Helm, Bälglein, in (graminibus), f. 134. a. calyx graminis constans *valvis* amplexantibus.

valvae sunt laminæ omnino siccæ, aquam pluviamque eludentes prorsus; cæterum papyraceæ firmitatis, oblongæ plerumque.

114. a) *uniflora*, (einblütig) unicum includens flosculum scilicet aut *α.* aut *β.* aut *γ.* (105.) *Panicum*, *Phalaris.*

2--*flora*, *si* duos flosculos continet.

multiflora, (vielblütig) si plures quam duo includit: *Triticum.*

b) *univalvis*, (aus einem Blättle) si flos tegatur valva seu squama unica præter valvas corollaceas.

bi --multi --valvis, (2-- vielblätrig,) si valvæ, s. squamæ duæ &c. flori eidem adstent, sex valvis in *Hordeo.*

c) *colorata*, (gefärbt) coloris alterius, quam viridis herbacei.

glabra, (glatt) (48) *hispida*, (rauh) (52.)

115. *Arista*, (Granen,) f. 134. b. est mucro subulatus insidens. glumæ, (an dem Bälglein der Gräser) *Avena.*

a) *mutica* gluma est, (abgekipt) si arista caret, s. mucrone destituta.

terminalis, (auf den Spizen) cum arista ex valvæ apice prodit.

dorsalis, (auf dem Rücken des Bälglein) quæ parti externæ convexæ, seu dorso valvæ assidet, s. lateri exteriori glumæ adfixa, *Avena.*

b) *recta*, (gerade) quæ fibrarum ductu recto extenditur perpendiculariter.

tortilis, (gewunden) (f. cit.) instar contorti funis, *flexa*, seu *Arista* cum geniculo contorto in medio notetur. *Avena.*

geniculata, *articulata*, (mit einem Knie versehen) geniculo seu articulo instructa: *Stipa plumosa* basi.

re-

recurvata, (überwärts gebogen) extrorſum arcuatim flexa.

116. AMENTVM, (Wurſt, Käzlein) f. 137. eſt calyx ex receptaculo communi paleaceo, gemmaceo, filiformi: *Juglans*, *in plantis Juliferis*, (Käzgen-Blumen.)

ſquamoſum, (ſchuppicht) ſi floſculi ſquamis ſuffulti: *Carpinus*.

nudum, (bloſe Blumen) ſquamis deſtitutum.

pericarpium, (Renk) ex amento prodiens.

ſtrobilus, (Zapfen) coni formam prodiens.

ariſta, (Aehre) ſi corolla pedunculis exiguis calyce affixa eſt.

rachis, receptaculum filiforme in amentis.

117. SPATHA, (Spatelſcheide) in *liliaceis*, (Blumenſcheide) f. 132. 133. calyx ſpadicis (164) longitudinaliter ruptus, vel eſt vagina longitudinalis fiſſa, membranacea, rugoſa, fere ſemper arida.

univalvis, (einfachgeflügelt) f. 132. conſtans folio unico, latere longitudinaliter fiſſo, uno latere dehiſcens, *Arum*, *Narciſſus*, *Levcojum*.

bivalvis, (zweyfach geflügelt) f. 133. conſtans vagina, profunde in duas lacinias fiſſa.

dimidiata, (getheilt) exhibens valvam unicam a baſi ad apicem longitudinaliter hiantem, inſtar ovi longitudinaliter dimidiati, ſ. latere tantum inferiore fructificationem obveniens.

monophylla ex uno folio conſtans, *Narciſſus*.

diphylla, *Stratiotes*. imbricata, *Muſa*.

118. CALYPTRA, (Kappe, Hut) f. 136. calyx muſci cucullatus, antheræ, ſuperimpoſitus, καλυπτρα tegmen capitis muliebre, operculum quodvis a καλυπτω velo. *Polytrichum commune*. (Adianthum aureum offic.)

recta, (gerade auf den Deckel) perpendiculariter, undique æqualis.

obliqua, (ſchief) oblique incumbens, ad aliquot latus flexa.

119. VOLVA, (Wulſt, Kappe, Kragen bey den Pilſen, Schwæmmen) f. 139. b. calyx fungi membranaceus, undique lacer.

approximata, (nahe am Hute) ſcilicet pileo (f. cit. a.) vicina,

remota, (in einiger Entfernung davon,) ab eodem notabiliter diſtans.

remotiſſima, a capitulo ſpatio recedens.

120. COROLLA, (Blüthe) eſt liber plantæ in flore præſens; ſive eſt folium illud, aut foliola illa, quæ ſubſtantia teneriore, forma ſpecioſiore, ac colore alieno plerumque ceteris partibus præſtant, (quæque nunquam fiunt ſeminis involucrum, Tournefort) eſt membrana floris interior, colore ut plurimum eleganti, & a calyce diverſo.

Corolla diſtinguitur a *Perianthio*, quod illa cum ſtaminibus ſitu alternat, Perianthium autem opponitur.

aequalis, (mit gleichen Blättern) ubi partes corollæ figura, magnitudine & proportione conveniunt.

inaequalis, (mit ungleichen Bl.) ubi partes non magnitudini, ſed proportioni reſpondent, ut regularis flos evadat.

a) Partes *Petalum*, *Nectarium*, differunt quoad figuram, æqualitatem, marginem, proportionem, locum, durationem.

PETALVM, (Blumenblatt, Kronenblatt) eſt tegmen floris corollaceum, ſ. pars corollæ in plures diviſæ. Uſurpatur communiter hic terminus, quando corolla foliolis ſeu laminis a ſe invicem prorſus diſtinctis, nec baſi cohærentibus conflata eſt: Πεταλον folium expanſum, lamina bractea a πεταω pando, explico.

Petalorum numerus a baſi corollæ, laciniarum autem a medio limbi aut laminæ deſumendus eſt.

Partes. *Tubus*, (Röhre) baſis inferior cylindracea. f. 142. a. corollæ monopetalæ pars inferior tubuloſa. *Primula veris.*

tubi orificium, (Mündung, die innere Oefnung des Randes) apertura interior, marginis.

tubus vel *perforatus* (offen) vel *caecus* (zugeſchloſſen) ſi cæcus, in longitudinem tranſiens, eſt *calcar* (Sporn.)

unguis, (Nagel) f. 144. a. corollæ polypetalæ pars inferior, receptaculo affixa. *Saponaria*, *Dianthus caryophyllus.*

lim-

limbus, (Rand-Gebrähme, der breite flache obere Theil) f. 142. b. corollæ monopetalæ pars ſuperior dilatata.

limbus vel *integer*, (ganz) vel *laciniatus*, (geſpalten) vel *labiatus*, (in Lippen getheilt.)

Lacinia, (Lappen) ſunt partes corollæ, in quas limbus finditur. Laciniæ duæ, *Alſine*, *Circea*; tres, *Holoſteum*; quatuor, *Lichnis*; quinque, *Reſeda*.

Lamina, (geſpaltene, eingeſchnittene Platte.) fig. 144. b. corollæ polypetalæ pars ſuperior patula, lata, cum ungue angulum efficiens.

121. b) *monopetala*, (einblättrig) hæc *integra*, (ganz) *Anagallis*, *Oxalis*, *Convolvulus*, *Primula*.

2--3--4 *multidentata*, (zahnig), dum corolla baſi ita cohæret, ut lacinia altera absque alterius dilaceratione vix auferri queat; aut nexus ſaltem ſub diremptione laciniæ unius ab altera ſatis conſpiciatur. (conf. 106.) *Veronica*.

Dipetala, *Circaea*; *tripetala*, *Alisma*, *Sagittaria*; *tetrapetala*, *Tetradynamia*; *pentapetala*, *Umbellatae*; *hexapetala*, *Tulipa*, *Lilium*; *ennea petala*, *Liriodendrum*.

polypetala, (vielblätterig) (ut 106) ab ordinibus inſertionum numerus determinatur, ut in *Hepatica*.

apetala, (wo die Blumenblätter fehlen.)

fiſſa, (2--12--multi--fida (107.) 2--12- vielſpaltig.)

partita, 2--multi--*partita* (107.)

bifidus, *Utricularia*; *trifidus*, *Alisma*; *quadrifidus*, *Rhinantus*; *quinquefid. Nicotiana*; *ſexfid. Pavia*; *octofid. Tormentilla*; *decemfidus*, *Potentilla*, *Fragaria*; *duodecimfidus*, *Lithrum*.

122. c) *regularis aequalitate*, (ähnlich, gleichförmig) ſi limbus, laciniæ in monopetala, laminæ in polypetala, magnitudine forma æquales ſunt, ſ. æqualis figura magnitudine & proportione partium. *Lychnis*, *Aquilegia*.

irregularis, (unähnlich, ungleichförmig) quæ limbi partibus figura, magnitudine aut proportione diverſa eſt. *Echium vulgare*, *Aconitum*, *Lamium*.

inaequalis, (ungleich, unähnlich) ubi partes non magnitudini, ſed proportioni reſpondent, ut regularis flos evadat. *Butomus.*

aequalis, ubi in omnibus conveniunt. *Lychnis*, *Primula.*

alternis brevioribus, *Tormentilla*, *Potentilla.*

123. d) FIGVRA *globoſa*, (kugelrund, gleichförmig, einblätterig) quæ figura prope globum refert. *Hyacinthus botryoides*, *Cucubalus.*

clavata, (keulförmig) *Silene.*

reflexa, (eingebogen) *Aſclepias.*

erecta, (aufrecht) *Primula*, *Nicotiana.*

campanulata, *campaniformis*, (glockenförmig) ventricoſa absque tubo. *Campanula*, *Tulipa* f. 132.

infundibuliformis, (trichterförmig) cujus limbus conicus tubo impoſitus: interior pars in tubum deſinit, ſuperior in conum inverſum ſ. in diſcum dilatata, *ſimplex*, qui e cono in tubum coarctatur. *Primula veris*, *Cynogloſſum officin.*

hypocrateriformis, (flach, präſentirtellerförmig) f. 142. cujus limbus planus tubo impoſitus: qui hypocrateram ſ. vas quod poculis inter bibendum ſupponi ſolet. *Myoſotis. Vinca. Jaſminum.*

rotata, (radförmig) cujus limbus planus, nulli tubo impoſitus, rotæ formam exhibet. *Borrago*, *Anagallis*, *Luſimachia.*

caryophillata, (nelkenförmig, vielblätterig) in quo petala ex ipſo calice tanquam e tuberculo emergunt. *Caryophylli*, *Linum.*

roſacea, (roſenförmig) *malvacea*, (malvenartig.)

ringens, (rachenförmig.) *irregularis* in duo labia perſonatus.

rectiformis, (Blumenblatt in 2 Lippen geſpalten) limbo irregulari in partes duas ſ. duo labia hians.

labiata, *labia*, (lippenförmig) ſuperius, inferius, dicta partito, pro ringentis labio inferiori ſæpe ſumitur: ſ. terminatur in fiſtulam, ſuperne labium amplius vel unicum l. geminum, in quo piſtillum abit in fructum conſtantem, ex 4 ſeminibus in ipſo calyce tanquam capſu-

sula propria, matureſcentibus. *Salvia*, *Horminum.*

rictus, (Rachen) eſt hiatus inter duo labia.

faux, (Schlund) eſt hiatus tubi corollæ, ubi inter lacinias corollæ tubus terminatur, eſt vel *apertus* vel *nudus*, l. *clauſus*, l. *coronatus*, l. *tectus.*

galea, (Helm) ringentis labium ſuperius. *Iris.*

barba, (Bart) labium inferius repletum. *Iris.*

palatum, (Gaumen) eſt gibboſitas prominens in fauce corollæ.

calcar, (Sporn) eſt nectarium ex corolla in conum extenſa.

laciniata, (eingeſchnitten) laciniis munita.

urceolata, (kannenförmig) quæ urceoli ſ. pelvis inſtar inflata & undique gibba eſt.

cyathiformis, (becherförmig) cum ex cylindro ſuperne parum dilatata eſt.

connivens, (nicht geöfnet) cujus limbi lobi apicibus convergunt.

lacera, (zerriſſen) cujus limbus tenuiſſime diſſectus eſt.

perſonata, (maſquirte Blumen) ob ſimilitudinem cum capite animalis: eſt corolla ringens labio alterutro longiore, ſed inter labia palato clauſa. *Antirrhinum linaria*, *Euphraſia.*

cruciata, (Kreuzblume, 4 ähnliche Blätter, wie ein Andreas-Kreuz) *cruciformis*, ſeu tetrapetala regularis. f. 144. quæ petalis quatuor æqualibus patet: *Braſſica*, *Cheiranthus cheiri.*

tetra-pentapetala, irregularis (4-5 unähnliche Blätter.)

concava, (hohl) limbo aut uniformiter *laminis.*

patens, (offenſtehend) limbo vel laminis in planum fere dilatatis.

patentiſſima, (ſehr weit offenſtehend) limbo horizontali, *Anthericum.*

papillionacea, (Zwiefalterblüte, Schmetterlingsblum) (a papilione volitante ſic dicta Tournefortio.) petala 4. irregularia habens, *Piſum*, *Lathyrus.* conſtat

Concha, *Carina*, (Schifgen, Schnabel) quæ eſt petalum inferius cymbiforme.

Alis, (Flügel) quæ ſunt petala lateralia ſolitaria.

Vexil-

Vexillo, (Fahne, ſehr ausgebreitet) quod eſt petalum ſuperius, ad ungues ſæpe bifidum, includens ſtamina & piſtillum.

roſacea, (roſenähnliche) ſi pentapetala regularis, (mit 5 ähnlichen Blättern) ſeu umbellata (Schirmblume) ex pluribus in orbem poſitis, modo petala florum. *Roſa*, *Ranunculus*, *Poeonia*. Si hexapetala (mit 6 Blättern) tum *liliacea* (Lilien-Blüthe) planta audit, *Tulipa*, *Aſphodelus*.

124. e) *Compoſita*, cum floſculi ſeſſiles [94] plures ſupra receptaculum commune integrum & intra commune *perianthium*. (111) continentur, ſimulque antheris in cylindrum connatis inſtructi ſunt.

ligulata, (flach, zungenförmig, geſchweift) (ſemifloſcula Tournef.) dum corollulæ floſculorum omnes planæ, verſus ambitum expanſæ ſunt, verſus exterius latus.

tubuloſa, (röhrig) [floſculoſa Tournef.] cum corollulæ ſingulæ tubuloſæ ſubæquales ſunt.

radiata, (flach, beſtrahlt) ſi corollulæ diſci tubuloſæ, in ambitu vero floſculi difformes ſunt, & quidem in ambitu floſculis *ligulatis*: [flores radiati Tournef.] *Aſter*, *Jacobaea*.

tubuloſis, *Centaurea*. l. *ſubnudis*, *Artemiſia*.

undulata, (gewäſſert) (53) *Glorioſa*.

plicata, (gefalten) (53) *Convolvulus*.

torta, (gewunden) (170) *Aſclepias*, *Vinca*.

revoluta, (zuſammengerollt) *Aſparagus*.

Quoad *Marginem integra*, (ganz) *diviſa*, (geſpalten) ſerrata, (ſägförmig) *Tilia*. dentata, (gezähnt] *Sideroxinon*. *crenata*, (ausgezackt) *Linum*. *hirſuta*, (rauch) *Hypericum*. *Ciliata*, (haaricht) *Ruta*, *Tropaeolum*.

quoad *Durationem*, *marceſcens*, (verwelkend) contabeſcit nec decidit, *Campanula*, *Orchis*, *Cucumis*, *Cucurbita*, *Bryonia*. *caduca*, (abfallend) ad explicationem floris, *Thalictrum*. *perſiſtens*, (beſtändig) ad maturitatem fructus, *Nymphaea*. *decidua*, (abfallend) cum floris caſu, *Actaea*.

125. f) COLOR, ſequentes inprimis notantur.

hyalinus, (ὑαλος) vitrum, ſeu *vitreus*, (glasartig.)
undulatus, (gewäſſert) ſ. aqueus.
albus, (weiſs) lacteus, niveus, murinus ſeu myrrhinus ſ. porcellaneus.
cinereus, (aſchgrau) incanus, lividus, plumbeus.
niger, (ſchwarz) *pullus*, (erdſchwarz) *pene niger*, (ſchwarzlecht.) *fuſcus* (braun.)
luridus, (ſchwarzgelb) ater, piceus.
luteus, (bleichgelb) ſulphureus, flavus.
fulvus, (dunkelroth) croceus, flammeus.
gilvus, (wachsgelb) *teſtaceus*, (muſchelgelb.)
ferrugineus, (eiſenroſtgelb.)
coccineus, (ſcharlachroth) ruber, ſanguineus, incarnatus.
puniceus, (braunroth) Xerampelinus, roſæ ſiccæ color, cujusmodi eſt in autumnalibus vitis foliis, (a ξηρος ſiccus & ἀμπελος vinea, vitis.)
purpureus, phœniceus, tyrianthinus (a flore tyrio, qui purpurei eſt coloris, vel a tyrius & janthinus ἀπο τοῦ ἰὸς, viola,) *violaceus*, janthynus, cæruleo purpureus.
caeruleus, ſubcæruleus, cyaneus (a Κυανος cæruleus color, qualis cœli eſt, aqua marina aliis.)
viridis, praſinus (a πρασον) porrum, thalaſſinus (a θαλασσα mare) ad colorem fluctuum ejus.
glaucinus, cæſius, color ex viridi albus, vel ex viridi cæruleſcens, ut *Beryllus* (lapis pretioſus.)

Mutationes colorum in floribus mutabiles.

Ruber in album; *Serpyllum*, *Dianthus*, *Roſa*, *Papaver*, *Fumaria*, *Geranium*.
Cæruleus in album; *Campanula*, *Convolvulus*, *Aquilegia*, *Viola*, *Borrago*, *Scabioſa*.
Luteus in album, *Melilotus*, *Verbaſcum*, *Tulipa*, *Chryſanthemum*.
Albus in purpureum, *Datura*, *Piſum*, *Bellis*.
Cæruleus in luteum, *Crocus*.
Ruber in Cæruleum, *Anagallis*.
Mutatio multiplex: *Aquilegia* cærulea in rubrum, album. *Polygala* cærulea in rubrum, album. *Mirabilis* rubra in luteum, album. *Impatiens* lutea in rubrum, album. *Primula* rubra in lu-

luteum, album. *Cheiranthus* lutea in cæruleum, album.

Plantarum colores varii, variis partibus magis proprii ſunt.

Niger frequenter in *Radice* ſæpe in *ſeminibus*, rarius in *Pericarpio*, rariſſime in *corolla*.

Viridis proprius *Herbae* & *calyci*; rariſſimus in *Corolla*.

Hyalinus frequens in *Filamentis* & *Piſtillo*.

Luteus frequens in *Antheris*, nec infrequens in *corollis* præſertim *autumnalibus* & ſemifloſculoſis T.

Albus frequens in *Corollis* vernalibus & *Baccis* dulcibus.

Ruber frequens in *floribus* æſtivis, & *baccis* in umbra natis acidisque.

Caeruleus nec infrequens in floribus.

Pericarpia baccata ſunt primum viridia, dein *rubra*, demum albida; matura etiam variant colores albos, rubros, cæruleos, præſertim in Pyris, Prunis, Ceraſis; *Solanum annuum*, baccis luteis; *Rubus vulgaris major*, fructu albo.

Semina, rarius licet, colores etiam mutant.

Papaver hortenſe, ſemine nigro & albo.

Avena vulgaris & alba & nigra.

Phaſeolus vulgar: fructu violaceo & fructu ex rubro nigroque variegato, & fructu albo, venis nigris & lituris diſtincto.

Radix rarius colore variat; *Daucus ſativus*, radice alba, lutea, aurantii coloris, & atro rubente.

Folia rarius mutant viridem colorem, uti in *Amarantis*, interdum tamen maculas aſſumunt.

Ranunculus hederaceus, atra macula notatus.

Orchis palmata, paluſtris, maculata. *Lactuca* maculoſa.

Herba tota ſæpe alienum colorem induit. *Abrotanum* cauliculis albicantibus. *Artemiſia* vulgaris major caule ex viridi albicante. *Atriplex* hortenſis rubra.

Ubi corolla deeſt, perianthium communiter magis coloratum eſſe ſolet, præſertim tempore floreſcentiæ, ut in *Ornithogalo*, *Perſicaria*, *Polygano*.

Ca-

Calyx aut Corolla minus colorata ubi obſervantur, ibi folia ſæpe colorem induunt, ut in *Amarantho tricolore.*

126. NECTARIVM, (Saftgrube, Honigbehältniſs, Saftbehältniſs) eſt pars mellifera flori propria f. 145. a. Humor melleus ſecernitur in plerisque floribus. Monopetalorum tubus plerumque mel continet.

campanulatum, (glockenförmig) *Narciſſi*: f. 146. a.

cornutum, (hornförmig) *Aconiti*: f. 147. a.

cornutum ſ. calcaratum in calyce *Tropaeoli*, *Parnaſſiae.* f. 148.

Conſtans phalangibus quinque.

proprium, (beſonders gebildete) quod [non petalo] calyci, receptaculo communi aut germini adnatum, diſtinctumque eſt; *Delphinium conſolida.*

calycinum, (vertieft im Kelche) calyci inſertum.

petalinum, (Vertiefungen in den Safthonigblättern) petalis inſertum, (mox foveam, mox glandulam repræſentat,) quod in quadam ipſius petali parte reſidet: *Lamium* ad baſin tubi; *Ranunculus*, & *Fritillaria* (Corona imperialis,) ad unguem petali: *Orchis*, *Lilium*, *Berberis.*

127. STAMINA (Staubgefäſſe) f. 149. a. e. f. 150. 143. d. e. ſunt viſcus pro pollinis præparatione.

Partes Filamentum, Anthera, Pollen, organum genitale maſculinum.

FILAMENTVM (Staubfäden) f. 150. a. 149 c. 143. d. eſt pars elevans annectensque antheram (131); eſt pes antheræ quo vegetabili alligatur: iuterdum deficiunt vel tam parvæ ut planæ deeſſe credantur, tum eorum loco antheræ numerantur.

Differunt ſtaminum *filamenta*, quoad Numerum, Figuram, Proportionem, Situm.

Antheræ differunt quoad 1. Numerum, Loculamenta, Defectum, 2. Figuram, Dehiſcentiam, 3. Connexionem, 4. Situm.

Numero, Monandria, Diandria &c. μονος, unus ανηρ ϖ ανδρος vir vel aliis monoſtemonis, diſtemo-

monis, στημον τε στημονος Stamen vel quod denuo apud alios vim vocis eandem habet monanthera, dianthera, præpositis ubique numeris græcis (ad Syst. Linn. Halleri, Ludwigii, Royeni, Gleditschii &c.)

laciniis (120) (Lappen) in connatis 2. *Salvia* 3. *Fumaria*. 9. *Diadelphia*, class. Linn.

128. FIGVRA.

Capillaria, (haargleich) instar capilli tenuia, secundum longitudinem æqualiter crassa, *Plantago*.

plana, (flach) quæ compressa membranæ instar tenuia & lata sunt. (53) *Ornithogalum*, *Allium porrum*.

cuneiformia, (39) (keilförmig) *Thalictrum*.

spiralia, (gekräuselt) quæ spiræ ductum sequuntur. *Hirtella*.

subulata, (40) *Tulipa*.

emarginata, (46) (ausgeschnitten) *Allium porrum*.

reflexa, (33) (krummgebogen) *Glorioſa*.

hirsuta, (rauch) lana rigidiuscula induta: *Verbascum*, *Thapsus*, *Tradescantia*, *Anthericum*.

129. INSERTIONE VEL SITV qui a botanico nunquam non sedulo investigandus, quod constantissimus sit, huic fundamento solidissimo, cell. Gleditsch. noviſſimum suum systema superstruxit.

calyci oppoſita scil. ejusdem laciniis foliolisve e regione. *Urtica*.

calyci alterna, si inter lacinias stamina consistant, *corollae inserta in* monopetalis plurimum vix in polypetalis: *Tulipa*, *Elaeagnus*.

calyci inserta, rarius in apetalis; Rosa cum universa classe, Icosandra. Linn.

pistillo inserta, in pauciſſimis, *Orchi*, *Aristolochia*, cum reliquis ejusdem classis, *Gynandrae sociabus*.

receptaculo inserta, communiter, uti calyx & corolla.

130. PROPORTIONE.

aequalia magnitudine [gleich, lang] eandem servantia longitudinem.

inaequa-

inaequalia magnitudine (ungleich lang) ſalva figura, aliquot majoribus vel minoribus. *Lychnis*, *Daphne*, *Saxifraga*.

irregularia magnitudine, figura, directione, diverſa: *Lonicera periclimenum*, *Didynamia*.

longiſſima, (ſehr lang) *Plantago*.

breviſſima, reſpectu corollæ vel calycis in apetalis. *Triglochin*.

connata, (zuſammengewachſen) in unum corpus coalita: claſſis monadelphia, di-- & polyadelphia. Syſt. Linn.

libera, (frey) nullibi annexa.

ſtamina caſtrata, (unfruchtbare Staubfäden) ſi filamenta plane deſunt, fructificationi neceſſaria.

131. ANTHERA, (Staubfächer, Staubbeutel) ſ. apices, (Spizen) ſ. capitula (Häuptlein) ſ. teſticuli (Hoden die Körnlein) f. 143. e. 149. f. g. 150. b. pars floris gravida polline (132) quod matura dimittit. (ανθηρος, floridus,) (*Muſcis* capitulum eſt Anthera.) —

Pileus fungorum eſt orbiculus plus minus horizontaliter expanſus, ſubtus fructificationes gerens.

Antherae ſunt plantarum genitalium maſculina, & pollen vera genitura.

Didynamiſtis ſtamina adſcendunt ſub corollæ labium ſuperius, quo & ſe piſtillum flectit.

Monoeciae pleræque flores ſtamineos ſupra piſtillum floris gerunt. *Zea*, *Ricinus*.

Monoeciae & *dioeciae* flores maſculi eodem tempore antheras quo piſtilla ſtigmata perficiunt. Qui flores ſtamineos e. g. *Melonis*, *Cucumeris*, diligenter auferunt, fructus non obtinent, i. e. caſtratio.

Anthera verſatilis & *incumbens*, quæ latere affigitur, *erecta*, quæ baſi affigitur.

Antherae vel *pares* (eben ſo viel) vel *plures* (mehrere) vel *pauciores*, (wenigere) quam filamenta *diſtincta* (einzeln vor ſich) ut una alteri nulla ſui parte cohæreat: flores plerique *ſimplices* (einfach, unterſchieden.)

connatae, *coalitae*, (zuſammen gewachſen) ubi plures inter ſe firmiter connexæ, ſ. in unum

corpus concretæ. claſſis *Syngeneſia* Linn. f. flores *compoſiti* aliorum.

lateralis, (ſeitwärts) lateri filamenti affixa. *Paris. Aſarum.*

verſatilis, *incumbens*, quæ parte laterali media apici filamenti incumbit. *Tulipa*, *Gramina.*

Anthera unica in ſingulo filamento, *plerique*; in filamentis tribus; *Cucurbita*; in filamentis quinque, *Syngeneſiae.*

Antherae duae in ſingulo filamento; *Mercurialis.*
tres in ſingulo filamento, *Fumaria.*
quinque in tribus filamentis, *Bryonia.*
quinque in ſingulo filamento, *Theobroma.*

Loculi, loculamenta, (Fächer) ſunt concamerationes ſ. cava difflato polline in corpore antheræ conſpicua.

Sunt *bi -- tri -- quadri -- multiloculares*, (2-3-4. vielfachig.)

unicus, *Mercurialis*; *geminus*, *Helleborus*; *ter*, *Orchis*; *quater*, *Fritillaria*; unde unilocularis, bilocularis &c. anthera audit.

Apertura, *dehiſcentia*, (Oefnung) per quam ex cavo pollen ejaculatur f. 149. f. latere; *Levcojum*; plantæ pleræque apice, *Solanum*: a baſi ad apicem diſcedens, *Epimedium.*

Figura. oblonga, (langlecht,) *Lilium. globoſa*, (kugelrund) *Mercurialis*: *anguloſa*, (eckigt) *Tulipa*: *ſagittata*, (pfeilförmig) *Crocus*: *angulata*, (winklicht) *Tulipa*: *cornuta*, (hornförmig) *Erica*, *Pyrola*:

Connexione; apice, *Colchicum.* baſi, *plerique.* latere, *Canna.* Nectario, *Coſtus. Situ*, in filamentis apice *plerique*, latere, *Paris*, *Aſarum*, piſtillo, *Ariſtolochia.* receptaculo, *Arum.*

132. POLLEN, (Blumenſtaub, Saamenſtaub) f. 151. a. pulvis floris, humore appropriato madefactus, atomos, b. ruptus, elaſticos ejaculans: repræſentat hæc figura pulviſculum pollinis unicum ex iis qui numero immenſo ex anthera unica cadunt f. 149. f. microſcopio viſum cum *halitu elaſtico* ſ. *aura ſeminali* b. ſub ipſius ruptione exploſa. (Needham decouvr. microſcop. p. 83. t. 5. fig. 5.)

Geni-

Genitura Plantarum.

Omne *Pollen* eſt veſiculare & continet materiam impalpabilem, quam explodit, & determinata ut Semina. Mediante itaque pollinis antherarum elapſu, ſupra ſtigmata nuda, vegetabilium generatio fit.

Generationis modum ſequentes probant obſervationes.

Stigmata ſeſe flectunt ad antheras, dein exſeruntur, ex *Diantho*, *Paſſiflora*, *Nigella* hoc patet.

Piſtillum ubi breviſſimum, connivent antheræ.

Antheræ ſupra Stigmata. *Saxifraga.*

Connivent, dum efflant pollen antheræ, uti in *Celoſia.*

Comprimit corolla digitis antheras ad Stigmata in *Teucrio.*

In diclinis flores ante germinationem foliorum plerumque prodeunt, ne folia tegant piſtilla. *Salix*, *Populus*, *Corylus.*

Pluviæ combibunt pollen ut in ſtigmata cadere nequeat, hortulanis notiſſimum, in drupiferis & pomiferis: agricolis deteſtabiles in agris ſecalinis.

Fumus abſorbet humidum ſtigmatis.

Flores nutantes gaudent piſtillo ſtaminibus longiore, ut cadat pollen in ſtigma. *Campanula*, *Leucojum.*

Flores ſubmerſi adſcendunt ſub floreſcentia. *Nymphaea*, *Stratiotes*, *Miriophyllum*, *Potamogeton.*

Syngeneſia fruſtanea ubi ſtigma deeſt, ibi nulla fœcundatio. *Centaurea*, *Helianthus.*

Tulipae ſolitariae ſi auferantur antheræ ante caſum pollinis, ſterilis evadet.

Figura

globus echinatus, (ſtachlicht) inſtar echini ſ. erinacei mucronatus. *Helianthus.*

perforatus, (durchbohrt) *Geranium.*

didymus, (Zwilling) figura ſcroti animalis, levi ſulco ſubbipartiti (ad ſimilitudinem antheræ didymæ f. 150. b.) *Symphitum.*

rotatus, (radförmig) *dentatus*, (gezähnt) *Malva.*

angulatus, (winklicht) *Viola.*

reniformis, (nierenförmig) *Narciſſus.*
philyra, (Lindenbaſt) convoluta, *Borrago.*

133. PISTILLVM fig. 143. (Staubwege, zuſammengenommene Stempfel) eſt pars plantæ in medio hærens, qua viſcus, fructui adhærens, pro pollinis receptione. (Organum genitale fœmineum,) a filamentis circumcinctum, conſtans germine, ſtylo, ſtygmate, intra antheras communiter collocatum.

Piſtilla differunt 1. quoad numerum, lacinias, 2. figuram, 3. longitudinem, craſſitiem, 4. ſitum.

134. GERMEN, (Fruchtknote) f. 143. a. 149. b. 135. a. eſt rudimentum fructus immaturi in flore, exiſtens præcipue eodem tempore, quo antheræ pollen dimittit.

Ovarium, (Eyerſtock) in ejus inferiore parte.
ſuperum, (obere Fruchtknoten) corollæ incluſum, ſi ſupra floris receptaculum (155) ſitum, vel cugus piſtillum abit in fructum ex mente Tournef. unde evadit flos ſ. calyx inferus Linn. aut hypocarpius (ὑπο ſub καρπος fructus) Gleditſchio: *Paris*, *Prunus*, *Ceraſus*, *Berberis*, *Pulmonaria.*
inferum, (untere Fruchtknoten) infra corollam poſitum, ſi receptaculo (155) floris ſubjectum; vel cujus calyx abit in fructum ex mente Tournef. unde *flos* fit *ſuperus* Linnæo, *epicarpius* (ἐπι ſuper) Gleditſchio. *Pyrus communis*, *Pyrus malus*, *Galium.*

135. STYLVS, (Griffel) *columna*, (Stiel, Säule, Staubweg) f. 143. b. 149. c. 152. b. pars piſtilli, ſtigma (137) elevans a germine, ſ. pes *ſtigmatis*, connectens ſtylum cum *Germine.*
Numero, qui patet ex ſyſtemate ſexuali, *monodi*--&c. *polygynia* (106) a γυνη femina.
ſimplex, (einfach) *duplex*, *triplex*, *multiplex* (2. 3. vielfach)

Figura
cylindricus, (walzenförmig) inſtar ſcipionis (15.)
filiformis, (fadenähnlich) inſtar fili.
ſetaceus, (borſtenförmig) inſtar ſetæ.
craſſus, (dick) *angulatus*, (eckig) (15) *Canna.* *ſubulatus*, (56) *Geranium.* *capillaris*, (128) *Cerato-*

ratocarpus. clavatus ſ. *craſſior* ſuperne. (93)
Levcojum vernum.

Duratione
perſiſtens, (bleibend) diu durans. *Tetradynamia.*
marceſcens, (verwelkend) mox effloreſcens.

136. *Proportione*, ad ſtamina (64.)
longiſſimus: Campanula, Zea, Mays, Scorzonera.
breviſſimus, nullus: Papaver, Tulipa.
longitudine ſtaminum: plerique. Nicotiana.
craſſior ſtaminibus, *Levcojum.*
tenuior ſtaminibus, *Ceratocarpus.*
aequalis, craſſitie: *Lanium.*

Diviſione non penitus ad baſin pertingente.
bifidus, angulo acutiſſimo: *Polyganum perſicaria.*
dichotomus, angulo patente recto bifariam diviſus. (22)
bi -- tri -- multifidus (vielfach): *Campanula; quadrifidus, quinquefidus: Geranium.*

Situs in apice germinis plerique, ſupra infraque germen, *Euphorbia;* ad latus germinis, *Icoſandria, Polygynia.*

137. STIGMA, (Spize, Narbe) f. 143. c. 149. d. 152. c. eſt ſummitas piſtilli madida humore, pollen rumpendo-eſt apex germinis roridus.

Stigmata germini ubique adnexa ſunt genitalia fœminina.

Viget enim *ſtigma* eodem tempore, quo antheræ pollinem efflant.

Cadit & marceſcit *ſtigma* poſt caſum antherarum in plerisque; ergo effectus Subfloreſcentia.

Abſcinditur ſtigma, ſic *caſtratio* fit in omni flore.

Syngeneſiſtæ raro ſteriles, ubi ſtigmata quaſi perforant antheras.

Numero
1. plerisque 2. *Jaſminum, Syringa.* 3. *Campanula* &c. 4. *Epilobium.* 5. *Pyrola.*
lacinia convoluta: Crocus.
capillares: Rumex acetoſa.
revoluta: Dianthus, Taraxacum, Campanula.
flexa ſiniſtrorſum (14) *Silene.* dextrorſum: *Cucubalus.*

ſexpartitum: *Aſarum.*
multifidum, *Turnera.*

138. *Figura*
fiſſum, (geſpalten.)
capitatum, (köpffig) *Vinca.*
globoſum, (kuglicht) *Primula.*
ovatum, (eyförmig) *Gentiana.*
obtuſum, (ſtumpf) *Andromeda.*
cordatum, (herzförmig) *Rhus.*
truncatum, (zerſtümmelt) *Lathraea.*
oblique depreſſum, (ſchreg hinabgedrückt) *Actaea*, *Daphne.*
emarginatum, (am Rande erweitert) *Cynogloſſum*, *Pulmonaria.*
orbiculatum, (kreisförmig) *Berberis*, *Lythrum.*
peltatum, (mit einem Schild verſehen) *Nymphaea*, *Papaver.*
coroniforme, (kronförmig) *Pyrola*, *Erica.*
cruciforme, (kreuzförmig) *Populus.*
uncinatum, (gekrümmt) *Viola.*
canaliculatum, (ausgehöhlt) *Colchicum.*
concavum, (hohl) *Viola.*
angulatum, (wincklicht) *triangulare*, (dreyeckigt) *Lilium.*
trilobum, (dreylappig) *Tulipa.*
plumoſum, (fedrig) *Rheum*, *Gramina.*
pubeſcens, (erwachſen) *Cucubalus.*
barbatum, (mit einem Bart) *Vitia*, *Lathyrus.*
ſtriatum, (runzlicht) *Papaver.*
filiforme, (fadenförmig) *Zea mays.*
longitudine ſtyli, (ſo lang als der Griffel) *Portulaca.*
foliaceum, (blättrig) *Iris.*
Duratione
perſiſtens, *Nymphaea*, *Papaver.*
marceſcens communiter cum ſtylo.

139. PERICARPIVM, (Saamen-Behältniſs, Gehäuſe der Frucht) viſcus gravidum ſeminibus, quæ matura dimittit. (περι circum, καρπος fructus.) eſt vel *inflatum*, (aufgetrieben) cum inſtar veſicæ cavum ſit, nec repletur ſeminibus: *Fumaria cirrhoſa.*
articulatum, (gegliedert) articulis prædit: *Raphanus.*
priſmaticum, (dreyeckicht) cum lineare polyedrum ſit, lateribus planis.

Tur-

Turbinatum, (gewunden) cum fructus basi angustatur: *Pyrus.*
contortum, (gebogen) cum spiraliter contorquetur: *Thalictrum.*
acinaciforme, (säbelförmig) cum fructus instar cultelli compressus est, altero angulo longitudinali obtuso, altero acuto: *Mesymbrianthemum.*
nidulantibus seminibus T. cum semina in pericarpio baccato per pulpam dispersa sunt.
echinatum, (stachlicht) cum aculeis s. spinis undique adspersum, uti Echinus animal.
torosum, (fleischicht, starck) cum torulis, seu prominentiis hinc inde gibbum evadit: *Phytolacca.*
Species. Capsula, Siliqua, Legumen, Folliculus, Drupa. Pomum, Bacca, Strobilus, Semen.
CAPSVLA f. 159. 160. 161. (Schaale, Hülse) pericarpium cavum determinate dehiscens.
uni -- bi -- tri -- multicapsulare (1. 2. 3. vielhülsig) (aus mehr als einer Capsel) totidem capsulæ inferius versus basin connexæ, ut externe jam sic distinguatur.
unicapsularis, *Lychnis*: bicaps. *Paeonia, Asclepias.* tricaps. *Veratrum, Delphinium.*
quadricaps. *Rhodiola.* quinquecaps. *Aquilegia*, multicaps. *Caltha, Trollius.*
Partes.
Valvulae, (Klappen, Deckel) f. 160. a. sunt parietes fructum externe tegentes: parietes junguntur futuris, (Näten.)
valvulae externos parietes respiciunt, uti *Dissepimentum* loculamenta.
uni - bi - tri - quadri - multivalvæ, (1. 2. 3. vielklappich.)
bivalvis, *Chelidonium.* trivalvis, *Viola.*
quadrivalvis, *Oenothera.* quinquevalvis, *Hottonia.*
Loculamenta, (Fächer) f. 160. d. sunt concamerationes internæ vacuæ pro seminum loco.
uni -- bi -- tri -- multilocularis (1. 2. 3. vielfachig) a totidem loculamentis dicta.
unilocularis, *Primula.* bilocularis, *Hyosciamus.*
trilocularis, *Lilium.* quadrilocularis, *Evonymus.*
quinquelocul. *Pyrola.* sexlocularis, *Asarum.*

octolocularis, *Lini radiola*, decemlocularis, *Linum*.
multilocularis, *Nymphaea*.

Diſſepimenta, ſeptum, (Scheidewand) f. 160. b. parietes fructum interne diſtinguentes in concamerationes plures.

parallelum, (gleichſeitig) *Lunaria*.

contrarium, (entgegengeſezt) *Thlaſpi*.

Columella, (Säulgen) f. 160. c. uniens in centro parietes internos cum ſeminibus.

di -- tri -- cocca (2. 3. Knöpfe oder Fächer) eſt capſula bi--tri--locularis, bi--tri--valvis, cum ſeminibus intra ſingulos loculos ſolitariis. (κοκκος granum, κοκκων, granum cnidium.)

di -- cocca, *Mercurialis*, *Gallium*.

tri -- cocca capſula tribus nodis protuberans intusque intra loculamenta diviſa. *Euphorbia*, *Eſula*, *Ricinus*, (*Cataputia major*, off.)

didyma capſula duobus nodis extus gibba.

Semina in capſula adhærent, vel ſupra vel infra, vel in medio, vel lateraliter in trabibus quaſi.

140. SILIQVA, (Schotte) f. 155. eſt pericarpium bivalve, cavum, affigens ſemina, ſecundum futuram utramque.

SILIQVA, ſtricte dicitur, cum longitudo notabiliter ſuperat latitudinem.

Silicula, (Schötgen) ſi vix ſuperat longitudinem, & tamen latum, plerisque vis diminutivi valet, ſcil. ſi exiguæ ſimul molis ſit.

Figura, *orbiculata*, (kreisförmig) (38.) *Clypeola*.

cordata, (herzförmig) (42.) *Lepidium*; (Naſturtium hortenſe, off.)

obcordata (34.) *Thlaſpi*, (burſa paſtoris off.)

lobata, (lappich) (43.) *Biſcutella*. *globoſa*, (kugelicht) *Crambe*.

lanceolata, (lanzenförmig) (40) *Iſatis*.

ſubrotunda, (halbrund) (38) *Bunias*.

triquetra, tribus, *tetragona*, 4. lateribus longitudinaliter planis. *Eryſimum*.

compreſſa, (54) lateribus oppoſitis proxime ad ſe invicem accedentibus. *Thlaſpi*.

toruloſa, (dikknotig) torulis ſ. eminentiis hinc inde gibba. *Raphanus*, *Cochlearia*.

articulata, (gelenkig) ſi toruli æqualiter ſiliquam ambiunt, ut intervalla anguſtiora æqualia relin-

linquant, ſ. geniculis coarctatis intercepta. *Raphanus*,

141. *Diſſepimentum*, (Scheidewand) (139) ſiliquæ.
parallelum, (breite Scheidewand, gleichlaufend) ſi diſcum, ſeu partem planam opponat diſco valvæ: ſ. latitudine e diametro transverſali ad valvulas accedens. *Lunaria*, *Draba*.
transverſum, *contrarium*, (queer ſtehende Scheidewand) ſi marginis aciem obvertat diſco valvulæ.

142. LEGVMEN, (Hülſen, Schotte, Schelfe) f. 154. pericarpium bivalve, magis vel minus oblongum, affigens ſemina ſecundum ſuturam alteram & tantum ſurſum.
Figura
ovatum (38) *rotundatum* (40): *Aſtragalus*; *lineare* (40): *Galega*, *teres* (54): *Lotus*, *rhombeum* (41): *Ononis*; *turgidum*, (ſtrozend) inſtar veſicæ cavum repletum ſeminibus: *Ononis*, *Geniſta*, *Cicer*.
inflatum, (aufgeblaſen) inſtar veſicæ cavum, nec repletum; *Colutea*. *ſpirale*, (gewunden) *Medicago*. *contortum*, (gebogen) *Medicago* ſativa. *articulatum*, (gegliedert) per intervalla anguſtatum; *Coronilla*, *Hedyſarum*.
1--2--loculare (139) unilocularia pleraque; biloculare, *Aſtragalus*.
Legumen iſthmis interceptum (in beſondere Fächer getheilte Hülſe) in varia loculamenta interne transverſim diſtinctum.

143. FOLLICVLVS, *Conceptaculum*, (Fruchtbalg) vaſculum plerumque aere diſtentum, *cavum* ex unico legumine. ſ. Pericarpium univalve, altero latere longitudinaliter dehiſcens, nec ſuturæ ſemina adfigens. f. 153. *Vinca*, *Aſclepias*. (vincetoxicum off.); pulpa diſtenſum: *Tabernaemontana* (exotica.)
1--2--*valvis*, ſi maturus dehiſcens in valvas totidem ſecedat.
Figura valvis, lobatus (43) erectus. (33) refractus, (91.)

144. DRVPA, (Steinfrucht) f. 157. pericarpium externe coriaceum, craſſum interne carnoſum, farctum, ſine valvis, nucem (154) continens, ſingulis capſulis.

ſucculenta, (ſaftig) humorem continens. *Prunus*, *Ceraſus*.

ſicca, (trocken) humore carens. *Amygdalus communis*.

145. POMVM, (Apfel) f. 156. (Birne, Kernfrucht) e carne conſtans, circumdata capſula, pericarpium farctum, evalve, capſulam (139) continens.

Figura: *turbinatum*, *Pyrus communis*. *globoſum*, *Pyrus malus*.

loculamentis, 1--2--3--4--5 loculare.

umbilicus fructus eſt fovea relicta, ubi antea floris ſuperi receptaculum fuit, calyce exarido plerumque cincta. *Pyrus*.

146. BACCA, (Beere) Acini, (kleine Beere) fig. 158. pericarpium farctum evalve, ſemina ſingula cæteroquin nuda continens. *Vitis ſucculenta*.

ſeminum numero

mono -- di -- tri -- &c. polyſperma (1-2-3-vielkörnig) (106.)

loculamentis, in bacca non nimis matura & molli optime videndis.

1--2--3 -- locularis.

recutita, inſtar glandis ferme præputio tectæ: *Taxus*.

ſemina nidulantia, (zerſtreute Saamen) cum in pericarpio baccato per pulpam continuam diſperſa ſunt.

147. STROBILVS, *Conus*, (Zapfen) f. 138. pericarpium ex amento (Käzlein) factum (116) ſquamis induratis.

Figura totius: *conoideus*, *globoſus*. &c. *ſquamarum*, determinatur terminis foliorum.

148. SEMEN, (Saamen) eſt pars vegetabilis, decidua, novæ plantæ rudimento fœta, pollinis (132) irrigatione vivificata; vel eſt novum vegetabilis rudimentum: humore rigatum, veſica tunicatum.

Partes ſeminis optime in conſpectum prodeunt, ſi ſemen quoddam majus, v. c. Phaſeoli, Piſi, Cucurbitæ, Tritici, aqua macerentur, donec germinet, dein diſſecetur.

Pars eſſentialis ipſius eſt:

Corculum, (Keim) ipſiſſimum novæ plantæ primordium intra ſemen, ſ. punctum vitæ ſub minima mole, hilo proximum.

Sedes ejusdem eſt vel in capite vel baſi ſeminis, & uti gemma creſcit in infinitum.

Plumula, (ſchuppige Pflänzgen) pars corculi ſquamoſa adſcendens.

Roſtellum, (Würzelgen) pars corculi ſimplex, deſcendens baſis plumulæ, radices agens, olim matri contigua.

Seminis eſſentia conſiſtit in *corculo*, quod *cotyledoni* adnectitur, & ab eodem involvitur, dein tunica propria arcte veſtitur.

Propagines muſcorum ſunt ſemina, deſtituta tunica, & cotyledonibus, adeoque nudi corculi Plumula, ubi Roſtellum infigitur calyci plantæ.

149. *Partes minus eſſentiales*, nulli tamen fere plantæ, exceptis muſcis deficientes.

Cotyledon, (Kern) corpus laterale ſeminis, bibulum, caducum.

monocotyledon, (aus 1 Stück) plantæ bulboſæ. *Allium*, *Cepa*.

dicotyledon, (aus 2 Stücken) pleræque plantæ. *Phaſeolus*, *Piſum*, *Melo*.

polycotyledon, (aus mehreren Stücken) plantæ pauciſſimæ: *Pinus*. 10. *Cupreſſus*. 5. *Linum*. 4.

Hilum, (Narbe) cicatrix externa ſeminis, ab ejusdem affixione in fructu: evidentiſſimum in *Cardioſpermo*, *Staphylea*, *Phaſeolo*.

Arillus, (Umſchlag, Haut) tunica propria exterior ſeminis, ſponte ſecedens, quibusdam *Calyptra* dictus. *Cucumis*, *Dictamnus*.

a) *ſucculentus*: *Evonymus*.

b) *cartilagineus*, ſiccus, durus, elaſticus. *Citrus*.

tectum, (eingeſchloſſene, bekleidete Saamen) incluſum pericarpio: unde planta *angioſpermia*. (ἀγγος vel ἀγγειον, vas, & σπερμα ſemen.)

nudum, (bloſe, nackende Saamen) ſi ſemen ſponte ſua illico viſui pateat, unde planta evadit. *gymnoſpermia* (γυμνος nudus) (ganz bloſs liegende Saamen) *Matricaria*.

150. *Numero*. *mono* -- *di* -- &c. *polyſpermum*. (106) (1. 2. 3. vielſaamige.)

gymno-

gymnodiſpermum, ſemen nudum geminum.
Seminum fertilitas in plantis ſæpe inſignis, ex una radice, unica æſtate ſemina, e. g. *Zeae* 2000. *Inulae*, 3000. *Helianthi*, 4000. *Papaver*, 32000. *Nicotianae*, 40320.

151. *Figura.*
Cordi--reniforme &c. (Herz-nierenförmig) a figura cujusque rei ſimilis, manu dextra tamen notioris: ut
echinatum, (ſtachelicht) a ſimilitudine animalis, aculeis ſ. ſpinis rectis, undique horridis. *Lappula*, *Myoſotis.*
dentatum, (gezähnt) *cinctum*, (umringt) *Bryonia.*
ovatum. (eyförmig.)
Loculis, (Fächer) in plerisque uniloculare, *biloculare in Corno*, *Xanthio*, (Bardana minor off.)

152. *Superficie.*
ſcabrum (52) læve, glabrum. (48) rugoſum, (50) &c.
Conſiſtentia 1. *oſſeum* (beinern) *lithoſpermum*, *Nuces*, *Corylus.*
calloſum cartilagineum, (knorplicht) *Citrus.*

153. *Corona*, (Krone) calyculus eſt adhærens, quo volitat, ex perianthio floris: *Scabioſa.*
Pappus, (Wolle, Haarkrone) f. 162. Corona pennacea, piloſave, quo volitat ſemen. *Taraxacum.*
1. *ſtipitatus*, (ſtockig) ſi adeſt filum. f. 162. d. elevans, connectensque pappum & ſemen. *Lactuca.*
2. *ſeſſilis*, (Haarkrone auf beſondern Stielen am Saamen) ſi ſtylus iſte deſit.
3. *capillaris*, (haarwollicht) pappo capillari, ſimplex filiformis, pilis indiviſis. *Pappus.* fig. 162. a. *Hieracium. Sonchus.*
4. *plumoſus*, (federwollicht, gefiedert) pappo plumoſo. f. 162. b. villoſus, compoſitus inſtar plumæ, pilis pennatis conſtans. *Leontodon*, *Tragopogon. Valeriana.*
5. *paleaceus*, (riemenwollicht) pappo paleaceo, conſtans lamellis linearibus. *Bidens*, *Coreopſis.*
6. *ariſtatus*, (ährenförmig) ariſtæ (115) forma apparens. *Tagetes*, *Helianthus.*

7. *nul-*

7. *nullus* : *Artemiſia*, *Bellis*, *Cichorium*, *Tanacetum*.

154. 1. *Cauda*, (Schwanz) appendix filiformis, filum ſemen terminans. *Pulſatilla*, *Populus*.

ſimplex.

ariſta (115) *geniculata*: *Geum*.

piloſa, *villoſa*: *Clematis vitalba*.

plumoſa: *Geum rivale*.

2. *Ala*, (Flügel) membrana adfixa ſemini, qua volitante diſſeminantur ſemina. *Abies*, *Betula*, *Anethum*, *Heſperis*, *Thalictrum*.

3. *Hamus*, (Hacken) appendiculus ſeminis, quo animalibus prætereuntibus adhæret. Calyce, *Arctium*, *Urtica*. pericarpio, *Hedyſarum*, *Aparine*. ſeminibus, *Daucus*, *Caucalis*, *Verbena*.

triglochis, (81) *Myoſotis lappula*.

incurvus, *Ariſta uncinata*, *Geum urbanum*, (*Caryophillata off*.)

4. *Caliculus*, (Kranen) coronula ariſtata monophylla ſ. tegmentum ſeminis proprium. *Scabioſa*, *Statice*, *Trifolium*.

5. *Nux*, (Nuſs) ſemen tectum epidermide oſſea: *Corylus avellana*, nucleus dicitur in drupis (144) 1-2. &c. locularis, (139) bilocularis in *Corno*.

6. *Propago*, eſt ſemen *Muſci* decorticatum, detectum.

155. RECEPTACVLVM, (Boden, Fruchtſtüze) ſ. thalamus, (Bette) ſ. placenta, (Mutterkuchen,) baſis, qua partes fructificationis (104) connectuntur.

Receptaculum ambit interne calycis parietes in Icoſandriis, aliisque, unde corolla & filamenta calyci inſeruntur, in *Fragaria*, *Pyro*, *Oenothera*.

proprium, (d. eigene Stüze) quod partes unius tantum fructificationis reſpicit.

fructificationis, (Fruchtſtüze) flori & fructui commune.

floris, (Blumenſtüze,) baſis, ubi floris partes absque germine affiguntur.

fructus, baſis fructus, remota a floris receptaculo.

ſeminum baſis, qua ſemina intra pericarpium affiguntur, ſ. 161.

flos ſimplex, cum pluribus floribus nulla pars fructificationis communis eſt, unde & receptaculum ſimplex.

floſculus eſt flos partialis floris aggregati, compoſiti, umbellati, cymoſi.

156. *Commune*, (gemeinſchaftl. Stüze) (140. 141. 135. 133.) quando floſculos plures, eorumque fructus ita connectit, ut quibusdam exemtis, irregularitas cauſetur.

a) Superficie (Geſtalt)

nudum, (bloſs, nackend) pilis, ſetis, villis, paleis. f. 140. *Leontodon*, *Taraxacum*.

punctatum, (getüpfelt) adſperſum punctis excavatis, cæterum nudum: *Leont. Tarax. Chryſanthemum*. f. 140.

villoſum, (wollicht) villis veſtitum (79.) *Artemiſia*, *Abſinthium*, *Carduus*.

piloſum, (haaricht) munitum pilis (79) *Carthamus*.

ſetoſum, (borſtig) obvallatum ſetis (80) *Arctium*, *Lappa*, *Centaurea*, *Cyanus*.

paleaceum, (riemig, blättrig wie Spreu) lamellis innatis diſtinguens floſculos. f. 140. *Cichorium*, *Anthemis*, *Achillaea millefolium*.

Palea eſt lamella innata linearis, floſculos diſtinguens. f. 141. b.

157. b) *Figura*.

planum, (flach) ſuperficie: *Achillea millefolium*.

convexum, (erhaben) ſuperficie ad ſegmentum ſphæræ accedente elatum: *Matricaria chamomilla*.

conicum, (kegelförmig) f. 141. ſuperficie in conum elata: ſ. teres verſus apicem attenuatum. *Anthemis*, *Bellis*.

concavum, (ausgehölt)

ſubulatum, (pfriemenförmig) (56.)

158. *Compoſitus* flos, cui receptaculum dilatatum, convexum, planum, integrum, commune, floſculis monopetalis pluribus, (interdum unico floſculo,) ſeſſilibus, perianthio contentis, antheris in cylindrum connatis, ſemen unicum ſub ſingulo floſculo.

* paucæ quædam plantæ propter antheras connatas, floſculumque ſeſſilem, ad compoſi-

to-

torum claſſem referendæ, dantur, quarum receptaculum a reliquarum ſtructura parum diſcrepat. *Echinops*, *Artemiſia*.

Compoſitus flos eſt 1. *ligulatus*, (flachblätrige, Halbblümchen) (ſemifloſculoſus Tournef.) cum corollulæ floſculorum omnes planæ, verſus exterius latus expanſæ ſunt.

2. *tubuloſus*, (platblühende, Blümchenblume,) (floſculoſus Tournef.) cum corollulæ floſculorum omnes tubuloſæ ſubæquales ſunt. *Eupatorium*.

3. *radiatus*, (geſtralte Blume,) cum corollulæ diſci tubuloſæ, in ambitu vero floſculi diformes ſunt. *Coreopſis*, *Achillaea*, *Tagetes*.

compoſitus radiatus flos, conſtat diſco & radio.

Radius, (Umfang) ex corollulis irregularibus in ambitu conſtat.

Diſcus, (Scheibe) ex corollulis minoribus, plerumque regularibus conſtat, in flore compoſito eſt pars media, calycis limbo limitata.

decompoſitus ſeu compoſitus flos ex compoſitis, continet intra calycem communem minores calyces, communes multis floribus. *Sphaeranthus*.

Completus flos, (vollkommene) (Veilant.) eſt flos corolla, & calyce inſtructus.

incompletus (unvollkommene) flos caret perianthio aut corolla: eſt

1. *apetalus* flos, cui corolla deeſt, non perianthium.

1. *nudus*, cui calyx deeſt, non corolla.

159. *aggregatus* flos, (angehäufte Blume, durch kleine Stiele auf dem flachen Boden der Blume befeſtigt) qui receptaculum habet dilatatum, integrum floſculis pluribus ſubpetiolatis, commune, antheris ſaltem non coalitis. *Scabioſa*, *Dipſacus*.

amentaceus aggregatus flos habet receptaculum filiforme, diſtinctum ſquamis amentaceis. *Betula*, *Salix*, *Urtica*, *Pinus*, *Juniperus*.

glumoſus aggregatus flos habet receptaculum filiforme, cujus baſis inſtruitur gluma communi. *Feſtuca*, *Poa*, *Lolium*, *Hordeum*.

ſpa-

ſpadiceus aggregatus flos eſt, ubi receptaculum, intra ſpatham pluribus floſculis communem. *Arum.*

plumoſus aggregatus flos, habet receptaculum filiforme, cujus baſis inſtruitur gluma communi, *Poa*, *Briza*, *Lolium*, *Triticum.*

160. *Umbella*, (Dolde, Regenſchirmblume, auf verlängerten Blumenſtielen, in den ebenen Boden befeſtigt,) eſt, ubi pedunculi omnes ex eodem centro, ambitu æquali exeunt.

umbellatus flos, f. 135. eſt receptaculum commune diviſum, elongatum in pedunculos filiformes proportionatos, omnibus eodem centro ſ. puncto exeuntibus, ambitu formato æquali, *ſtamina* 5. diſtincta, decidua, *germen* ſub corolla, *piſtillum* bifidum, *ſemina* 2. connexa ſummitate, *Cornus* maſcula, *Butomus.*

Spuria umbella eſt flos aggregatus in quo pedunculi e puncto communi oriuntur, ſed dein irregulariter ſe in ramos diſpergunt.

a) *Diviſione*

ſimplex, (einfach) umbella, ubi receptaculum ſic ſemel dividitur in pedunculos: *Sanicula*, *Eryngium.*

compoſita, (zuſammengeſezte) ubi omnes pedunculi apice communes ſubdividuntur in umbellulas; *Daucus*, *Cicuta*, *Euphorbia*, *Eſula.*

univerſalis umbella, (allgemeine Dolde) conſtat pedunculis 90. primariis ſ. quæ alias umbellulas apicibus gignit, pedunculis primoribus. f. 135. a.

partialis umbella, (umbellula) f. 135. b. (kleine Dolde,) conflatur pedunculis ſecundariis ex univerſali orientibus.

prolifera, ſi in umbella ſimplici unus alterve pedunculus progignit umbellulam: *Aſclepias vincetoxicum.*

161. b. *Figura.*

concava, (hohl) diſco compreſſa.

faſtigiata, (erhöht) erecta diſco planiſſimo ad horizontem parallelo (23.)

convexa, (erhaben) diſco in ſphæræ ſegmentum elato.

pla-

plana, (eben,) diſco.
radiata, (radförmig) petalis extimis marginalibus ſ. in ambitu poſitis difformibus, vel majoribus.

162. c) *Directione.*
erecta, (aufgerichte) ſuperficie cœlum reſpiciens.
nutans, (liegende) præcedenti contraria: *Solanum nigrum.*
cernua, (niedergebogene) erectam inter & nutantem, media ad latus vergit: *Chaerophyllum tremulum.*

163. CYMA, (unächte Dolde) *flos cymoſus* eſt receptaculum diviſum in pedunculos, quorum primores omnes ſicut in umbella ex eodem centro, ſecundarii vero ſ. poſteriores (pedicelli) non ex eodem centro, ſed vage prodeunt: ſ. receptaculum ex centro eodem univerſali, partialibus vero vagis, elongatum in pedunculos faſtigiatos. *Sambucus nigra*, *Sambucus ebulus*, *Solanum dulcamara.*
nuda, (blos) involucro, bracteis deſtituta: *Cornus ſanguineus.*
bracteata, (mit Beeren) bracteis (87) inſtructa.
ramoſa, (äſtig) in ramos ſubdiviſa: *Sedum album.*
trifida, (3fach) *Sedum acre.*
tripartita, (3theilig) *Sambucus ebulus.*
quinque partita, (5theilig) *Sambucus nigra.*

164. *Spadix*, (Kolbe) ſ. 133. eſt receptaculum palmæ enatum intra ſpatham (117) in ramulos fructificantes diviſum, ſiſtens columnam floriferam ſi corolla pedunculis longioribus, receptaculo communi filiformi ſæpe in ramos diviſo, inſerta eſt.
a) *uniflorus*, (auf einer Blume ſizend) *biflorus*, *triflorus*, *multiflorus.*
b) *ſimplex*, (einfach) non diviſus, *ramoſus* diviſus ſ. 133.
ſpadiceus flos, (falbenartige Blume) eſt flos aggregatus, cujus receptaculum commune florum vagina ſ. ſpatha circumdatum eſt.
Rachis, (Spindel) receptaculum filiforme, floſculos longitudinaliter annectens in ſpicam.

HABITVS
(Geſtalt der Blume.)

165. Habitus, Facies externa vulgo a botanicis (Caſp. Bauhino) antea dictus, eſt conformitas quædam vegetabilium affinium & congenerum, in *gemmatione*, *vernatione*, *aeſtivatione*, *ſomno*, *torſione*, *variatione*, *ſponſalibus*, *ſeminatione*, *placentatione*.

166. GEMMATIO, (das Keimen) eſt gemmæ conſtructio, ex foliis, ſtipulis, petiolis aut ſquamis.

Gemma, *oculus*, (Auge, Knoſpe,) eſt hybernaculum plantæ ex rudimentis foliorum futurorum, caudici adſcendenti inſidens: ſ. illa pars vegetabilis, quæ herbam, embryonem includit, ab injuriis externis defendit, ſquamis tecta ſupra terram ſi in ſuperficie plantæ inter truncum & folium contenta eſt; ſi herba e trunco immediate excreſcit, tum novum ramum format: conſtat vel ſtipulis, l. petiolis, l. foliorum rudimentis, l. ſquamis corticalibus.

Si *gemma* nobilioris plantæ inſeritur in corticem alterius plantæ, nutritur e cortice ac concreſcit, hæc operatio *inoculatio*, emplaſtratio, (oculiren) vocatur.

Inſeritur *ramus* (Aſt,) recens plantæ nobilioris in alterius plantæ corticem, & concreſcit, ut novus generetur arbor, *inſitio* (Pfropfen,) vocatur.

Bulbus, (Zwiebel) carnoſus ſub terra, in radicibus reſiduum foliorum, craſſitiem & ſuccolentiam acquirentium, ſuccum nutritium plantæ continentium, ſ. hybernaculum plantæ e rudimento foliorum præteritorum, caule ſupra terram decedente.

eſt vel *ſolidus*, (dicht) f. 126. conſtans ſubſtantia ſolida, ſucculenta, uniformi, continua, carnoſa intus indiviſa. Radix *Allii ſativi*, *Tulipae*, *Croci*.

tuni-

tunicatus, (blättericht, häutig,) f. 127. conflatus ex lamellis bulboſis, tunicis numeroſis, ſibi ſuper incumbentibus concentricis. *Radix cepae.*

ſquamatus, ſ. *ſquamoſus*, (ſchuppicht) f. 125. conſtructus ſquamis, lamellis imbricatis (16) *Lilii albi radix.*

articulatus, conſtans lamellis catenulatis. *Adoxa.*

caulinus, ſ. cauli inſidens, in caulis quadam parte ſitus: in umbella: *Allium ſativum*; in axillis. *Ranunculus ficaria.*

Origine, *petiolaris*, ex petiolo (Blatſtiel) (62) e foliorum rudimentis, *ſtipularis*, ex ſtipula (68) (Blatanſäze) confecta. *corticalis*, (rindenförmig) ex cortice plantæ. ſ. corticis ramentis confecta.

Contento, *foliaris*, (beblättert) ſi folium in gemma contentum eſt, non flores.

floralis, (Blumen und Blätter zugleich bringende) ſi fructificationem ſ. flores non folium continet *communis* ſi & folium & florem recondat.

Turiones, (Wurzelſproſſen) ſunt gemmæ radici ſub terra adhærentes, ubi ſuccus in autumno hiſce gemmis radicum ſe approximat, quorum evolutionem frigus in hyeme retardat usque ad ver.

Tuber, (knolle) figura irregularis, ſubſtantia farinoſa ſimilari generant propriam plantam, ſeparantes a prima planta.

167. VERNATIO,

Foliatio, (Lage der Blätter in der Knoſpe) eſt foliorum diſpoſitio intra gemmam ſ. eſt complicatio ea, quam ſervant folia, dum intra gemmam (166) aut aſparagos plantarum latet, quæ ſectione folii transverſa in conſpectum prodit, & modos varios agnoſcit, figuris ſequentibus expreſſos.

convoluta, (zuſammen gewickelt) cum unius lateris margo circumambit alterum ejusdem folii marginem inſtar cuculli.

ſimplex, (einfach) f. 1. *compoſita* f. 9. *Arum*, *gramina pleraque*, *Lactuca*, *Tragopogon*, *Berberis*, *Braſſica*, *Vicia*, *Lathyrus*, *Aſter*, *Cynogloſſum*, *Eryngium.*

Involuta, (eingeflochten) cujus margines laterales utrinque introrſum ſpiraliter convolvuntur,

verſus paginam ſuperiorem. *ſimplex* f. 2. *compoſita*, *oppoſita*, (entgegengeſezt) f. 10. *alterna*, (wechſelsweiſe) f. 11. *Lonicera caprifolium*, *Lonicera periclymenum*, *Evonymus*, *Pyrus malus*, *Viola*, *Plantago*, *Humulus*, *Urtica*, *Anemone hepatica*, *Sambucus*.

Revoluta, (umgekehrt,) cujus margines laterales utrinque retrorſum ſpiraliter convolvuntur, verſus paginam inferiorem; *ſimplex* f. 3. *compoſita*, *oppoſita* f. 12. *Rumex acetoſa*, *Primula veris*, *Tuſſilago*, *Rosmarinus*, *Carduus*, *Senecio*, *Potentilla*.

Conduplicata, (verdoppelt,) cum folii latera, parallele ſibi invicem approximantur: f. 4. *Fagus ſylvatica*, *Corylus avellana*, *Tilia*, *Prunus padus*, *Prunus ceraſus*, *Roſa*, *Rubus*, *Potentilla vulgaris*.

Equitans, (auffizend) quum folii latera parallele connivent, ut interiora ab exterioribus includantur; quod non in conduplicata obtinet: f. marginibus conniventia ſitu oppoſito, ut alterum includat alterum; *ſimplex* f. 5. *anceps*, f. 13, *triquetra* f. 14. *Poa* (gramen) *Iris*, *Acorus*, *Carex*.

Imbricata, (halbrund in einander gefügt) quando parallele ſuperficie recta, ſibi invicem incumbunt: f. 6. *Syringa*, *Liguſtrum*, *Hypericum*, *Daphne*, *Meſpilus*, *Campanula*.

Obvoluta, (verborgen) cum margines alterni comprehendunt oppoſiti folii marginem rectum: f. pagina ſuperiore lateribus approximatis, ita, ut alterum latus diſtinguat alterum folium. f. 7. *Dianthus* (caryophyllus) *Lychnis*, *Saponaria*, *Valeriana*, *Salvia*, *Scabioſa*.

Plicata, (gefalten) cum plicatim longitudinaliter complicantur, uti folia plicata ſ. in plicas varias coarctata. (53) f. 8. *Vitis*, *Acer*, *Ribes*, *Althaea*, *Malva*, *Crataegus*, *Humulus*, *Urtica*, *Alchimilla*.

Reclinata, (angelehnt) cum folia margine ſuperiore verſus petiolum deorſum & extrorſum reflexa ſunt: *Aconitum*, *Pulſatilla*, *Anemone*.

Inclinata, (gebogen) ſi folia margine ſuperiore verſus petiolum deorſum introrſum reflexa ſunt.

Circinalis, (zirckelförmig) deorſum ſpiralis perimetro circulari: *Filices*, *Palmae*.

Spiralia, (gewunden) in plicam transverſalem coarctata, ut *apex centrum obtineat*.

168. ÆSTIVATIO, eſt modus frondeſcentiæ (179.) ſ. corollæ complicatio ante explicationem floris. *Convoluta*, *imbricata*, *conduplicata* (167.) *valvata*, (mit Thoren verſehen) ſi folia, ſeſe expanſura, inſtar glumæ graminis (113) ſe exhibeant.

inaequivalvis, (mit ungleichen Thoren) ſi illa magnitudine diſcrepent.

169. SOMNVS, (Schlaf) nocturna foliorum mutatio, ſ. ſtatus contrarius vigiliis, queis plantæ flores quotidie aperiunt, ad partes, generationi dicatas, a rore nimio pluviisve defendendas.

Connivens, (auf und zu ſchlieſſend) ſi foliola calycis, petala, ſive laciniæ corollæ apicibus leviter ſibi accedunt, ac ferme ſe tangunt; ſ. quando duo folia oppoſita pagina ſuperiore, tam arcte ad ſe mutuo adplicantur, quaſi unicum eſſet folium.

Includens, (einſperrend) cum eadem margines totos marginibus applicent, ita, ut nullus hiatus relinquatur; ſ. cum folia alterna noctu cauli ſe approximant.

Circumſepiens, (umzäunend) valvis calycis aut laminis laciniisve corollæ adpreſſis, ſ. cum folia (alias horizontaliter poſita) noctu eriguntur in formam infundibuli.

Muniens, (befeſtigend) quando foliola ſibi invicem, ut liberi folia, approximantur, ſuperiorem paginam tegentia.

Conduplicans, (verdoppelnd,) (167.) dum folia (antea horizontaliter poſita) patentibus petiolis circum circa dependent, & quaſi fornicem formant.

Involvens, (einwicklend) ſtamina corolla; ſ. quando foliola erecta apice connivent & cavitatem inter ſe formant.

Divergens, (abhängig) flore ad latus; f. ſi foliola baſi approximantur, apicibus vero patent.

Dependens, (herabhangend) ut evadat flos nutans, foliolis demiſſis.

Invertens, (umgekehrt) ſitu cernuo verſus caulem, f. foliolis demiſſis & ſimul inverſis.

Imbricans, (dem Hohlziegel gleich liegend) in polypetalis aut monopetalis longe laciniatis, ut altera alteram laciniam tegat; f. foliis imbricatim complicatis.

170. TORSIO f. *Intorſio* (drehen, wenden,) eſt flexio partium verſus alterum latus.

a. *conformis* (gleichförmig) in partibus ſingulis verſus latus idem.

difformis (ungleichförmig) contra horſum vorſum, aut non in ſingulis

b. *dextra* ☽, ſiniſtra ☾ (13) reciproca.

caulis volubilis (ſich umdrehend)
ſiniſtrorſum; *Humulus*, *Lonicera*.
dextrorſum; *Phaſeolus*, *Convolvulus*, *Euphorbia*.

cirrhus volubilis *dextrorſum*, retrorſumque; *Leguminoſae*, *Smilax*.

corolla volubilis *ſiniſtrorſum*, *Aſclepias*, *Vinca*.
dextrorſum, *Pedicularis*, *Gentiana*, contra ſolem.

Piſtilla ſiniſtrorſum, *Cucubalus*, *Silene*.

Germina contorta *ſiniſtrorſum*, *Helicteres*, *Ulmaria*.

c. *reſupinata* torſio (das umgekehrte Drehen) corollæ aut floris, cum corollæ labium ſuperius terram, inferius cœlum ſpectat; *Viola europæa*, *Aiuga*, *Satyrium*.

Obliquitas (die ſchiefe) corollæ; *Hyſſopus*, *Pedicularis*: *ſpicae ſpirales*, aſperifoliæ, *Claytonia*.

Incurvatio (die Krümmung) corollæ, *Mimoſa*, *Papaver*, *Sedum rubrum*, *Lilium Martagon*.

Hygrometica varia ex fibrarum contorſione occurrunt in variis plantis: *Avenae* ariſta, funis inſtar contorta, *Geranum* ſeminis aryllus caudatus ſpiralis.

171. VARIATIO (Veränderung der Pflanzen) 1. coloris (125) 2. *magnitudinis*, 3. *pubeſcentiae*, (79) 4. *ae-*

4. *aetatis*, ſcilicet infantilis, puerilis, adoleſcentis, virilis, ſenilis: *Arbores*, *Hedera*, (conf. Linn. amœn. acad. Tom. I. ſponſalia plant. §. IV. (3)

Externa, in partibus vegetationis: cum varietates ſint plantæ ejusdem ſpeciei mutatæ a cauſa quacunque occaſionali.

frequens & *vulgaris* (wildwachſend) eſt planta, quæ in ſolo apto ſponte & copioſe provenit.

ceſpitoſa (vielſtänglicht) planta fit, cum multi caules ex eadem radice prodeunt.

plicata (geflochten) dicitur planta, cum arbor vel ramus excreſcit minimis intertextis ramulis, tanquam Plica polonica, expilis, ceu inſtar nidi Picæ, quod vulgus a malo genio ortum arbitratur: frequens in *Pino*, *Betula*.

faſciata, (in einen breiten Stengel zuſammen gewachſen,) cum plures caules connaſcuntur, ut unus ex plurimis inſtar faſciæ evadat, & compreſſus. Fit idem arte, ſi plures caules enaſcentes cogantur penetrare coarctatum ſpatium, & parturiri tanquam ex anguſto utero: *Beta lato caule C. B. Amaranthus criſtatus*, *Tragopogon*, *Scorzonera*.

latifolia; tenuifolia; criſpa (53) præter naturam.

mutica (abgekipt) quæ alias ſpinis &c. armata erant.

Interna, in partibus fructificationis.

a. 1. *mutilata*, ſ. mutila, (des blumenblatts beraubte Pflanze, mangelhaft) ubi defectu ſufficientis caloris, corolla deficit, quæ adeſſe deberet *Viola*, *Tuſſilago*, *Cucubalus*, *Campanula*.

2. *grandiflora*, (grosblumig) ex nutrimento copioſo juſto major, dum aliæ partes (fructificationis) numero augentur, ut aliæ eſſentiales excludantur, deſtruantur.

injurians, ſi petala juſto grandiora.

b. *multiplicata*, (halbgefüllte Blume,) pars quæcunque floris, communiter corolla dicitur, ſi præter ordinem, ſalvis quibusdam ſtaminibus numero aucta eſt, ſi fere omnia filamenta nova gignunt petala.

Perianthium & Involucrum raro, ſtamina vix unquam multiplicatum conſtituunt florem: *Hyacinthus*; multiplicantur plantæ ſolo radice, caule, foliis, fructificatione.

monopetali flores ſæpius *multiplicantur*, rarius pleni evadunt.

polypetali non raro *multiplicantur*: *Hepatica*, *Anemone*.

plena (gefüllte Blume,) cum corolla adeo multiplicata, ut ſtamina omnia excludantur, dum hæc excreſcunt in petala replentia, flores ſæpius ſuffocantia piſtillum: *Roſa*, *Cheiranthus*.

polypetali ſæpius fiunt *pleni*; *Malus*, *Pyrus*, *Ceraſus*, *Ranunculus*, *Papaver*, *Poeonia*, *Dianthus*, *Lilium*, *Tulipa*.

monopetali rarius implentur; *Primula*, *Datura*.

flores ſimpliciuni pleni differunt a compoſitis naturalibus, quod pleni illi piſtillum commune in centro floris, compoſiti vero ſtamina & piſtilla propria obtineant.

flores compoſiti, *petalis planis pleni*, differunt a ſuis non plenis, quod ſtigmata in his elongentur & germina aucta divergant.

flores compoſiti pleni e petalis planis differunt a compoſitis naturalibus, petalis planis, quod pleni illi antheris deſtituantur, quibus naturales gaudent.

Radius in flore *compoſito naturali* ſi piſtillis inſtruitur, omnes quoque pleni flores piſtillis inſtruuntur, ſi vero deſtituitur, etiam deſtituuntur pleni: *Bellis*, *Matricaria*, *Tagetes*.

pleni qui omnia ſtamina amiſere, ſunt ſteriles, genera non conſtituunt, anthophilorum & hortulanorum deliciæ ſunt flores *pleni*.

flos perfecte plenus nullus propagatur ſeminibus, ergo ipſe prodit, vel e depactis ramis, vel e vivi radicibus, ut *Dianthus*, *Cheiranthus*, *Tropaeolum*, *Roſa*, *Ranunculus*, *Viola*, *Paeonia*, *Narciſſus*;

pauciflores ut *Papaver*, *Nigella*, potius multiplicati dicendi quam perfecti pleni, ſemina enim perficiunt.

mul-

multiplicati & pleni flores a Perianthio & infima ſerie petalorum, uti proliferi a prole judicantur.

flos *plenus* ad genera referri nequit, cum monſtroſus ſit, fiet hic naturalis, ſi in ſolo ſeratur margo.

Corollæ polypetalæ infima ſeries numero conſtans permanet etiam in *plenis*, hinc numerus petalorum inde ſæpius facillime eruitur, ut *Papaver*, *Nigella*, *Roſa*.

dupli atus (doppelt) eſt primus, minimus gradus plenitudinis.

triplicatus (dreyfach,) corolla triplo auctior evadit.

prolifera, (ſproſſende, gekrönte Blume,) cum intra florem (ſæpius plenum) alii flores enaſcuntur, e filamentis antiquæ floris, ex cauſa plenitudinis aucta. *Calendula prolifera*.

prolificatio a) e *centro*, ſi ex piſtillo enato in prolem, uno pedunculo peragitur, in floribus non compoſitis: *Dianthus*, *Roſa rubra*, *Ranunculus*.

b) e *latere*, proles plurimos pedunculatos ex calyce communi emittens, in compoſitis aggregatis, *Bellis*, *Calendula*, *Scabioſa*.

Luxuriantes flores (wuchernde Blume,) nulli naturales, ſed omnes *monſtra* ſunt; *pleni* enim evnuchi evaſerunt, adeoque ſemper abortiunt; *multiplicati* non æque; *proliferi* monſtroſorum augent deformationem.

Luxurians flos tegmenta fructificationis (perianthium, & corollam,) ita multiplicat, ut eſſentiales ejusdem partes deſtruantur, excludantur, dum aliæ numero augentur, ab alimento luxuriante.

Luxuriantes flores multiplicant corollam, cum damno ſtaminum, quæ excreſcunt in petala, adeoque multiplicati flores plurima.

Luxuriationibus minus obnoxia ſtamina & calyx, petalis longe certiora ſunt.

vivipara (lebendig gebährende Pflanze,) flos frondoſus, ſi proliferi proles folioſus fit, rariſſima eſt viſa in *Roſa*, *Anemone* &c.

bulbigera, (zwiebelbringende Pflanze) bulbos proferens.

Perfecte denominatur planta nomine *generico & ſpecifico.*

Cognitione ſpecierum initur omnis ſolida eruditio phyſica, œconomica, medica, imo omnis vera cognitio humana.

Speciei notitia in nota eſſentiali, qua ſola, ab omnibus congeneribus diſtinguitur.

Sine notitia generis nulla certitudo ſpeciei.

Differentia ſpecifica continet notas, quibus ſpecies a congeneribus differt.

Nomen ſpecificum autem continet differentiæ notas eſſentiales.

Notæ in nomine ſpecifico ſint non lubricæ, incertæ aut falſæ, ſed firmæ, certæ, mechanicæ.

Nomen ſpecificum a partibus plantarum non variantibus deſumi debet.

Nec magnitudo, nec locus natalis, nec tempus florendi, vegetandi, nec color, nec vis, nec uſus, nec odor, nec ſapor, ſpecies ſufficienter diſtinguit.

Pubeſcentia ludicra eſt differentia, cum cultura ſæpius deponantur.

Spinæ & hirſuties ſub pubeſcentia intelligitur, quam ſæpe plantæ exſerunt a loco vel cultura.

Cultura facit, ut mirifice manſueſcant ferociſſima animalia & ita etiam plantæ: Spinoſæ arbores, cultura ſæpe deponunt ſpinas in hortis, & ex acerbo fructu mitem porrigunt. e. g. *Pyrus, Citrus, Limon, Aurantium, Meſpilus, Groſſularia, Cynara.*

Cichorium ſylveſtre, eſt foliis ſinuatis, dentatis, aſperis, ſapore amaro ingrato: *ſativum* eſt foliis magnis integris levigatis ſapore grato.

Hirſuties loco & ætate facile deponitur.

Thymus, Serpillum, in campis glabra, in maritimis arenoſis hirſuta ſunt.

Lilium martagum in ſylvis hirſutum, in hortis glaberrimum.

Durationem, a loco quam maxime provenientem, in differentia adhibere non arridet, niſi manifeſtiſſimam.

Calidis regionibus, æſtate perenni gaudentibus, plan-

plantæ perennes & arboreſcentes evadunt, quæ apud nos annuæ ſunt, uti *Tropaeolum*, *Beta*, *Majorana*, *Malva arborea*.

Frigidae regiones e perennibus plantis annuas faciunt, uti *Mirabilem*, *Ricinum*.

Multitudo herbæ ſæpe loco mutatur.

Radix, differentiam realem ſæpe ſubminiſtrat, ad eam tantum confugiendum eſt alia via intercluſa, non enim licet in hortis plantas facile eradicare; in vivis plantis oculis noſtris ſe etiam ſubducit radix; in herbariis non facile transfertur radix.

Scillae difficile ab herba diſtinguuntur, a bulbo tunicato aut ſolido aut ſquamoſo facillime.

Orchides tuto non diſtinguuntur, niſi radices fibroſæ, ſubrotundæ, aut teſticulatæ in auxilium vocantur.

Trunci notæ differentias ſæpe optimas edunt.

Caulis eſſentiales præbet differentias, ut ſine iis nulla certitudo ſpeciei. e. g.

Hypericum perforatum, caule ancipiti,

Hypericum aſcyron, caule quadrangulari,

Convallaria polygonatum vulgare caule ancipiti.

Convallaria polygon. maximum, caule tereti.

Sic Culmus, Scapus, Petioli, Pedunculi.

Folia elegantiſſimas, naturaliſſimas differentias exhibent.

Natura in foliis quam maxime fuit polymorpha, quorum ſpecies numeroſiſſimæ, ſtudioſe a tyronibus addiſcendæ.

Fulcra & *Hybernacula* communiter optimas differentias relinquunt. *Aculei* in *Rubo*; *Spinae* in *Pruno*; *Bracteae* in *Fumaria*, *Dracocephalo*; *Coma* conſtat bracteis, quæ caulem terminant magnitudine inſignes, ut in *Corona Imperiali*, *Lavendula*, *Salvia*.

Glandulae in *Pado*. *Stipulae* magni faciendæ ſunt in vaſtiſſimis generibus, in dubioſis ſpeciebus.

Gemmae, in eodem genere ſæpe diverſiſſimæ: e. g. *Rhamnus*, *Salices*.

Bul-

Bulbi bene diſtinguunt genus, in axillis foliorum reſidentes bulbi, *Lilium*, *Ornithogalum*, *Saxifraga*.

Infloreſcentia maxime realis eſt differentia.

Differentia omnis e *numero*, *figura*, *proportione* & *ſitu*, variarum partium in plantis occurrentium neceſſario deſumitur, uti a radice, trunco, foliis, fulcris, infloreſcentia, fructificatione, quæ ſunt *fidae notae*, cum contra *fallaces notae* ſint, color, odor, ſapor, uſus, ſexus, pubeſcentia, tempus, locus, multitudo, magnitudo, monſtroſitas &c.

Genericum nomen ſingulis ſpeciebus applicari debet.

Speciebus ad genera redactis adſumant Species nomen generis, ut ex nomine conſtet de plantæ nominatæ genere.

Nomen genericum valet in Republica botanica uti nummus.

Species a *varietatibus* diſtinguunt cultura in diverſiſſimo & vario ſolo; partium plantarum omnium inprimis fructificationis examen accuratum, ut & ſpecierum congenerum inſpectio, poſitio ſpeciei ſub proximo & diverſo genere.

varietates ſunt plantæ ejusdem ſpeciei mutatæ a cauſa quacunque occaſionali.

varietates ad Botanicos cæteroquin non ſpectant, inprimis leviſſimæ niſi quatenus Botanici curam gerant, ne ſpecies multiplicentur aut confundantur; uſus varietatum in œconomia, culina, medicina neceſſariam reddidit varietatum cognitionem in vita communi.

Sexus varietates naturales conſtituit, reliquæ omnes monſtroſæ ſunt, quas conſtituunt flores mutilati, multiplicati, pleni, proliferi; herbæ luxuriantes, faſciatæ, plicatæ, mutilatæ, in numero, figura, proportione, & ſitu partium omnium, nec non ſæpius color, odor, ſapor, & tempus.

172. SPONSALIA (Ehen) in plantis occurrunt; ſunt plantæ quædam

mares (männliche Pflanzen) quæ flores ſolum maſculos gerunt.

femi-

feminae (weibliche) quæ femineos tantum flores continent.

androgynae (Pflanzen mit halb getrennten Geſchlechtern) quæ flores & maſculos & femineos ſimul gerunt, utrosque ſeparatos, in eodem thalamo, ex eadem radice, *Zea*, *Urtica*, *Amaranthus*, *Quercus*, *Cucurbita*, *Cucumis*.

dioicae (mit ganz getrennten Geſchlechtern) in qua mares & feminæ in diverſo thalamo, & diverſa radice.

hermaphroditae (Zwitterpflanzen) quæ flores ſingulos hermaphroditos gerunt.

polygamae (mit vermengten Geſchlechtern) quæ hermaphroditis & fœmineis aut maſculis ſimul conſtant, in caule vel eodem vel diverſo: *Atriplex*.

maſculus flos antheras (131) *femineus* ſtigmata (137) habet.

hermaphroditus flos (Zwitterblume) antheram & ſtigma una continet.

Stamina & *Piſtillum* indicant *ſponſalia*: ſunt partes eſſentiales florum, qui ſemen vel fructum gignunt, aliæ partes florum tegmini & nutritioni inſervientes, non tam neceſſariæ quam ſtamina & piſtillum in fructificatione. Fructus etiamſi quædam producunt plantæ, ſemina vel plane nulla vel ſaltem ſterilia gignunt, ſine ſtamine & piſtillo. Sexum diverſum in plantis, & ſimilitudinem cum animalibus probant *plantae hybridae*, (Baſtartpflanzen) qui oriuntur, ſi germen a polline alterius plantæ in diverſo thalamo fœcundatur: ut in *Lino*, *Cannabi*.

Plantæ *hybridae* per artem facile produci poſſe, experimenta cel. *Koelreuteri* probant e. g. in *Nicotiana* ruſtica; panic. peren. glutin. tranſylv. *Diantho* chinenſ. carthuſ. *Cheiranthо* albo, rubro.

Plantarum ſemina fructificatione indigent uti ova animalium, pollen antherarum filamentis affixarum fœcundat in plantis per

ſtigma

ſtigma germen, primam originem ſeminum; deficit hoc pollen ſemina fiunt ſterilia.

Stamina & piſtilla ſunt diverſæ longitudinis pro ſitu florum: pollen non citius ex antheris ſe evolvit, donec ſtigma id juſte ſuſcipere poteſt, ob noxam quam aqua inprimis, aliaque, plantis floreſcentibus inducunt, quamplurimarum enim plantarum flores ſerena & ſicca tempeſtate ſe aperiunt, marinæ plantæ, aquæ antea ſubmerſæ, tempore floreſcentiæ ſupra aquam ſe emergunt. &c.

Vegetabilia, ſenſatione licet deſtituantur, æque tamen ac animalia *vivunt*, quod probat

Ortus ex ſemine vel gemma,

Nutritio ex humo tenuiſſima, *Kylbel*: cum aqua & aëre, *Haleſ.*

Lepidium ab aqua ſine terra creſcens.

Ætas, infantia, pueritia, adoleſcentia, virilitas, ſenectus; *Arbores*, *Hedera.*

Motus: horam diei obſervant flores *ſemifloſculoſi* & varii alii,

pluviam præſagit mane *Calendula*:

noctu nutat, *Draba*, *Trientalis*:

flacceſcit *Impatiens*, reflectitur *Siegesbekia*:

clauduntur *Mimoſae*, *Papilionaceae*:

componitur *Tamarindus*:

de die autem vigilant patentibus follis:

ſolem ſequitur *Reſeda Luteola* & flores ſemifloſculoſi:

defectus motus ex umbra aut ſylva, hinc diverſa ſtatura *Pini* aliorumque:

Propulſio loco circulationis animalium:

Morbus: æſtus, ſitis, pernio, fames, polyſarchia, cancer, inſecta:

Mors oppoſitum vitæ, *Anatomia*: vaſa, utriculi, tracheæ, cutis, epidermis.

Organiſmus: vaſa ſecretoria, glandulæ.

173. SEMINATIO, diſſeminatio (beſaamen) naturæ ſtupenda eſt:

Aëris vis, præſertim vere & autumno procel-

cellæ; *Erigeron* ex America diſſeminata per Europam.

Fructus elevatur per caulem; ſcandentes itaque factæ, ut attollant fructum, capſulæ apice dehiſcunt.

Ut vento quovis facile feratur ſemen, quædam *volitant Pappo* plumoſo, *Valeriana:* piloſo, *Stapelia:* calyce, *Scabioſa, Trifolium:* cauda, *Pulſatilla, Populus.*

Ala ſeminis, *Abies, Betula, Corispermum.* pericarpii, *Fraxinus, Iſatis:* calyce, *Humulus.*

Inflatione, ut volumen lævius evadat, calyce, *Cucubalus, Trifolium;* Pericarpio, *Fumaria, Colutea.*

Elaſticae longe propellunt ſemina: cartilagine, *Impatiens, Diktamnus*, mucrone, *Lathraea:* fibris, *Cucumis, Cardamine:* reptatu: *Avena, Geranium, Equiſetum*; viſcoſitate, *Viſcum.*

Adhaerentia animalibus hamis, quæ in ruderatis creſcunt;
calyce; *Arctium, Agrimonia, Urtica,*
pericarpio; *Hedyſarum, Aparine.*
ſeminibus; *Cynogloſſum, Myoſotis, Verbena, Daucus, Caucalis.*

Animalia, quæ ſemina integra deglutiunt, diſſeminant cum ſtercore: *Avena, Juniperus, Epidendrum.* Baccæ creatæ ut diſſeminentur ob pulpam; ſub manducatione ſemina diſpergunt *Sciuri, Mures, Monedulae:* fodiunt Talpa, Erinaceus, Lumbricus, ut terra recipiat.

Flumina, Mare, Lacus, Imbres, Æſtus juvant ſeminationem.

Conſervatio naturalis ſeminum, *Mimoſa, Cucumis.* Maris fundus non deſtruit ſemina: Similitudo eludit animalia; *Salicornia, Medicago.* Plantæ occultant; *Trifolium, Lathyrus.*

Armis ab animalibus defenduntur ſemina, appropriatis ſpinis, aculeis, caulibus.

Carnoſæ propagantur plantæ foliis: arbores ſin-

ſingulæ ſunt uti hortus circumſeptus, miro naturæ conſilio.

Structura ſeminum ſingularis, organica, in ſingulis, oculis phyſicis facile patens.

Germen & Corculum in ſemine ex Medulla, ergo omnis generatio continuata multiplicatio.

174. a. PLACENTATIO (die Lage der Augen) eſt cotyledonum (149) diſpoſitio, ſub ipſa ſeminis germinatione (178).

acotyledones (ohne Stücken) ubi nulli extant cotyledones, *Muſci.*

monocotyledones (aus einem Stück) cum cotyledones perſiſtunt intra ſemen perforatæ, *Gramina;* unilaterales, *Palmae;* reductæ, *Cepa.*

dicotyledones (aus 2. Stücken) immutatæ, *Legumina*, *Coma:* plicatæ, *Didynamia*, *Goſſypium:* duplicatæ, *Tetradynamia*, *Malvae*: obvolutæ, *Helſine*: ſpirales, *Salicornia:* reductæ, *umbellatae:* polycotyledones, (aus mehreren Stücken) *Pinus* 10. *Cupreſſus* 5. *Linum* 4.

b. MENSURA (das Maas) magnitudinis a manu deſumta, vel a ſtatura hominis, in plantis convenientiſſima eſt.

linearis (einer Linien lang) (10) *unguicularis* (Nagels breit (10) *pollicaris* (Daumens breit) (10) *palmaris* (einer Hand breit) (10) *dodrantalis* (¾ querhand hoch) (10) *ſpithameus* (Spannenlang) (10) *pedalis* (Schuh lang) (10) *cubitalis* (Ellen lang) a flexura cubiti ad extimam apicem digiti intermedii. *brachialis* (Arms lang) ab axilla ad apicem digiti intermedii. *orgyalis*, *ſexapoda* (6 ſchuhig) (10).

c. LACTESCENTIA (Milch enthaltende Pflanzen) eſt copia liquoris, qui effluit læſa planta, albi, *Euphorbia*, *Papaver*, *Aſclepias*, *Campanula;* lutei, *Chelidonium*; rubri, *Rumex* ſanguinea.

d. *Mor-*

d. *Morbosae* plantæ (ungesunde) a Botanicis receptæ variæ sunt, prout earum morbi;

Erysiphe (Schimmel, lichte Bräune) est mucor albus, capitulis fuscis, sessilibus, quo folia asperguntur, frequens in *Humulo*, *Lamio*.

Rubigo (Brand) est pulvis ferrugineus, foliis subtus adspersus, frequens in *Alchemilla*, *Rubo* saxatili, *Esula*.

Clavus (Knopf, Buckel) cum semina enascuntur in cornicula majora extus nigra, uti in *Secale* & *Caricibus*.

Ustilago (Rus) cum fructus, loco seminum, farinam nigram proferunt; ut *Hordei*, *Avenae*, *Scorzonerae pulveri-florae ustilago*.

Nidus insectorum caussatus ab insectis, quæ ova deposuere in plantis, unde excrescentiæ variæ: *Gallae, querci*, *Cisti*, *Salicum*.

Insecta sæpe caussant plenitudines & prolificationes florum, *Matricaria*, *Chamaemelum vulgare* ab insectis minimis fit prolifera.

LOCVS (Geburts-Ort.)

75. *Loca* natalia plantarum respiciunt *Regionem*, *Clima*, *Solum*, & *Terram*.

Regio (Gegend) tradit Regnum, Provincias, Pagos, & ubi rarissimæ plantæ, loca specialissima.

Clima (das Clima) habet tres dimensiones latitudinem, longitudinem, & altitudinem loci.

Latitudo est ab æquatore vel *borealis* vel *australis*, utraque gradibus divisa 90.

Longitudo communiter ab insula *Ferro* Canariensium ad eandem numerat 360.

Altitudo perpendicularis est terræ mensura a mari, versus summa cacumina alpium.

Mensuratur *Barometro*, secundum elevationem loci perpendicularis descendente.

Boreale, *Orientale*, *Occidentale*, *Mediterraneum*, *Australe*, *Indicum*, *Alpinum &c.* aliunde patent.

76. SOLVM (die Lage des Orts) respicit telluris naturam.

marinum (Meer) aqua salsa continuo tectum, occultat plantas radicibus destitutas, per

poros nutriendas, frigoris impatientes: *Fucus*, *Spongia*.

lacuſtre, (Seeteiche) aqua pura repletum, fundo conſiſtente: *Arundo*, *Scirpus*, *Elatine minim.*

maritimum (See-Strand) mari vicinum.

littorale (Fluſs) maris arena, ſive ſabulo, ſale imprægnato conſtans, maris fluctibus ventisque expoſitum, alunt proprias plantas, *Salſola*, *Atriplex*, *Eryngium*, *Iſatis*.

ripa, (Rand, Ufer) fluviorum & lacuum hyeme ſub aqua reconditæ. *Lythrum*, *Ranunculus*, *Lyſimachia*.

ſtagna & *foſſae* (Gräben) fundo limoſo & aqua quieta ſunt repleta. *Cicuta*, *Ranunculus*, *Sagittaria*.

paluſtre (Moräſte) humo lutoſa, laxa, & aqua refertum, æſtate ſicceſcens. *Carex*.

inundatum (überſchwemmte Orte) hyeme repletum aqua, æſtate putridum exſiccatum, imbribus interdum ſuffuſum: *Bidens*, *Oryza*.

uliginoſum (Sümpfe) ſpongioſum, aqua putrida laborans, colonis inviſum, nec ſegetis, nec fœni proventui aptum: *Primula*, *Anthericum oſſifragum*.

fluviale (Bäche, Flüſſe, Flieſswaſſer) quod aquam puram, ſubfrigidam, motu agitatam alveo detinet. *Potamogeton*, *Ranunculus* capillaris.

fontanum (Brunnen) ex quo aqua gelida puriſſima ſcaturit: *Beccabunga*, *Angelica*, *Petroſelinum*.

ceſpitoſum (torfig, Moore) refertum humo, mixta ſphagno, (herba) tectum tuberibus, aqua limoſa proſunda cinctum: *Scirpus*, *Lichen*.

alpinum (Alpen) quod montes altiſſimi, intrantes aëris ſecundam regionem. arboribus ſpoliati, ſummis cacuminibus nive perenni tectis, convallibus humo ceſpitoſa repletis, formant: *Alchemilla* digitalis, *Ranunculus* alpina: *Veronica*, *Viola*.

Ne-

Nemoroſum (waldig) ad radices montium, inter lacos, humo ſpongioſa tectum, umbroſum ſemper, exhalans continuo aërem humidiuſculum, ventis minime expoſitum, plantas vernales, frigoris & caloris impatientes alens. *Fumaria* bulboſa, *Anemone*, *Paris*, *Aſarum*.

Sylvaticum (Wälder) umbroſum terra ſabuloſa ſterili refertum: *Pyrola*, *Pulſatilla* ſylv. *Erica*, *Melampyrum*.

Paſcua (Weide) a pratis differunt, quod ſteriliora, ſicciora, & ſabuloſa. *Euphraſia*, *Tormentilla*.

Arvenſe (unbeſäete Æcker) conſtat agris requietis: *Anagallis*, *Fumaria*, *Scandix*, *Ononis*.

Pratenſe (Wieſen) herbis luxuriat, campis depreſſis, convallibusque conſtat a) fertile *Lotus*, *Millefolium*, *Campanula*. b) exſuccum, *Lilium Convallium*, *Agrimonia*, *Geranium ſanguineum*, c) humidiuſculum: *Scabioſa ſucciſa*, *Geum paluſtre*.

Verſurarum (Enden der Æcker) quæ ſunt margines agrorum, tanquam prata ſtercorata conſideranda: *Lolium* perenne, *Cichorium*, *Scabioſa*, *Anchuſa*.

Agreſte Felder) quod terra ſubacta læta gaudet: *Galeopſis*, *Cyanus*, *Delphinium*, *Convolvulus*.

Campeſtre (ebene Felder) apricum ventis expoſitum, ſiccum, aſperum: *Artemiſia camp.* *Stellaria*, *Myoſotis*, *Daucus*, Bellis.

Montanum cum collibus, (Anhöhe, Hügel) ſabuloſum, aridum, ſterile, aquam vix admittens: *Arnica*, *Carlina*, *Gnaphalium*.

Rupeſtre, (Felſen, Klippen) conſtans petris, murisve præruptis, aridiſſimisque: *Sedum* *Origanum*.

Ruderale (Landwege) juxta domos, habitacula, vias ac plateas. *Hyoſciamus*, *Abſinthium*, *Plantago*, *Solanum*.

Cultum, (Gärten) in hortis, terra ſubacta, mixta, fertiliſſima, promovens plantas

hortulanis inviſas, inter olera luxuriantes. *Urtica annua*, *Aparine*, *Lamium*, *Euphorbia*.

Fimetorum (Miſthaufen) ex ſtercore animalium congeſto. *Urtica maj.* *Datura*, *Aſperugo*.

Locus aquoſus folia inferiora, *montoſus* autem ſuperiora ſæpius findit.

Folia diformia ſ. variæ figuræ in eadem planta rariora ſunt: *Hibiſcus* foliis inferioribus integris, ſuperioribus trilobis. *Lepidium* foliis caulinis, pinnato-multifidis, rameis, cordatis.

Aquaticae plantæ inferiora folia & ſubmerſa reddunt ſæpius capillaria: *Ranunculus aquaticus* folio rotundo & capillaceo.

Montanae plantæ folia inferiora magis integra, ſuperiora autem magis diſſecta formant, ob ſolum ſiccum: *Pimpinella*, *Petroſelinum*, *Aniſum*.

Cultura, tot varietatum mater, optima quoque varietatum examinatrix eſt: Horticulturæ mangonium produxit flores *plenos*, fructus *horaeos*, caulium *turiones*, herbas *altiles*, *capitatas*, teneraque *olera*; hæ ſibi relictæ in ſolo macro ſylveſtrem induunt naturam: Sic dulciſſimæ *vites* fiunt acidæ, ſuaviſſima *mala* acerba, gratiſſima *pyra* auſtera, pulpoſi *aſparagi* lignoſi, &c. *Solum* mutat plantas, unde varietates enaſcuntur, & mutato eodem redeunt. *Buxus* arboreſcens & humilis. *Cynara* aculeata & non aculeata, *Myoſotis* foliis hirſutis & glabris, &c.

177. TERRÆ (die Natur des Erdreichs) plantis faventes ſunt

Humus, (Garten-Erde) terra ſicca ſpongioſa, attactu ſcabra, in aqua plerumque molleſcens, ac diſſolubilis, colore nigreſcens, aut ex nigro flaveſcens vel rubeſcens, ex deſtructis animalibus aut vegetabilibus in ſuperficie terræ ſenſim nata, quæ tenuiſſima plantarum alimentum primarium eſt. (Kylbel Diſſert. de cauſa fertilitatis terrarum.)

Ar-

Argilla, (Thonfeld) tempeſtate humida unctuoſa, ſicca autem indurata eſt: *Thlaſpi*, *Papaver*, *Anthyllis*.

Creta, (Kreide) in collibus ſicciſſimis, aridiſſimis: *Verbena*, *Reſeda* vulgaris, *Campanula*.

Arena, (Sand) ſicca, friabilis, ſiticuloſa; eſt a) mobilis, *Carex*. b) farinacea, *Erica*. c) vulgaris, *Aſparagus*. d) ſabuloſa, *Serpillum*. Dignoſcitur ſic ex ſola inſpectione plantarum ſubjecta terra & ſolum: *Potentilla vulgaris* colorem argenteum foliorum induens indicat in terra latente argillam.

TEMPVS (Blüthe-Zeit.)

178. TEMPVS vigendi, germinandi, frondeſcendi, efloreſcendi, vigilandi, fructeſcendi, defoliandi indicat clima.

GERMINATIO (Ausſchlagen) eſt tempus, quo ſemina terræ mandata eadem excludunt, in cotyledonum proventum, 1) *diebus* tribus *Napus*, *Eruca*; 4. *Anethum*, 7. *Hordeum*, 20. *Faba*. 40--50. *Apium*, 2) anno primo *Juglans*, *Poeonia*, *Perſica*. annis 2. *Cornus*, *Corylus avellana*: annuum bienne.

179. FRONDESCENTIA, (das Grünwerden, das Grünen,) eſt tempus æſtatis, quo ſpecies ſingulæ plantarum prima folia explicant. e. gr. April. *Ribes*, *Groſſularia*, *Eſculus*, *Tilia*, *Fraxinus*. May. *Sambucus*, *Crataegus*, *Syringa*, *Tilia*, *Roſa*.

Vernatio, foliorum exortus: *praecox*, *aequalis*, *ſerotina*.

Autumnatio, eorundem aut plantæ totius coloris mutatio, & caſus: *praecox*, *lenta*, *cunctanea*. *Fraxinus vernatione* ſerotina æquali, inter arbores ultima, unica ſæpe nocte maximam partem foliorum protrudit, *autumnatione* præcoci cunctanea, ornatum univerſum deponit.

Efloreſcentia Aufblühen) eſt tempus menſis, quo ſingulæ ſpecies plantarum primos flores oſtendunt. e. gr. April. *Fumaria*, *Tuſſilago*, *Viola*, *Anemone*. May. *Convallaria*, *Pyrus*, *Berberis*.

Jun. *Geum*, *Gnaphalium*, *Potentilla*, *Anchuſa*. *Cardui varii* non florent antequam ſolſtitium abſolutum eſt. *Parnaſſia* fœniſecii præco eſt. *Colchicum* autumni & gelu nuncia eſt.

180. CALENDARIVM (Allmanach oder gewiſe Zeit)
1. *Germinationis*, *Frondeſcentiae*, *Floreſcentiae*.
2. *Groſſificationis*, cum fructus poſt floris caſum incrementum capit; quod de ſucculentis & carnoſis præcipue intelligitur: Maturationis, Meſſis.
3. *Exſolationis*, *Defoliationis*, *Congelationis*.
4. *Brumalis*, *Gracialis*, *Regelationis*, ut mutationes annuæ cuique climati propriæ, ad culturam providam annotentur.

181. HOROLOGIVM floræ, (Blumenuhr) monſtrat qua diei hora flores ſolares ſeſe aperiunt & claudunt.

Flores ſolares, (abwechslend öfnend und ſich verſchlieſſende Blumen) ſunt, qui terminatum tempus ſeſe explicandi & claudendi obſervant; hicque plantarum ſtatus *ſomnus*, ille *vigiliae* audit: flores ſoli vergunt, dein contrahunt, poſt contractum ſunt irritabiles: *Berberis ſenſitiva*, *Carduus*, *Mimoſa ſenſitiva*, *Dionaea muſcipula*, (exot.)

a. *Vigiliae meteoricae* (nach dem Wetter ſich richtende) ſunt flores ſolares, qui minus accurate obſervant horam explicationis, ſed prius vel ſerius aperiuntur pro ratione umbræ, aëris humidi, vel ſicci, Atmoſphæræ preſſione majori aut minori, hi flores ſolares *Meteorici* vocantur.

Tropicae (nach der Länge des Tages und Kürze ſich richtende) eorum, qui mane aperiuntur, & ante veſperam recluduntur quotidie, ſed hora explicationis adſcendit aut deſcendit, uti dies adcreſcit aut decreſcit; adeoque obſervant horas turcicas ſeu inæquales. Hi flores ſolares *Tropici* dicuntur.

Æquinoctiales (zu gewiſen Stunden ſich öfnende und ſchlieſſende Blumen) cum flores ſolares aperiuntur certa & poſitiva diei hora, & plerumque etiam determinata hora quotidie recluduntur. Obſervant hi horas europæas ſ. æquales.

Vi-

Vigiliae florum ſolarium vulgatiſſimæ ſunt. e. g.
Leontodon taraxacum, oritur 5. 6. occidit 8. 9.
Hieracium piloſella or. 8. occ. 2.
Crepis tectorum or. 4. 5. occ. 10. 12.
Sonchus repens. or. 6. 7. occ. 10. 12.
Lactuca ſativa or. 7. occ. 10.
Calendula arvenſis or. 9. occ. 30.
Anagallis rubra or. 8 occ. 10.

b) *Apertionis*, *recluſionis* hora, quædam dormiunt, dum folia & frondes in nocte ſe complicant, mane extendunt.
Ruri ambulans Botanicus absque alio horologio ex florum ſolo aſpectu diei horas pronunciare poteſt. e. g. 3. *Tragopogon* luteum: 4. 5. *Crepis* tectorum: 6. *Scorzonera* tingitana: 5. *Leontodon* taraxacum, *Convolvulus* rectus: 6. *Hieracium* fruticoſum: 7. *Lactuca* ſativa: 8. *Meſymbrianthemum* barbatum: 9. *Hieracium* piloſella, *Anagallis* rubra: 10. *Lapſana* glutinoſa: 11. *Crepis* alpina: 12. *Sonchus* lævis: 1. *Dianthus* prolifer: 2. *Crepis* rubra, *Hieracium* pulmonaria. 4. *Hieracium* rubrum.

FRVCTESCENTIA, (Saamen-Zeitigung) comprehendit tempus, quo ſemina matura diſpergunt plantæ. Matureſcit hordeum citius in auſtrali Scania & boreali Lapponia, quam intermedia Uplandia.

DEFOLIATIO (das Blätter-Abfallen) eſt tempus autumnale, quo arbores folia dejiciunt, eoque indicant progreſſum autumni & inſequentis hyemis. *Fraxinus* inter primas defoliatur, & inter ultimas frondeſcit: Colchici primi flores obſervandi.

VIGENDI tempus (das Alter) comprehendit annos, quibus plantæ vivunt; facile anni numerantur vel ex circulis concentricis ſ. ex annulis reſinoſis in caudice detruncato. Annulis reſinoſis ſ. internis plerique trunci numerantur, *Quercus*, *Pinus*.
Ramis annotinis numerantur ætates Pini, Cedri, Mali, Pyri &c.

182. DVRATIO (die Währung der Pflanzen) *Plantae.* caducæ, ſenſiles, perpetuæ; *Flores*: ephemeri, tri-

tridui, menſtrui; *Fructus*: præcoces, ſerotini annui.

QVALITATES

(Eigenſchaften, Kräften der Pflanzen.)

VIRES ſ. Qualitates ſolis ſenſibus, adeoque exemplis non verbis diſcuntur.

a. Plantæ *genere* convenientes *easdem* poſſident *vires*.
Convolvuli; *Scammonium*, *Mechoacanna*.
Allii; *Porrum*, *Cepae*. Lauri; *Cinnamomum*, *Camphora*, *Saſſafras*, *Benzoe*.
Euphorbiæ; *Eſula*, *Tithymalus*. Artemiſiæ; *Abrotanum*, *Abſynthium*.
Ordine naturali & viribus conveniunt:
Columniferæ; *Malva*, *Althaea*, *Alcaea*.
Scitamina; *Cardamomum*, *Coſtus*, *Curcuma*.
Multiſiliquæ; *Poeonia*, *Aquilegia*, *Aconitum*, *Delphinium*, *Nigella*, *Ranunculus*.
Contortæ; *Cynanche*, *Aſclepias*.
Claſſe & viribus congruunt:
Gramina, umbellatæ, oleraceæ, papilionaceæ, ſiliquoſæ.

Graminum folia pecoribus & jumentis læta paſcua; Semina minora avibus, ſemen *Milii*, *Panici*, *Hordei*, *Avenae* paſſeribus & gallinis; Semina majora hominibus eſculenta ſunt, cerealia, *Triticum*, *Secale*, *Hordeum*, *Avena*, *Milium*.

Stellatae diureticæ ſunt plantæ; *Rubia*, *Aparine*, *Gallium*.

Aſperifoliae magis minusve oleraceæ, *Anchuſa*, *Borrago*, mucilaginoſæ & glutinoſæ ſunt; *Conſolidae majoris* Radix.

Luridae ſunt plantæ ſuſpectæ: fœtidæ, *Solanum*, *Hyoſcyamus*, *Nicotiana*, *Datura*: Narcoticæ, *Atropa*, *Mandragora*, *Nicotiana*, *Lycoperſicon*: Corroſivum maxime, *Capſicum*.

Umbellatae in ſiccis aromaticæ, calefacientes & pellentes, in aquoſis autem venenatæ ſunt, radice & ſeminibus pollent: aquoſo loco natæ venenatæ ſunt *Cicuta*, *Phellandrium*, *Apium*

pa-

paluſtre. Pellentes ſudorem, urinam, flatus, menſes, lac, *Leviſticum*, *Angelica*, *Imperatoria*, *Pimpinella*, *Carvum*, *Daucus*.

Hexandriae radices ſecundum ſaporem & odorem edules aut noxiæ ſunt: edules ſunt radices inodoræ, *Tulipae*, *Ornithogali*; venenatæ ſecundum odorem viroſum, ſunt *Scilla*, *Hyacinthus*, *Levcojum*, *Narciſſus*.

Bicornes adſtringunt *Erica*, *Pyrola*; ſed baccæ acidæ eſculentæ ſunt; *Myrtilli*, *Uvae urſi*, *Arbuti*.

Icoſandriae fructus pulpoſis eſt eſculentus; pomacei, *Mala*, *Pyra*, *Crataegi*, *Ribes*, ſenticoſi, *Cynoſbata*. Drupacei, *Perſica*, *Pruna*, *Ceraſa*.

Polyandria plerumque venenata ſunt, *Aconitum*, *Helleborus*, *Poeonia*, *Papaver*, *Euphorbia*.

Verticillatae ſunt fragrantes, nervinæ, reſolventes & pellentes, flatus, menſes, lac. Folia virtute pollent: fragrantiſſimæ, *Thymus*, *Origanum*, *Majorana*, *Ocymum*, *Rosmarinus*, *Salvia*.

Siliquoſae aquoſæ, acres, incidentes, abſtergentes, & diureticæ ſunt, exſiccatione imminuitur virtus: incidentia attenuant viſcida acredine, hinc tumores œdematoſos & frigidos reſolvunt: *Cochlearia*, *Siſymbrium*.

Columniferae mucilaginoſæ, lubricantes, obtundentes & maturantes ſunt; lubricant inviſcando acria in tuſſi, ſtranguria, nephritide, colica, excoriatione adeoque dolores leniunt; maturant emolliendo.

Papilionaceorum folia jumentis & pecoribus, ſemina variis animalibus eſculenta, ſunt farinacea & flatulenta ut *Fabae*, *Viciae*, *Piſa*, *Phaſeoli*, *Lentes*. Quadrupedibus præſtantiſſimum pabulum ſuppeditant, *Trifolium*, *Medicago*, *Hedyſarum*, *Vicia*, *Lotus*.

Syngeneſia compoſitorum in medicina introducta communiter amara ſunt: *Tanacetum*, *Abſynthium*, *Artemiſia*, *Chamomilla*, *Cichorium*, *Carduus benedictus*.

Orchideae ſunt aphrodiſiacæ, *Vanilla* americanorum, *Satyrium* europæorum.

Coniferae ſunt reſiniferæ & diureticæ, *Juniperus*, *Pinus*, *Abies*, *Cupreſſus*.

Cryptogamia vegetabilia ſæpius ſuſpecta continet, *Filices* odore gravi, ingratæ; *Muſci* ingrate olent; *Algae* pauciſſimæ eſculentæ ſunt, purgant; *Fungi* anceps cibus Plinio.

Plantæ floribus *nectario* a petalis diſtincto communiter venenatæ ſunt; *Aconito*, *Aquilegia*, *Mirabili*, *Narciſſo*, *Dictamno*.

Lacteſcentes plantæ communiter venenatæ ſunt, *Apocynum*, *Papaver*, *Chelidonium*, *Euphorbia*.

Locus *ſiccus* ſapidiores reddit plantas, Aromata, *Cinnamomum*, *Roſmarinus*, *Thymus*, *Salvia*, *Origanum*, *Hyſſopus*, *Meliſſa*.

Succulentus inſipidas magis, ut *Olera* pleraque.

Aquoſus ſæpius corroſivas reddit & acres, *Ranunculus*, *Cicuta*, *Perſicaria*, *Siſymbrium*.

Fructus horæi in humidis & umbroſis auſteriores, in ſiccis & ſoli expoſitis dulciores evadunt.

b. *Qualitates* plantarum, in quibus vires ſubſiſtunt, indicat ODOR, SAPOR, COLOR.

Inſipida & *inodora* vim medicam vix exercent; ſapidiſſimæ & odoratiſſimæ vero maximam ſemper poſſident vim.

Deſtructo ſapore & odore in plantis etiam vis caſtratur, ut in fœculis & magiſteriis *Ari*, *Elaterii*.

Maſticatione vires a ſapido provenientes optime explorantur.

Sapidae & *ſuaveolentes* bonæ ſunt; *nauſeoſae* & *graveolentes* venenatæ ſunt, ut *Aconitum*, *Helleborus*, *Solanum*, *Hyoſcyamus*, *Nicotiana*.

Ambroſiaca inſtar ambræ ſunt analeptica, ut *Ambra*, *Moſchus*, *Geranium* moſchatum, *Malva* moſchata: *Fragrantia* gratiſſimo odore ſe commendant, flores *Cheiranthi*, *Croci*, *Jaſmini*, *Lilii*, Tiliæ, Violæ; herba *Lavendula*, *Thymus*, *Majorana*, *Ocymum*, *Origanum*, *Meliſſa*.

Aromaticae odore & guſtu fere conveniunt: *Cinnamomum*, *Laurus*, *Camphora*, *Caryophyllus*, *Acorus*, *Angelica*, *Citrus*.

Graveolentia ſingularia ſunt, *alliacea*; *Allium*, *Cepa*, *Porrum*, *Scordium*.

Hircina, inſtar hirci; *Orchis*, *Hieracium* fœtidum; *Geranium* robertianum.

Tetra

Tetra odore ingrato notiſſima; *Cotula* fœtida, *Tagetes*, *Cannabis*.

Nauſeoſa quæ ingeſta a natura reſpuuntur; *Veratrum*, *Helleborus*, *Convallaria*, *Aſarum*, *Nicotianu*, *Colocynthis*.

184. SAPOR: ſiccus, *Creta;* ſtipticus, *fructus immaturi.* Amarus; ſalſus; acris, *Piper*, *Sinapis.* aquoſus; pinguis; acidus; dulcis; viſcoſus.

185. COLOR: a) conſtans, b) mutabilis.

Luteus amarum indicat, *Gentiana*, *Aloe*, *Chelidonium*, *Curcuma*.

Ruber acidum; baccæ *Berberidis*, Ribis, *Rubi*, *Mori*; *Poma acida*, *Sorbi*, *Roſae*, *Ceraſi;* herbæ verſus autumnum rubeſcentes, *Acetoſa*, *Oxalis*, *Lapathum ſanguineum*.

Viridis crudum; *Folia & fructus immaturi.*

Pallidus inſipidum; *Lactuca*, *Cichoreum*, *Aſparagus*.

Albus dulce; *Ribes*, *Rubus*, *Mala* dulcia, *Pruna* alba.

Nigra ingrata & ſæpius venenata; Baccæ *Atropae*, *Solani*, *Padi*.

Acidi exploratores ſunt colores cærulei ſ. violacei. e. g. Crotonis, Violæ, aliorum vegetabilium: *Caerulei* colores ab acido rubeſcunt, ab alcali affuſo vireſcunt.

Papyro cærulea uſus eſt Tournefortius, quæ ab affuſo ſucco plantæ mutato indicabat ejusdem qualitatem acidam aut alcalinam.

186. CONSISTENTIA a) exſucca; carnoſa; Poma, *Melo*, *Sempervivum:* ſuccoſa; *baccae plurimae:* glutinoſa.

b) aquoſa; viridis; alba: *Eſula*; lutea: Chelidonium; rubra.

VTILITAS
(Nuzen, Gebrauch der Pflanzen.)

187. Naturalis. *Oeconomia* naturæ; (conf. Linn. Amœn. T. VI. Politia naturæ.)

Sympathia vel *Antipathia* cum vegetabilium tum animalium.

Pan

Pan mammalium phytiphagorum domeſticorum.
Pandora inſectorum dicta, quod mala mixta bonis contineat.

Artificialis. *Culinaris*: radices, olera, fructus, varias plantas pro Cibo, Potu.
Officinalis: a) ſimplicia præparata,
b) pretium, locus.
Medica: vires, uſus.
Oeconomica: utenſilibus variis, ædificiis, inſtrumentis, opificiis; paſtoralis; tinctoria, &c.

Culturae hinc neceſſariæ cerealium, medicarum plantarum, hortorum, arborum, ſepium, pratorum &c.

Uſus plantarum tam varius & amplus, ut paucis vix deſcribi poſſit.

Paradiſus telluris obducit terram *Algis* variis, quæ generant primam terram in ſiccis petris, ad propagationem variarum plantarum

Muſcis pauperrimis, paludes formantibus in terram ſiccam, & ne gelu ſiriove deſtruantur radices, quam dein tegit Vulgus

Graminum virens, primarium Animalium alimentum, condecoratque nobiliſſimis.

Herbis, florum ſtructura admiranda, colore lucente, odore fragrante, ſapore variante ridentibus, inter quas proceres

Arbores pediſſequis ſtipatæ attollunt capita, tegmini ſunt exiguis humilibus plantis, arcent ab iis ventos, inumbrant a radiis, humectant inconſpicuo imbre, reficiunt plantas per exhalationes, multiplicant copiam, foliis ſuis tegunt hyemali tempore terram, perficiunt fructus, alliciunt vocales aëreas. Naturæ Horti.

TER-

TERMINI LATINI.

NUMERUS NUMERUM NOTAT. *)

A.

Abbreviatum perianth. 109
Abortiens flos vid. maſculus.
Abruptum pianatum fol. 59
Acaulis herba, 8
Aceroſum fol. 40.
Acinaciforme fol. 56. pericarp. 139
Acotyledones 174
Acris ſapor 184
Aculeatus caulis 19. fol. 52 perianthium 110. petiolus 67
Aculeus 84
Acuminatum fol. 47
Acute crenatum fol. 44
Acutum fol. 39. 47. perianth. 110
Adnatum fol. 37. petiolus 65. ſtipulæ 71
Adpreſſum folium. 33. pedunculus 91.
Adſcendens pedunculus 91 truncus 11
Adverſum fol. 34
Æqualis caulis 21. corolla 120. 122. perianthium 108 nectarium 130. filamentum 130. ſtylus ad ſtamina 136
Æquinoctiales ſolares flores, & vigiliæ 181
Æſtivatio 163
Aggregatus flos 159. Knautii, vid. compoſitus flos.
Agreſte ſolum 176
Alæ corollæ papilionaceæ 123. ſeminum 173
Alatus caulis 20. petiolus 63. folium 54. 59.
Albus color 125.
Alburnum 7
Algæ 14
Alliaceus odor 183
Alpinum ſolum 176
Alterna filamenta calyci 129. folia 31. pedunculi 89. rami 25
Alterne ſ. } pinnatum f. 59
Alternatim }
Altitudo loci 175
Ambroſiacus odor 183
Amentum 116. amentaceus flos. 159
Amplexicaule fol. 37. petiol. 65
Anceps caulis 14. fol. 56
Androgyna planta 172
Angioſpermia planta 149
Angulatus caulis 14. ſtigma 138. ſtylus 135. petiolus. 63
Animalia p. 1
Annulus trunci 7
Annua radix 2. planta p. 14

Ano-

*) Littera p. quibusdam locis occurrens, indicat paginam in præcognoſcendis.

Anomalus flos Tournef., vid. irregularis. 94
Anthera 131
Apertura antheræ 131. floris. 81
Apetalus flos, 158. corolla 121
Apex Raj., Tournef. Rivin; vid. anthera.
Aphyllus caulis 16
Appendiculatus petiol. 65
Appreſſum fol. 33. pedunc. 91
Approximata fol. 31. volva 119
Aqueus color hyal. 125
Aquoſus locus 176
Arbores p. 14
Arboreus truncus 9
Arena 177
Argilla 177
Arillus 149
Ariſta 115. 116. ſeminis 154
Ariſtatus pappus 153
Arma 84
Aromaticus odor 183
Arrectum fol. 33
Articulate pinnatum fol. 59
Articulata radix 4. ariſta 115. caulis 22. fol. 59 legumen 142. pedunculus 93. petiolus 67. pericarpium 139. ſiliqua 140 ſpica 99. bullus 166
Articulus 22
Artificial. methodus p. 3. 15
Arvenſe ſolum 176
Aſſurgens fol. 33. petiol. 66
Ater color 125
Attenuatus pedunculus 93
Auctus calyx, vid. calyculatus.
Avenium fol. 50
Aura ſeminalis 132
Auritum fol vid haſtatum.
Autumnatio frondeſcentiæ 179
Axillæ 29
Axillaris cirrhus 76. fol. 29 pedunc. 88. ſpina 85

B.

Bacca 146
Barba 79. 123. corollæ Rivini eſt labium inferius corollæ ringentis.
Barbatus flos Rivin. vid. ringens. fol. 52. ſtigma 138
Barometrum altimetrum 175
Bauhinus. p. 4
Biennes plantæ. p. 14. radix 2
Bifaria fol. 31
Bifidus cirrhus 77. corolla 121. fol. 43. furcæ 84 perianthium 107. ſtylus 136.
Biflora gluma 114. ſpadix 164. pedunculus 91. petiolus 62.
Bigeminatum f. Bigeminum } fol. 60.
Bijugum fol. 59
Bilabiata coroll. vid. ringens.
Bilobum fol. 43
Biloculare anthera 131 bacca 146. legumen 142 pericarp. 139. ſemen 151
Binatum fol. 59
Bini flores 94. fol. 31
Bipartita corolla 121. fol. 43 perianth. 107
Bipinnatum fol. 60
Biternatum fol. 60

Bivalvis folliculus 143. gluma 114 ſpatha 117
Botanicus p. 1
Botanica ſimplex 1. medica p. 2. œconomica p. 2. objectum ejus p. 1.
Brachiatus caulis 22. menſura 174
Bractea 87
Bracteata cyma 163. pedunc. 93. verticillus 95
Breves rami 27. petiolus 64. nectarium 130
Breviſſimæ ſtipulæ 75. ſtylus 136. petiolus 64
Brumalis 180
Bulbifer caulis 20
Bulbigera planta 171
Bulboſa radix 6
Bulbus 166
Bullatum fol. 50

C.

Caducæ bracteæ 87. fol. 58 ſtipulæ 70. calyx 105 corolla 124
Cæruleopurpureus color purpur 125
Cæruleus color 125
Cæſtus color virid. 125
Calcar corollæ 126. 123
Calendarium 180
Calix Tournef. eſt perianthium Linn. 105
Calloſum ſemen 152. nectarium 126
Calycinæ ſpinæ 85
Calyculatus calyx ſ. perianth. 111
Calyculus ſeminis 154
Calyptra muſci 118. ſeminis vid. arillus.
Calyx 105. Calycem abire in fructum Tournef. 134
Campanulata corolla 123. nectarium 126
Campeſtre ſolum 176
Canaliculatum fol. 53. petiol. 63. ſtigma 138
Capillare filamentum 128 pappus 153. ſtylus 135 folium 42. glandulæ 82 nectarium 128
Capitatum ſtigma 138. flos Raj. vid. compoſitus flos.
Capitulum 96. muſcis 131
Capreoli 76
Capſula 139. ſtaminis Malpigh. vid. anthera.
Carina, papilionaceæ corollæ 123
Carinatum fol. 54
Carnoſum fol. 55
Cartilagineum fol. 44. arillus 149
Caryophillata corolla 123
Caſtratum ſtamen 130
Catulus Tournef. vid. amentum.
Cauda ſeminis 154
Caudex aſcend. deſcend. 8. 38.
Cauleſcens planta 8
Caulinus bulbus 166. pedunc. 88. folium 29
Caulis 8
Cernuus flos 94. pedunc. 91. umbella 162
Ceſpitoſum ſolum 176. planta 171
Cichoraceus flos vaillant, vid. ligulatus.
Ciliatum fol. 44. ſpica 99 ſtipulæ 74. perianthium 107. corolla 174
Cinereus color 125
Circinalis vernatio fol. 167

Circumſepiens ſomnus 169
Cirrhifer pedunc. 88
Cirrhoſum fol. 47
--- pinnatum fol. 59
Cirrhus 76
Claſſes ſyſtematis: Linn. Præcognoſc. p. 17. characteres p. 19
Claſſes plantarum p. 2. naturæ p. 14
Clavatus pedunc. 93. petiol. 63. ſtylus 135. corolla 123
Clavus 174
Clima 175
Coadunatum folium 31
Coarctata panicula 103. pedunc. 91. rami 26
Coccineus color 125
Color 125. mutatio unius in alterum 125. vires 185
Colorata bractea 87. fol. 48 gluma 114
Columella capſulæ 139
Coma 87
Communis gemma 166. pedunc. 88. perianthium 111. receptac. 156
Comoſa ſpica 99
Compactum fol. 55
Completus flos 158
Compoſita corolla 124. corymbus 100. flos 158. 171 fol. 59. fructificatio 104 racemus 102. ſpica 97. umbella 160
Compreſſus caulis 14. fol. 54. ſiliqua. 140
Connatæ, coalitæ antheræ. 131
Concava corolla 123. glandulæ 82. fol. 53. ſtigma 138. umbella 161. receptaculum. 157
Conceptaculum 143
Concha 123
Conduplicata vernatio folior. 167. ſomnus 169
Conferti rami 25. verticilli 95. folium 54. 31
Confluentia folia 31
Conformis torſio 170
Congelatio 180
Conglobatus flos Ponted. vid. compoſitus flos.
Conglomerati flores 62. 171
Conicum receptac. 157
Conjugatum fol. 59. racemus 102
Connata anthera 131. filamenta 130. fol. 37. nectarium 130
Connivens ſomnus 169. corolla 123
Conſiſtentia 186
Contortum legumen 142. pericarpium 139
Contrarium diſſepimentum ſiliquæ 139
Convexum fol. 53. receptac. 157. umbella 161
Convoluta vernatio folior. 167. cirrhus 78
Conus. vid. Strobilus. 147 conicum receptaculum. 157
Copioſi flores 94
Corculum ſeminis 148
Cordatum fol. 42. ſtigma 138. ſiliqua 140. ſemen 150
Cornutum nectarium 126
Corolla 120
Corona ſeminis 153
Coroniforme ſtigma 138
Corticalis gemma 166
Corymbus 100

Cortex radicis 1. trunci 7
Cotyledon 149
Crassities 10. ſtyli 136
Crenatum fol. -- obtuſe -- acute -- duplicate 44. corolla 124
Creta 177
Criſpum fol. 53. planta 171
Croceus color. lut. 125
Cruciata corolla 123
Cruciformis cor. 123. ſtigma 138
Cubitalis menſura 174
Cucullatum fol. 53
Culmus 8
Cultum ſolum 176. cultura 171
Cultores botanices p. 4
Cuneiforme filamentum 128. fol. 39. nectarium 28
Cuſpidatum fol. 47
Cuticula radicis 1. trunci 7
Cyaneus color cærul. 125
Cyathiformis corolla. 123
Cylindrica ſpica 98. ſtylus 135. folium 53
Cyma 163
Cymoſus flos 163

D.

Dædaleum fol. 45
Decandria claſſis 188
Decaphyllus calyx ſ. perianth. 106. 110
Decidua bractea 87. fol. 58 ſtipulæ 70. calyx 105
Declinatus caulis 11. corolla 124. folium 33. pedunculus 9
Decompoſitum fol. 60. flos 158
Decumbens caulis 11
Decurrens fol. 37. petiol. 65. ſtipulæ 71
Decurſive pinnatum fol. 59
Decuſſata fol. 32
Defoliatio 180. 181
Defloratio 94
Deflexi rami 26
Dehiſcentia antheræ 131
Delineatio plantæ p. 27
Deltoideum fol. 41
Demerſum fol. 35
Dentatum fol. 44. radix 4 ſtipulæ 74. corolla 124 ſemen 151
Dependens fol. 33. racemus 102. ſomnus 169
Depreſſum fol. 54. oblique ſtigma 138
Dextra torſio 170
Dextrorſum volubilis 13
Diadelphia claſſis 188
Diandria 127. claſſis 188
Dianthera 127
Dichotomus caulis 22. ſtylus 136
Dicocca capſula 139
Dicotyledon 149. 174
Didymus 132. capſula 139
Didynamia claſſis 188
Differt fructificatio 104 flos 171
Difformis flos Jung Knaut. vid. irregularis. torſio 169
Diffuſus caulis 11. panicula 103
Digitatum fol. 39. 59
Dignoſcitur Fructificatio 104
Digynia 135
Dimidiatum capitulum 96 ſpatha 117
Dicœcia claſſis 188
Dioica planta 172
Dipetala coroll. 121

Diphyllus calyx ſeu perianth. 106
Diſcus 158
Diſpermum 150
Diſſectum fol. 43
Diſſepimentum capſulæ 139 ſiliquæ 141
valvis { contrarium / parallelum } Tournef. 141
Diſperma bacca 146
Diſtans verticillus 95
Diſtemonis 127
Diſticha fol. 31. rami 25 ſpica 97
Diſtincta anthera 131
Divaricatus caulis 23. ram. 26
Divergentes rami 26. ſomnus 169
Diviſæ ſpinæ 85. corolla 124
Dodecandria claſſis 188
Dodecaphyllus calyx ſ. perianth. 106
Dodrantalis menſura 10. 174
Dolabriforme fol. 56
Dorſalis ariſta 115
Drupa 144
Duplicate { crenatum / ſerratum } fol. 44
Duplicato { pinnatum / ternatum } fol. 60
Duplicatus flos 171
Duratio plantarum 182

E.

Echinatum 151. pollen 132 pericarpium 139. ſemen 151
Efflorescentia 179
Ellipticum fol. 39
Emarginatum filament. 128 fol. 46. ſtigma, 138. nectarium 128
Emplaſtratio 166
Endecaphyllus calyx ſ. perianth. 106
Enerve fol. 49
Enneandria claſſis 188
Enodis caulis 21
Enſiforme fol. 56
Epicarpius flos ſ. calyx 134
Equitans vernatio 167
Erectus caulis 11. flos 94 fol. 33. pedunc. 91. petiol. 66 racem. 102. rami 26. ſtipulæ 73. umbella 162. perianthium 108. corolla 123
Eroſum fol. 45
Eryſiphe 174
Exfolatio 180
Erxleben ordin. plantar. natur. p. 11
Externa variatio 171. partes plantarum p. 26
Extrafoliaceæ ſtipulæ 69 pedunculus 88

F.

Facies externa 165
Familiæ naturales plantarum p. 13
Farctum folium 11. truncus 9
Faſciata planta 171
Faſcicularis radix 5
Faſciculata folia 31
Faſciculus 96
Faſtigiatus caulis 23. umbella 161. flos 62
Faux corollæ 123
Femina planta / Femineus flos } 172
Fere 34

Ferrugineus color lut. 125
Fertilitas ſeminis 150
Fibroſa radix 3. fibrilla 1
Ficus ſtructura 188
Filamentum 127
Filices p 14
Filiformis pedunc. 93. ſtigma 138. ſtylus 135
Fimetorum ſolum 176
Fiſſa corolla 121. fol. 43 calyx ſ. perianth. 107 ſtipulæ 74. ſtigma 137
Fiſtuloſus truncus 9
Flaccidus pedunc. 91. racem. 102
Flagella 24
Flammeus color lut. 125
Flavus color 125
Flexuoſus caulis 13. pedunc. 91
Floralis gemma 166. fol. 29
Florendi modus veterum 94
Floris perianthium 105. receptaculum 155
Flores ſolares 181
Floſculoſa coroll. 124
Floſculus 155
Floreſcentiæ Calendarium 180. p. 25
Flos 94. ejus partes 94. 159 eſſentia 94. nutans, p. 25 ſubmerſi 132. ſimplex 155
Fluviale ſolum 176
Folia 28. 105. 125
Foliaceæ glandulæ 82. ſpica 99. ſtigma 138
Foliaris cirrhus 76. gemma 166. ſpina 85
Foliatus caulis 16. pedunc. 93. racem. 102. Thyrſus 101 Foliatio 167
Folioſum capitulum 96
Folliculus 143
Fontanum ſolum 176
Foſſæ 176
Fragrans odor 183
Frondeſcentia 179. 180
Frondoſus prolifer flos 171
Frons 24
Frequens flos vid. vulgaris.
Fructificatio 104. 94. ejus perianthium 105. partes ejus 104. receptaculum 155
Fructus perianthium 105 eſſentia 94. receptaculum 155
Fructus 104
Fructeſcentia 104. 181
Frutices p. 14
Fruteſcens)
Fruticoſus) truncus 9
Fulcra 62
Fulcrati rami 26
Fulvus color 125
Fungi p. 14
Furcæ 84
Fuſcus color 125
Fuſiformis radix 3

G.

Galea corollæ Rivin. eſt labium ſuperius corollæ ringentis 120
Geminæ ſtipulæ 68. folium 29. calyx 105
Geminatus pedunc. 90
Gemma 166
Gemmatio 166
Generationis myſteria 172
Geniculata ariſta 115. caulis 13. pedunc. 93
Genus p. 2
Germinatio 178. 180. p. 25
Germen 134
Gibbum fol. 54
Gilvus color 125

Glaber caulis 19. fol. 48 gluma 114. petiol. 67
Glandulæ 82
Glanduloſum folium 40
Glaucinus color 125
Globoſum capitulum 96 corolla 123. radix 5. ſtigma 138. perianthium 168 ſtrobilus 146
Glochides 81
Glomerata ſpica 97
Gluma 113. glumoſus flos 159
Glutinoſitas 83
Gramina p. 14
Grandiflora planta 171
Gracialis 180
Granulata radix 6
Groſſificatio 180
Gymnodiſpermum 150
Gymnoſpermia planta 149
Gynandria claſſis 188
Gummi 83

H.

Habitus 165
Halitus elaſticus pollinis 132
Halleri claſſes plantar. p. 9
Hami 81. feminis 154
Hamoſæ ſetæ 80
Haſtatum fol. 42
Heptandria claſſis 188
Heptaphyllus calyx ſ. perianthium 106
Herbaceus truncus 9. plantæ p. 14. herba 1
Hermaphrodita planta, & flos 172
Hexagonus caulis 15
Hexandria claſſis 188
Hexaphyllus calyx ſ. perianthium 106
Hexapoda mentura 10
Hilum 149
Hircinus odor 183
Hirſutum filamentum 128 caulis 19. corolla 124 nectarium 128
Hirtus caulis 19
Hiſtoria naturalis p. 1
Hiſpidus caulis 19. fol. 52 gluma 114
Horizontale fol. 33. flores 94. radix 4
Horologium 181
Humus 177
Hyalinus color 125
Hybrida planta, flos 172
Hypocarpius flos ſ. calyx 134
Hypocrateriformis coroll. 123

I.

Ianthinus color purpur. 125
Icoſandria claſſis 188
Imbricans ſomnus 169
Imbricatus calyx ſ. perianth. 111. folia 31. ſpica 99. truncus 16. vernatio 167
Imparipinnatum fol. 59
Imperfectus flos Riv. Knaut. Ponted. vid. apetalus.
Inæqualis coroll. 120. 122 filamentum 130. perianth. 108. nectarium 130
Inæquivalvis æſtivatio 168
Inanis truncus 9
Incanus color ciner. 125. 79
Incarnatus color 125
Inciſum fol. ſ. diſſectum 44
Inclinata vernatio 167
Includens ſomnus 169
Incompletus flos 158
Incraſſati pedunc. 93

In-

Incumbens anthera 131
Incurvatus caulis 11
Incurvatio corollæ 170
Incurvus aculeus 84. fol. 33. hamus feminis 154
Inferus calyx ſ. flos 134 germen 134. perianth. 110
Inflatum legumen 142. perianth. 108. pericarpium 139
Inflexus caulis 11. fol. 33 rami 26
Infloreſcentia 94
Infundibuliformis coroll. 123
Inſertus petiol. 65. folium 37. 54
Inſitio 166
Inſectorum nidus 174
Injurians planta 171
Inoculatio 166
Integer caulis 21. fol. 41 perianth 107. corolla 124
Integerrimum fol. 44. ſtipulæ 74
Interfoliacei pedunc. 88
Interna variatio 171. partes plantarum p. 25
Interrupta ſpica 98
Interrupte pinnatum f. 59
Intorſio vid. Torſio.
Intrafoliaceæ ſtipulæ 69
Invertens ſomnus 169
Involucratus verticill. 95
Involucrum 112
Involvens ſomnus 169
Involuta vernatio 167
Inundatum ſolum 176
Irregularis coroll. 122. filamentum 130. nectarium 130
Julus Tournef., vid. amentum.

L.

Labia coroll. 123
Labiatus flos, vid. ringens coroll.
Lacerum fol. 45. corolla 123
Laciniæ coroll. 120. 123 filamenti 127. ſtigmatis 137. nectarii 127
Laciniatum fol. 43
Lacteſcentia 174
Lacteus color alb. 125
Lacunoſum fol. 50
Lacuſtre ſolum 176
Lapides p. 1
Laxus caulis 11
Lævis caulis 18
Lamina corollæ 120
Lana 79
Lanatum fol. 52. caulis 19
Lanceolatum fol. 40. ſtipulæ 72. ſiliqua 140
Lateralis anthera 31. 131. flores 94. ſtipulæ 69
Laterifolii pedunc. 88
Latifolia planta 171
Latitudo climatis 175
Laxus caulis 11. racem. 102
Legumen 142
Liber trunci 7
Ligulata coroll. ſ. flos 124
Limbus coroll. 120
Linnæi ordines plantarum. p. 9. claſſificatio plantar. p. 16. characteres claſſium. p. 19. ordines claſſium p. 21
Linea menſura 10. 174
Lineare fol. 40. petiol. 63 ſpica 99
Lineatum fol. 49
Lignum radicis 1
Ligulatus flos 56. 158. corolla 124

Linguiforme fol. 56
Littorale ſolum 176
Lividus color ciner. 125
Lobatum fol. 43. ſiliqua 140
Loculamentum capſulæ Loculi 139. antheræ 131 baccæ 146. ſeminis 151
Locus 175
Longa filamenta 130. perianth. 109. rami 77. ſtipulæ 75. ſtylus 136. petiolus 63. nectarium 130
Longitudo climatis 175
Lucidum fol. 48
Lunatum fol. 42. ſtipulæ 72
Luridus color niger 125
Luteus 125
Luxurians flos 171
Lyratum fol. 43

M.

Magnitudo, vid. menſur.
Marceſcens flos contabeſcit, nec decidit. corolla 124. ſtylus 136. ſtigma 138
Margines agrorum vide verſuræ.
Marinum) ſolum 176
Maritimum)
Mas planta)
Maſculus flos) 172
Mediocres ſtipulæ 75. petiolus 64
Medulla radicis 1. carnoſa, lignoſa 1. trunci 7
Membranaceum fol. 54. petiol. 63
Membranatus caulis 20
Menſura magnitudinis, craſſitiei 10. trunci 174 fol. 57. pedunc. 92. petiol. 64. ramor. 27
Meteorici ſolares flores, & vigiliæ 18
Methodus, artificialis, p. 3. 15. naturalis p. 3
Mineralogia p. 1
Modus florendi veterum 94
Monadelphia claſſis 188
Monandria 127. claſſis 188
Monanthera 127
Monocotyledon 149. 174
Monœcia claſſis 188
Monogynia 135
Monopetala corolla 121 flos 171
Monophyllus calyx ſ. perianth. 106. involucrum 112. ſpatha 117
Monoſpermum 150. bacca 146
Monoſtachyus caulis 97
Monoſtemonis 127
Montanum cum collibus ſolum 176
Mucronatum fol. 47
Morboſæ plantæ 174
Multangularis caulis 15
Multicapſularis capſula 139
Multidentata corolla 121
Multifidus cirrhus 77. fol. 43. perianth. 107. ſtylus 136
Multiflora gluma 114. ſpadix 164. petiolus 62. pedunculus 91
Multilocularis capſula 139
Multipartita coroll. 121 fol. 43. perianth. 107
Multiplicata planta 171
Multivalvis gluma 114
Muniens ſomnus 169
Muricatus caulis 19
Murrhinus color alb. 125
Muſci p. 14

Mutica gluma 115. planta 171
Mutilata planta 171
Myrrhinus color alb. 125

N.

Natans fol. 35
Naturalis utilitas vegetabilium 187. methodus p. 3
Natura p. 26
Naturalia p. 1
Naturalis hiſtoria p. 1
Nectarium 126
Nemoroſum ſolum 176
Nervoſum fol. 49
Nidulantia ſemina 146. 139
Niger color 125
Nitidum fol. 48
Niveus color alb. 125
Nomina plantarum p. 3 generum, ſpecierum, trivialia p. 3
Nucamentum Tournef., vid. amentum.
Nucleus 154
Nudum amentum 116. capitulum 96. caulis 16. cyma 63. fol. 48. pedunc. 93 petiol. 67. racem. 102. receptac. 156. ſemen 149 Thyrſus 101. verticill. 95 folium 48. flos 158
Nutans umbella 162. caulis 11. pedunculus 91, flos 94
Numerus fol. 30
Nux 154

O.

Obliqua calyptra 118. caulis 11. fol. 34. obliquitas corollæ 170
Oblongum fol. 39
Ob (cordatum) (ovatum) fol. 34. filiqua 140
Obſolete lobatum &c. fol. 43
Obtuſum fol. 46. perianth. 110
Obtuſe crenatum fol. 44 ſtigma 138
Obverſe (cordatum) (ovatum) fol. 34
Obverſum fol. 34
Obvoluta vernatio 167
Octandria claſſis 188
Octona fol. 32. rami 25
Octophyllus calyx ſ perianth. 106
Odor 183
Oeconomia naturæ, artis 187
Oppoſita filamenta calyci 129. fol. 32. pedunc. 89 rami 25
Oppoſite pinnatum fol. 59
Oppoſitifolii pedunculi 88
Oppoſitifoliaceæ ſtipulæ 69
Orbiculatum fol. 38. ſtigma 138
Ordo plantarum p. 2
Orgya menſura 10. 174
Oſſeum ſemen 152
Ovale fol. 38
Ovatum fol. 38. ſpica 98 ſtigma 138. legumen 142
Ovarium 134

P.

Paginæ folii 48
Palatum corollæ 123
Palea 156
Paleaceus pappus 153. receptac. 156. flos Raj. vid. maſculus.
Palmæ p. 14
Palmaris menſura 10. trunci 174
Palmatum fol. 43. radix 5

Palmites 24
Paluſtre ſolum 176
Panduriforme fol. 42
Panicula 103
Paniculatus caulis 23
Papilionacea coroll. 123
Papilloſum } fol. 51
Papuloſum }
Pappus 153. 173
Parabolicum fol. 39
Parallelum diſſepimentum ſiliquæ Tournef. 141. 139
Paraſitica planta 177
Partes fructificationis 104 corollæ, petali 120
Partiale involucrum 112 pedunc. 88. umbella 160 perianthium 112
Partita coroll. 121. fol 43 perianth. 107
Patens caulis 23. corol. 123 fol. 33. pedunculus tum, ratione ſui ortus, tum reſpectu ſociorum 91. perianth. 108. petiol. 66 rami 27. ſtipulæ 73
Patentiſſima corolla 123
Pedalis menſura 10. 174
Pedatum fol. 59. racemus 102
Pedicellus 88
Pedunculares cirrhus 76 glandulæ 82
Pedunculati flores 94. verticilli 95
Pedunculus 88
Peltichenum 104
Pelta 104
Peltatum fol. 36. ſtigma 138
Pendulus pedunc. 91. racem. 102
Pentagonus caulis 15
Pentandria claſſis 188
Pentaphyllus calyx ſ. perianth. 106
Perennis radix 2. folium 58
Perfectus flos Raj. Rivin. Kramer. Ponted., vid. Petalodes
Perfoliatum fol. 37
Perianthium 105
Pericarpium 139. 116. 125
Perſiſtens bractea 87. ſtipula 70. folium 58. calyx 105. ſtylus 136. perianthium 110. corolla 124 ſtigma 138
Perpendicularis radix 4
Perſonata coroll. 123
Petalinum nectarium 126
Petalodes flos, qui petalum (120) fert.
Petalum 120
Petiolaris cirrhus 76. gemma 166. glandula 82. pedunc. 88
Petiolatum fol. 36
Petiolus 62
Philyra convoluta pollinis 132
Phœniceus color purpur. 125
Piceus color niger 125
Pileus fungorum 131
Piloſum fol. 52. receptac. 156. caulis 19. ſemen 154
Pili 79
Pinnatifidum fol. 43
Pinnatum fol. varie 59
Pinguis ſapor 184
Piſtillum 133. abire in fructum Tournef. 134
Placenta Bœrh., vid. recept.
Placentatio 174
Planipetala corollula, vid. ligulata.

Planum fllamentum 128 fol. 53. nectarium 128 receptac. 57. umbella 161
Plantæ herbaceæ p. 14. perennes, biennes, annuæ p. 14. delineatio p. 27. 38 terminologia p. 27. 38 parasitica p. 38
Plena variatio 171. flos 171
Plicatum fol. 53. planta 171 vernatio 167. corolla 124
Plumatæ setæ 80
Plumbeus color ciner. 125
Plumosus pappus 153. stigma 138. semen 154
Plumula 148
Pollen 132
Pollicaris mensura 10. trunci 174
Polyadelphia) Polyandria) classis 188
Polycotyledon 149
Polygamia classis 188. polygama planta 172. segregata 105
Polygonus caulis 15
Polygynia 135
Polypetala coroll. 121. flos 171
Polyphyllus calyx s. perianth. 106. involucrum 112
Polyspermum bacca 146
Polyspermum 150
Polystachyus caulis 97
Pomum 145
Porcellaneus color alb. 125
Prasinus color virid. 125
Pratense solum 176
Præmorsum fol. 46. radix 3
Præsentes Stipulæ 69
Prismaticum pericarpium 139
Procumbens caulis 11
Prolifer caulis 22. variatio 171. umbella 160. flos 171
Prolificatio 171
Propago 154. musci 148 seminis 154
Proportio 10
Proprium nectarium 126 perianthium 106. 112 receptac. 155
Prunus, vid. drupa.
Pubes 79
Pubescens folium 39. stigma 138. Rubescentia 171
Pullus color niger 125
Pulposum fol. 55
Punctatum fol. 51. recept. 156
Pungentes stimuli 36
Puniceus color ruber 125
Purpureus color 125

Q.

Quadrangularis caulis 15 fol 41
Quadrifidus calyx s. perianth. 107. stylus 136
Quadrijugum fol. 59
Quadrilobum fol. 43
Quadripartitum fol. 43
Quadriqueter caulis 15
Qualitates 183. cujusque classis 183
Quaterna) Quina) fol. 31. 32. rami 25
Quinatum fol. 59
Quinquangularis caulis 15 fol. 41
Quinquefida coroll. 121 fol. 43. perianth. 107 stylus 136
Quinquelobum fol. 43
Quinquepartita cyma 163 fol. 43

Quinquiqueter caulis 15
Quinquejugum folium 59
R.
Racemus 102
Rachis 164. 116
Radiata coroll. 124. umbell. 161. flos 158
Radicale fol. 29. pedunc. 88
Radicans caulis 12
Radicatum ſ. radicans fol. 35
Radius 158. radiatus flos 158
Radix 1
Raji ordines plantarum p. 6
Rameus pedunc. 88. folium 29
Rami 24. radicis 1
Ramoſiſſimus caulis 23
Ramoſus caulis 23. cyma 163. radix 3. ſetæ 80 ſpadix 164. ſpica 99. folium 59
Receptaculum 155
Reciproca torſio 170
Reclinata fol. 33. vernatio 167
Recluſionis tempus 181
Recta ariſta 115. calyptra 118. aculei 84
Rectiformis corolla 123
Rectiſſima fol. 33
Recurvata ariſta 115. aculeus 84. fol. 33. petiol. 66 pedunculus 91
Recutita bacca 146
Reflexum filament. 128 fol. 33. perianth. 108. rami 26. ſtipulæ 73. nectarium 128
Refractus ſ. retrofractus follic. 143
Regelationis 180
Regio 175
Regularis coroll. 122
Remotum fol. 31. volva 115
Reniforme fol. 42
Repandum fol. 45
Repens caulis 12. radix 4
Reſina 85
Reſupinatum fol. 34. torſio 170. pedunculus 91
Rete folii 28
Retroflexi rami 26
Retrofractus ſ. refractus pedunc 91
Retuſum fol. 46
Revolutus cirrhus 78. fol. 33. vernatio 167. corolla 124
Royeni claſſes plantarum p. 7
Rhombeum fol. 41
Rictus corollæ 123
Rigida fol. 33. caulis 11
Rimoſus caulis 17
Ringens coroll. 123
Riparum ſolum 176
Roſacea corolla 123
Roſtellum 148
Rotata coroll. 123
Rotundatum fol. 40
Ruber color 125
Rubigo 174
Ruderale ſolum 176
Rugoſum fol. 53
Rupeſtre ſolum 176
Runcinatum folium 42
S.
Sagittatum fol. 42. ſtipula 72
Salſus ſapor 184
Sanguineus color ruber 125
Sapor, qualitas 184
Sarmentoſus caulis 12
Scaber caulis 19
Scabrum fol. 52

Se-

Semen 151
Scabrities 79
Scala barometri, altimetri 175
Scandens caulis 13
Scapus 8
Scarioſum fol. 54. perianthium 111
Scutellum 104
Secundi flores 94. ſpica 97 racemus 102
Sedes floris Raj., vid. receptac.
Sejugum folium 59
Semen 125. 139. 148. nidulans baccæ 146. varietates 173. eſſentia 148. fertilitas 150. receptac. 155
Semiamplexicaule fol. 37
Semifloſculoſa corolla Tournef. 124
Semifloſculus Tournef., vid. ligulatus flos.
Seminale fol. 29
Seminatio naturæ 173
Sempervirens folium 58
Semiteres caulis 14. petiol. 63
Sena fol. 29. rami 25
Septeni rami 25
Sericeum fol. 52
Serratum fol. 44. ſtip. 74 perianth. 108. corol. 124
Seſſilis flos 94. fol. 37. pappus 153. ſtip. 71. verticill. 95
Setæ 80
Setoſum receptac. 156. ſtylus 135. folium 42
Sexangularis caulis 15
Sexus 171
Sicca drupa 144. ſapor 184
Signa characteriſtica p. 2
Silicula 140
Siliqua 140
Simplex cauda ſem. 154 caulis 21. cirrhus 77. corymbus 100. flos 155 fructificatio 104. racemus 102. ſetæ 80. ſpadix 164. ſpica 97. ſpina 85. umbella 160. radix 4 folium 59. calyx 105
Simpliciſſimus caulis 21
Singulæ plantæ p. 2
Siniſtra torſio 170
Siniſtrorſum volubilis 13
Sinuatum fol. 43
Solares flores 181
Solidus bulbus 166. caulis 9
Solitarius flos 94. pedunc. 90. ſtipulæ 68
Solum plantarum 176
Somnus 169. 181
Spadix 164. ſpadiceus flos 164
Sparſi flores 94. pedunc. 89 rami 25. folium 31
Spatha 117
Spathulatum fol. 39
Species p. 2
Specificum nomen 171
Spica 97
Spicilla ſ. ſpicula 97
Spina 85
Spineſcens petiol. 67. ſtipul. 70
Spinoſus caulis 19. fol. 44 perianth. 110
Spirale filament. 128. vernatio 167. nectarium 128
Spithama menſura 10. 174
Sponſalia 172
Squamatum amentum 116 bulbus 166. caulis 16 pedunc. 93. folium 32

Squarrosus calyx s. perianth. 111. fol. 43
Stagna, vid. fossæ.
Stamen 127
Stamineus flos Raj., vid. apetalus.
Stellata fol. 32. setæ 80 flos Morisi. vid. radiatus.
Sterilis flos Tournef., vid. masculus.
Stigma 137
Stimuli 86
Stipes 8
Stipitatus pappus 153
Stipticus sapor 184
Stipula 68
Stipularis gemma 166 glandulæ 82
Stipulatus caulis 20
Stoloniferus caulis 11
Striatus caulis 18. fol. 49 stigma 138
Strictus caulis 11. fol. 33 pedunc. 91
Strigæ 79
Strigosum fol 52
Strobilus 147
Structura externa, interna plantarum p. 2
Stylus 135
Subamplexicaule fol. 37
Subaxillare fol. 29
Subcæruleus color cærul. 125
Subcordatum fol. 34
Subdivisus caulis 17
Suberosus caulis 17
Submersum fol. 35
Submersio 7
Subovatum fol. 34
Subramosus caulis 23
Subrotundum fol. 38. capitulum 96. siliqua 140
Subulatum filament. 128 fol 40. 56. stipulæ 72 stylus 135. nectarium 128 receptaculum 157
Succulenta drupa 144. arillus 149
Suffruticosus truncus 9
Suffrutices p. 14
Sulcatus caulis 18. fol. 49
Sulphureus color lut. 125
Superus calyx s. flos. germen 134. perianth. 110
Supradecompositum fol. 61
Suprafoliaceus pedunc. 88
Sylvaticum solum 176
Syngenesia classis 188
Systema p. 3
Systematici univers. p. 4 partiales p. 5

T.

Tectum semen 149
Tempus 178
Tenuifolia planta 171
Tenuis stylus 136. folium 55
Teres caulis 14. fol. 54 pedunc. 93. petiol 63
Tergeminum fol. 61
Terminalis arista 115. flos 94. pedunc. 88. spina 85
Terminologia 27. 38
Termini technici p. 2
Terni flores 94. fol. 31. 32 rami 25
Ternatum fol. trinatum 59
Terra 177. 105
Tessellata fol. 39
Testaceus color lut. 125
Teter odor 183
Tetraëdra siliqua 140
Tetradynamia classis 188
Tetragonus caulis 15
Tetrandria classis 188
Tetrapetala coroll. 121. 125

Tetraphyllus calyx ſ. perianth. 106. involucrum 112
Thalamus Vaillant. vide recept.
Thalaſſinus color virid. 125
Thyrſus 101
Tomentoſus caulis 19 fol. 52
Tomentum 79
Toroſum pericarpium 139
Torſio 170
Tortilis ariſta 115
Foruloſa ſiliqua 140
Tournefortii claſſes plantarum p. 15
Transverſum diſſepimentum ſiliquæ 141
Trapeziforme fol. 41
Triandria claſſis 188
Triangularis caulis 15. fol. 41
Tricapſulare pericarp. 139
Tricocca capſula 139
Trifidus cirrhus 77. cyma 163. fol. 43. furcæ 84 perianth. ſ. calyx 107 ſtylus 136
Triflorus petiolus 62
Triglochis 81. hamus ſem. 154
Trigonus caulis 15
Trijugum fol. 59
Trilobum fol. 43. ſtigma 138
Trilocularis bacca 146. pericarp. 139
Trinerve fol. 49
Tripartita cyma 163. fol. 43. perianth. 107
Tripetala coroll. 121
Triphyllus calyx ſ. perianth. 106
Tripinnatum)
--cum impari)
(bigeminum) fol.
Triplicato(pinnatum) 61
(ternatum)
Triplicatus flos 171
Triplinerve fol. 49
Triqueter caulis 15. fol. 56 pedunc. 93. petiol. 63 ſiliqua 140
Triſperma bacca 146
Triternatum fol. 61
Triviale nomen p. 3
Tropici ſolares flores & vigil. 181
Truncatum fol. 46. ſtigma 138. perianthium 158
Truncus 7. 31. 1
Tuba Vaillant. vid. ſtylus.
Tuberoſa radix 5
Tuberculum 104
Tuber 166
Tubuloſa coroll. 124. fol. 55. perianth. 108. flos 158
Tubus coroll. 120
Tunicatus bulbus 166. caulis 17
Turbinatum pomum 145 perianthium 116. pericarpium 139
Turgidum legumen 142
Turiones 166
Tyrianthinus color purpur. 125

V.

Vaginans fol. 37. petiol. 55 ſtip. 71. caulis 16
Valva glumæ 113
Valvata æſtivatio 168
Valvula capſulæ 139
Variatio, varietas 171. p. 25
Vegetabilia p. 1
Vegetatio p. 25

Venoſum fol. 155
Ventricoſa ſpica 98. cor. 123
Vernatio 167. frondeſcentiæ 179
Verſatilis anthera 131
Verſurarum ſolum 176
Verticales flores 94. fol. 34
Verticaliter cordat. ovat. fol. 34
Verticillata fol. 32. pedunc. 89. rami 25
Verticillus 95
Vexillum papilionaceæ coroll. 123
Vigendi tempus 181
Vigiliæ 181
Villoſus caulis 19. fol. 52 receptac. 156
Villus 79
Violaceus color 125
Virgatus caulis 23
Viridis color 125
Vires plantarum 183
Viroſus odor 183
Viſcidum fol. 51
Viſcoſitas 83
Viſcoſus ſapor 184
Vita plantarum 172. p. 26
Vitreus color hyal. 125
Vivipara planta 171
Volva 119
Volubilis caulis 13
Vulgaris flos 171

U.

Uliginoſum ſolum 176
Umbella 160. ſeſſilis 90 ſpuria 160
Umbellatus flos 160
Umbellula 160
Umbilicatum fol. vid. peltatum.
Umbilicus fructus eſt fovea relicta, ubi antea floris ſuperi receptaculum fuit, calyce exarido plerumque cincta: e g. Pyrus.
Umbo Morif., vid. diſcus.
Uncinatum ſtigma 138
Undatum folium 53
Undulatum fol. 53. corolla 124. 125
Unguis corollæ 120
Unguicularis menſura trunci 10 174
Unicus flos 94. ſpica 97 anthera 131
Uniflora gluma 114. ſpadix 164. petiolus 62. pedunculus 91
Unilabiata, coroll. vid. ringens.
Unilaterales flores 94. racem. 102
Unilocularis anthera 131 bacca 146. legumen 142 ſemen 151. capſula 139
Univerſale involucrum 112 umbella 160
Univalvis gluma 114. ſpatha 117
Urceolatum, vid. ventricoſ.
Urens caulis 19. ſtimuli 86
Uſtilago 174
Utriculi 82
Utilitas plantarum 187. p. 2

X.

Xerampelinus color 125

Z.

Zoologia p. 1

TER-

TERMINI GERMANICI.

A.

Abblühen 94
Ablegen der Gewächse 7
Æcker unbeſäte 176
Achſelblätter 29
Æhre 97 *deren Arten* 97. 99. 116
Afterblätter 68. *deren Arten* 68--75
Aftermooſe p. 14
Alpen 176
Alter 181
Anhöhen, Hügel 176
Anſaz der Frucht 104
Apfel 145
Aufblühen 179
Auge, Knoſpe 166. *ihre Lage* 174
Ausſchlagen 178
Æſte 24
Aſtblätter 29

B.

Bäche 176
Bälglein 113
Bart 79. 123
Bäume p. 14
Beere 146
Beſaamen der Pflanzen 173
Birne 145
Blätter 28. *deren Arten* 28--61. 82. *Lage* 167
Blatanſäze 68. *deren Arten* 68--75
Blatgabel 76
Blatſtielgabel 76
Blätterſtiel 62
Blume 94. 158--165. 171 172. 181
Blumenblat 29. 120
Blumendecke 105--111
Blumenkelch 105
Blumenknopf 95
Blumenſchaft 88
Blumenſcheide 117
Blumenſtand 94
Blumenſtaub 132
Blumenſtiel 62. 88. *deſſen Arten* 88--93
Blumenſtielgabel 76
Blumenſtüze 155
Blüte 120--125. *Farbe* 125 *Zeit* 94
Boden, Betten 155
Borſten 80
Brennſpizen 86
Brunnen 176
Büchſe 96
Bund 96
Buſchblätter 31
Buſchel 103. 100

C.

Calender der Blumen 180
Clima 175

D.

Dangeln 40
Deckblätter 87
Deckel, der Hülſe 139
Dolde 91. 160. *Arten* 160--162. *unächte Dolde* 163
Dornen 84
Drehen, Wenden der Pflanzen 170

Drü-

*) *Epitheta*, cum cuivis termino in ordine alphabetico latino annexa occurrunt, omiſſa heic ſunt ob anguſtiam ſpatii.

Drüſen 82

E.

Ehen der Pflanzen 172
Entſtehung der Pflanzen 104
Erde 177
Erdreichs Natur 177

F.

Fächer 131. der Hülſe 139
Fahne 123
Farbe der Blüte 125. der Pflanzen 183
Farnkräuter p. 14
Felſen 176
Felder 176
Filz 79
Flüſſe, Bäche 176
Flügel der Blume 123. des Saamens 154
Frucht, ihre Entſtehung 104
Fruchtbalg 143
Fruchtknoten 134
Fruchtſtiel 88--93
Fruchtſtützen 155

G.

Gabel, Rancken 76--78
Gäblein 76
Gaumen der Blüte 123
Gärten 176
Garten, Erde 171
Gebræhme 120
Geburtsort 175
Gegend 175
Gehäuſe der Frucht 139
Geruch der Pflanzen 183
Geſchmack der Pflanzen 183
Granen 115
Græben 176
Græſer p. 14
Griffel 135
Grün werden 179

H.

Hacken 81. des Saamens 154
Halm der Græſer 8
Haare 79
Haarkrone 153
Haut 149
Harz 83
Hauptwurzelſtamm 1
Helm 113. 114
Honigbehæltniß 126
Holz der Wurzel 1 des Stammes 7
Holzlage 1
Hügel 176
Hülſe-Schote 142
Hülſe, Schaale 139
Hut 118. 123

I.

Jahr des Stammes 7

K.

Kappe 118
Kæzlein 116
Keimen 166. Keim 148
Kelch 105
Kern 148
Kernfrucht 145
Klappen der Hülſe 139
Kleber 83
Knolle 166
Knoſpe 166. 167
Knopf 95. der Hülſe 139
Kolbe 164
Köpfen 96
Kranen 154
Kragen 119
Krankheiten der Pflanzen 174
Kræuter p. 14
Kreide 177
Kreuzblume 123
Krone 100. des Saamens 153
Kronenblatt 120

L.

Landwege 176
Lappen 120. 127
Leimig 83

M.
Mark der Wurzel 1 des Stamms 7
Maas der Pflanzen 10. 174
Meer 176
Milch enthaltende Pflanzen 174
Miſthaufen 176
Mooſe p. 14
Morcæſte 176
Moorland 176
Mündung der Blumenröhre 120
N.
Nagel der Blüte 120
Nadelblætter 40
Narbe, Spize 137. 149
Nebenfaſern 1. Blætter 87
Nuß 154
Nuzen der Pflanzen 187
O.
Oculieren 166
Oberhaut der Wurzel 1
Oefnung der Blüte 131
Ortslage 176. überſchwemmte 176
P.
Palmen p. 14
Platte, geſpaltene, eingeſchnittene 120
Platt blühende Blümchen Blume 158
Pflanze p. 14. ihre Arten 171--174. Eigenſchaften, Kræften 183. 184. wenden, drehen 170
Pfropfen 166
Q.
Quirl 95
R.
Rachen 123
Rancke 102. 76
Rand 120. 176
Renck 116
Regenſchirmblume 160
Keiſer 24
Rinde der Wurzel p. 38 des Stamms 7
Riſpe, Ripe 103
Röhre der Blüte 120
S.
Saftbehæltniß, Saftgrube 126
Saamen 148. 154
Saamen-Behæltniß 139
Blætter 29
Zeitigung 104. 108
Staub 132
Sand 177
Sæulgen 139
Schaale, Hülſe 139
Schaft der Græſer 8
Scheibe 158
Scheidewand der Hülſe 139. 141
Schelfe 142
Schifgen 123
Schild 104
Schirmblume 123
Schlaf der Blumen 169. 181
Schlauch 82
Schlingeln 76
Schlund 123
Schmarozer Pflanze p. 38
Schnabel 123
Schote 140. 142
Schüſſele 104
Schuppen 32
Schwanz des Saamens 154
Schwimmblætter 35
Seeteiche 176
Spatelſcheide 117
Sporn der Blüte 123
Spindel 164
Splink des Stamms 7
Spize, Narbe 137. 138

Stamm 1--27. *Blætter* 29
Stacheln 85
Staubfæcher, *Staubbeutel* 131
Staubfæden 127--130
Staubgefæſſe 127
Staubwege 133. 135
Stauden p. 14
Steinfrucht 144
Stengel 8. 29
Stempfel 133
Stiel 8. 62--67. 135
Stielblætter 36
Stielloſe Pflanze 8
Strand 176
Strœuche p. 14
Straus 100. 101
Strunck, *Stiel* 8
Stunden gewiſſe ſich öfnende Blumen 181
Stuzen 62--67. *der Frucht* 155. 156
Sümpfe 176

T.

Thonfeld 177
Torf 176
Traube 102

U.

Ueberzug 79
Ufer 176
Uhr der Pflanzen 181
Umfang 8. 112
Umſchlag 112. 149

W.

Wachen der Blumen 181
Waffen 84
Wæhrung der Blumen 182
Wælder 176
Waſſergeſchos 24
Wetter ſich richtende Blume 181
Wiederhacken 81
Wieſe 176
Wolle 79. 153
Wulſt 119
Wurſt 116
Wurzel p. 38. *Würzelchen* 148
Wurzelſproſſen 166. 11

Z.

Zapfen 116. 147
Zaſern 1
Zeit der Blüte 178
Zopf 87
Zweig 24
Zwiebel 166. *Wurzel* 6
Zwitterpflanze 172

PLANTARVM QVARVNDAM

DESCRIPTIO BOTANICA

QVOAD

GENERA, SPECIES,

LOCVM NATALEM, TEMPVS FLORENDI

VSVM.

Classis I.

MONANDRIA. Mit einem Staubgefäſſe.

Ordo I.

MONOGYNIA, Mit einem Staubwege.

1. HIPPVRIS. (Schafthalm, Thannwedel,) Linnæi Genus II.

Calyx vix ullus. *Margines* duo, oppoſiti, minimi, coronantes germen.
Corolla nulla.
Stamen. *Filamentum* unicum, receptaculo floris inſidens. *Anthera* ſemibifida.
Pistillvm. *Germen* oblongum, infra receptaculum. *Stylus* unicus, ſubulatus, erectus, intra ſtamen, ſtamine longior. *Stigma* acutum.
Pericarpivm nullum.
Semen unicum, ſubrotundum, nudum.
Species *Vulgaris*, (gemeiner S.) Equiſetum paluſtre, brevioribus foliis, polyſpermum. Locus. Europæ fontibus, paludibus. *Flos.* Junio.

MONANDR. Ord. II. Digynia, Mit zwey Staubwegen.

2. CALLITRICHE; (Waſſerſtern) Stellaria aquatica. Linn. G. 13.

Cal. nullus.
Cor. *Petala* duo, incurva, acuminata, canalicuta, oppoſita.
Stam. *Filament.* unicum, longum, recurvum. *Anthera* ſimplex.
Pist. *Germen* ſubrotundum. *Styli* duo, capillares, recurvi. *Stigmata* acuta.
Peric. *Capſula* ſubrotunda, quadrangularis, compreſſa, bilocularis.

Sem. solitaria, oblonga. *Observat.* C. verna *monoica* est.
Spec. 1) *Verna*, (Frühlings-W.) foliis superioribus, ovalibus, floribus androgynis. *Loc.* Fossis aquosis. *Flos.* Maj.
2) *Autumnalis*, (Herbst-W.) foliis omnibus linearibus, apice bifidis, floribus hermaphroditis. *Loc.* Fossis aquosis. *Flos.* Autumno. *Usus.* Paludes profundos implet, ut transitus facilitetur.

3. BLITVM. (Bermelte) Linn. G. 14.

Cal. *Perianthium* tripartitum, patens, persistens: *laciniis* ovatis, æqualibus, duabus magis dehiscentibus.
Cor. nulla.
Stam. *Filamentum* setaceum, calyce longius, intra laciniam intermediam, erectum. *Anthera* didyma.
Pist. *Germen* ovatum, acuminatum. *Styli* duo, erecti, dehiscentes, longitudine staminis. *Stigmata* simplicia.
Per. *Capsula* tenuissima, & crusta fere seminis, ovata, parum compressa.
Sem. unicum, globosum, compressum, magnitudine capsulæ.
Spec. *Capitatum*, (köpfige B.) capitellis spicatis terminalibus, foliis triangularibus dentatis. *Loc.* in Europa, in comit. Tyrol.

Classis II.

DIANDRIA, Mit zwey Staubfäden.

Ordo I.

MONOGYNIA, Mit einem Staubwege.

4. JASMINVM. (Jasmin) Linn. G. 17.

Cal. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, oblongum: *ore* quinquedentato, erecto.
Cor. *Petalum* unicum. *Tubus* cylindraceus, longus. *Limbus* quinquepartitus, planus.
Stam. *Filamenta* duo, brevia. *Antheræ* parvæ, intra tubum corollæ occultæ.
Pist. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* bifidum.
Per. *Bacca* ovalis, glabra, bilocularis seu bicapsularis.
Sem.

Sem. duo, magna, ovato-oblonga, membrana involuta, hinc convexa, inde plana.

Obs. figura *floris acuminata & obtusa variat.* Staminum *numerus & proportio constans est.* Bacca *in aliis simplex, in aliis duplex observatur.*

Spec. 1) *Officinale*, (gewöhnlicher J.) foliis oppositis pinnatis. *Loc.* in India & hortis Europæ. *Flos* albus Jul. *Vis.* Odor florum suavis, aperiens, emolliens, oleum ex iis præparatur.

2) *Fruticans*, (Strauchartiger J.) foliis alternis ternatis, simplicibusque, ramis angulatis. *Loc.* in Europa australi, hortis. *Flos* luteus Jun.

5. LIGVSTRVM, (Hartriegel) Linn. G. 18.

Cal. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, minimum: *ore* quadridentato, erecto, obtuso.

Cor. *Petalum* infundibuliforme. *Tubus* cylindraceus, longior calyce. *Limbus* quadripartitus, patens, *laciniis* ovatis.

Stam. *Filamenta* duo, opposita, simplicia. *Antheræ* erectæ, longitudine fere corollæ.

Pist. *Germen* subrotundum. *Stylus* brevissimus. *Stigma* bifidum, obtusum, crassiusculum.

Per. *Bacca* globosa, glabra, unilocularis.

Sem. quatuor, hinc convexa, inde angulata.

Spec. *Vulgare*, (gemeiner H. Rheinweiden, Beinholz, Wundholz, Klingertenholz) germanicum, *Loc.* Europæ collibus glareosis, arenosis. *Flos* albus Maj. *Baccæ* nigræ Sept. *Usus.* Baccæ vinum nigrescunt, & Chartareis mutant colorem rubrum in purpureum: folia amara adstringunt: flores odorati apibus inserviunt, & tota planta sepibus hortorum, operique topiario.

6. SYRINGA (Flieder, Zyrinken,) Linn. G. 22.

Cal. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, parvum: *ore* quadridentato, erecto.

Cor. *Petalum* unicum. *Tubus* cylindraceus, longissimus. *Limbus* quadripartitus, patenti-revolutus, *laciniis* linearibus, concavis, obtusis.

STAM. *Filamenta* duo, breviſſima. *Antheræ* parvæ, intra tubum corollæ occluſæ.
PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* biſidum, craſſiuſculum.
PER. *Capſula* oblonga, compreſſa, acuminata, bilocularis, bivalvis, valvulis diſſepimento contrariis.
SEM. ſolitaria, oblonga, compreſſa, utrinque acuminata, margine membranaceo cincta.
SPEC. 1) *Vulgaris*, (gemeiner Fl.) foliis ovato cordatis. *Loc.* Perſia & in Europæ hortis, *Flos* cæruleus & albus odoratus Maj.
2) *Perſica* (perſiſcher Fl.) foliis lanceolatis integris. *Loc.* Europæ hortis. *Flos* cæruleus odoratus. Maj.

7. CIRCÆA (Hexenkraut) Linn. G. 24.

CAL. *Perianthium* diphyllum: *foliolis* ovatis, concavis, deflexis, deciduis.
COR. *Petala* duo, turbinato-cordata, calyce fere breviora, patentia, æqualia.
STAM. *Filamenta* duo, capillaria, erecta, longitudine calycis. *Antheræ* ſubrotundæ.
PIST. *Germen* turbinatum, ſub receptaculo. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* obtuſum, emarginatum.
PER. *Capſula* turbinato-ovata, hiſpida, bilocularis, bivalvis, á baſi verſus apicem dehiſcens.
SEM. ſolitaria, oblonga, inferne anguſtiora.
SPEC. *Lutetiana* (Gros H.) caule erecto, racemis pluribus. *Loc.* Europæ nemoribus borealis.

8. VERONICA (Ehrenpreis) Linn. G. 25.

CAL. *Perianthium* quadripartitum, perſiſtens: *laciniis* lanceolatis, acutis.
COR. *Petalum* unicum. *Tubus* longitudine fere calycis. *Limbus* quadripartitus, planus, *Laciniis* ovatis: infima anguſtiore, huic oppoſita latiore.
STAM. *Filamenta* duo, inferne anguſtiora, ſurſum inclinata. *Antheræ* oblongæ.
PIST. *Germen* compreſſum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum, declinatus. *Stigma* ſimplex.
PER. Capſula turbinato-cordata, apice compreſſo, bilocularis, quadrivalvis.

SEM.

Sem. plurima, ſubrotunda.

Obs. Tubus corollæ *in diſtinctis diverſus eſt, in aliis ſcilicet breviſſimus, aliis longus. Lacinia corollæ major in quibusdam* Labium ſuperius *conſtituit, reliquæ tres* Labium inferius: *intermedia anguſtiore.*

Spec. 1) *Spicata*, (ährenförmiger Ehrenpreis) Spica terminali, foliis oppoſitis, crenatis, obtuſis, caule adſcendente ſimpliciſſimo. *Loc.* Europæ montibus, ſepibus, rivulis; *Flores* cærulei Majo, *Uſus.* Apibus.

2) *Officinalis*, (gebräuchlicher E.) ſpicis lateralibus pedunculatis, foliis oppoſitis, caule procumbente. *Loc.* in Europæ ſylveſtribus, ſterilibus *Flos* cærul. Maj. Jun. *Vis.* adſtringens, vulneraria, tonica, balſamica, pectoralis; ſuccedaneum theæ vulgi.

3) *Serpyllifolia*, (E. mit Quendelblätter) racemo terminali ſubſpicato, fol. ovat. glabris crenatis. *Loc.* in viis, agris, ſylvis, pratis, *Flos*, Majo. *Uſus.* Ovibus pab.

4) *Beccabunga* (Bachbungen) racem. lateral. fol. ovatis planis, caule repente. *Loc.* in aquis paludibus, rivulis. *Flos.* Maj. Jun. *Vis* diuretica diſcutiens, ſanguinem purificans, antiſcorbutica, acris: *Uſus.* Pecoribus, exceptis equis.

5) *Anagallis aquatica*, (E. dem Gauchheil gleichend, ſchmalblättrige Bachbungen) racem. lateral. fol. lanceol. ſerratis, caule erecto, *Loc.* in paludoſis & rivulis pratorum. *Flos* Jun.--Sept. *Obſ.* ovibus adverſa.

6) *Teucrium* (Wieſen E. falſcher Gunderman, groſſer Erdbathengel) racem. lateral. longiſſimis, fol. ovat. rugoſ. dentatis obtuſiuſculis, caule erecto. *Loc.* in ſepibus, pratis, montibus. *Flos* Maj. *Vis.* aperiens, adſtringens. *Uſus.* Apibus.

9. GRATIOLA (Gnadenkraut) Linn. G. 29.

Cal. *Perianthium* quinquepartitum, erectum: *laciniis* ſubulatis, perſiſtentibus.

Cor. monopetala, ringens. *Tubus* calyce longior, angulatus. *Limbus* quadripartitus, parvus: *lacinia*

ſuperiori latiori, emarginata, reflexa: *reliquis* rectis, æqualibus.

Stam. *Filamenta* quinque, ſubulata, corolla breviora, quorum tria breviora, ſterilia: *ſuperiora duo* tubo petali adnata, totidem inſtructa *Antheris* ſubrotundis.

Pist. *Germen* conicum. *Stylus* rectus, ſubulatus. *Stigma* bilabiatum, poſt fœcundationem connivens.

Per. *Capſula* ovata, acuminata, bilocularis, bivalvis.

Sem. plurima, parva.

Obs. *Differt itaque à Digitali calyce, corolla, ſtaminibus, ſtigmate, ut & facie. Eſſentia characteris in tribus ſtaminibus caſtratis.*

Spec. *Officinalis* (gewöhnliche G.) floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ſerratis. *Loc.* Europæ humidiuſculis. *Flos.* Jun. Jul. *Vis.* Purgans, vomitoria, emmenagoga, anthelmintica, dyſenteria, hydrocephalo.

10) UTRICVLARIA. (Waſſerſchlauch) Linn. G. 31.

Cal. *Perianthium* diphyllum: *foliolis* ovatis, concavis, minimis, deciduis.

Cor. *Petalum* unicum, ringens. *Labium ſuperius* planum, obtuſum, erectum: L. *inferius* majus, planum, integrum. *Palatum* cordatum, inter labia prominulum. *Nectarium* corniculatum, e baſi petali productum.

Stam. *Filamenta* duo, breviſſima, incurva. *Antheræ* parvæ, cohærentes.

Pist. *Germen* globoſum. *Stylus* filiformis, longitudine calycis. *Stigma* conicum.

Per. *Capſula* globoſa, magna, unilocularis.

Sem. plurima.

Spec. *Vulgaris* (gemeiner W.) nectario conico, ſcopo paucifloro, millefolium aquaticum lenticulatum. *Loc.* Foſſis, paludibus profundioribus. *Flos* albus Jul. Aug. Obſ. Radiculis utriculi aqua impleti adhærent, quibus ſurſum ſe elevat planta tempore coitus, poſt fœcundationem fiunt nigri utriculi, & fragiles uti conchæ, deorſum tum ſe petit planta.

11. VERBENA (Eiſenkraut) Linn. G. 32.

Cal. *Perianthium* monophyllum, angulatum, tubulatum, lineare, quinquedentatum, *denticulo quinto* truncato, perſiſtens.

Cor.

Cor. monopetala. *Tubus* cylindraceus, rectus, longitudine, calycis, mox dilatatus, incurvatus. *Limbus* patens, semiquinquefidus: *laciniis* semiorbiculatis, fere æqualibus.

Stam. *Filamenta* quatuor, setacea, breviſſima, intra tubum corollæ latitantia, quorum *duo* breviora reliquis. *Antheræ* incurvæ, totidem quot filamenta, aut dimidio pauciores.

Pist. *Germen* quadragonum. *Stylus* ſimplex, filiformis, longitudine tubi. *Stigma* obtuſum.

Per. tenuiſſimum, vixque manifeſtum, vel fere nullum. *Calyx* tegens ſemina.

Sem. duo, vel quatuor, oblonga.

Spec. *Officinalis*, (gewöhnliches E. Eiſerich, Stahlkraut,) ſpicis filiformibus, foliis multifido laciniatis, caule ſolitario. *Loc.* Ruderatis, viis, ſepibus. *Flos* ſubcæruleus Jul. Ang. *Vis.* adſtringens, cephalica, vulneraria. *Uſus.* Cucumeres ab addita radice fiunt ſapidiores.

12) LYCOPVS, (Wolfsfus,) Lin. G. 33.

Cal. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, ſemiquinquefidum: *laciniis* anguſtis, acutis.

Cor. *Petalum* unicum. *Tubus* cylindraceus, longitudine calycis. *Limbus* quadrifidus, ſobtuſus, patulus, *Laciniis* fere æqualibus, *ſuperiore* latiore, emarginatâ, *inferiore* minore.

Stam. *Filamenta* duo, corollâ fere longiora, ad cujus laciniam ſuperiorem inclinata. *Antheræ* parvæ.

Pist. *Germen* quadrifidum. *Stylus* filiformis, rectus, longitudine ſtaminum. *Stigma* bifidum, reflexum.

Per. nullum. *Calyx* in fundo ſemina continens.

Sem. quatuor, ſubrotunda.

Spec. *Europæus*, (europäiſcher W. Sparfaden, Sumpfandorn,) foliis ſinuato ſerratis. *Loc.* Ripis humentibus, paludibus. *Flos.* Jun. Jul. *Uſus.* Pecoribus; exſiccatus & coctus cum vitriolo, nigro corpora inficit colore.

13.) MONARDA (Monarde,) Lin. G. 37.

Cal. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, cylindraceum, ſtriatum: *ore* quinquedentato, æquali.

Cor. *Petalum* unicum. *Tubus* cylindraceus, calyce lon-

longior. *Limbus* ringens. *Labium ſuperius* rectum, anguſtum, lineare, integrum: L. *inferius* reflexum, latius, trifidum: *laciniâ mediâ* longiore, anguſtiore, emarginata: lateralibus obtuſis.

STAM. *Filamenta* duo, ſetacea, longitudine labii ſuperioris, à quo involuta. *Antheræ* compreſſæ, ſuperne truncatæ, infernè convexæ, erectæ.

PIST. *Germen* quadrifidum. *Stylus* filiformis, cum ſtaminibus involutus. *Stigma* bifidum, acutum.

PER. nullum. *Calyx* in fundo ſemina continens.

SEM. quatuor, ſubrotunda.

SPEC. *Fiſtuloſa*, (hohlröhrige M.) capitulis terminalibus, caule obtuſangulo: Origanum fiſtuloſum cannadenſe. *Loc.* in Canada & Europæ hortis. *Flos* elegans ruber Jul. Aug. *Vis* reſolvens nervina, tonica.

14) ROSMARINVS, (Rosmarin) Lin. G. 38.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, ſuperne compreſſum: *ore* erecto, bilabiato, *ſuperiore* integro, *inferiore* bifido.

COR. *Petalum* unicum. *Tubus* calyce longior. *Limbus* ringens. *Labium ſuperius* bipartitum, erectum, brevius, acutum marginibus reflexis: *L. inferius* reflexum, trifidum, *laciniâ mediâ* maxima, concava, baſi anguſta; *lateralibus* anguſtis, acutis.

STAM. *Filamenta* duo, ſubulata, verſus labium ſuperius inclinata, eoque longiora. *Antheræ* ſimplices.

PIST. *Germen* quadrifidum. *Stylus* figura, ſitu & longitudine ſtaminum. *Stigma* ſimplex, acutum.

PER. nullum. *Calyx* ſemina in fundo continens.

SEM. quatuor, ovata.

SPEC. *Officinalis*, (gewöhnlicher R.) folio latiore ſpontaneus, hortenſis anguſtiore folio. *Loc.* in collibus Hiſpaniæ, Italiæ, Europæ hortis. *Flos.* Jun. *Vis.* Excitans, nervina, tonica, reſolvens, ſyncope, aſthma, apoplexia, hyſteria, menſibus. Foliis odoratis ſpiritus, aqua, oleum præparatur.

15) SALVIA (Salbey) Lin. G. 39.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, ſtriatum, ſuperne ſenſim ampliatum & compreſſum: *ore* erecto,

erecto, bilabiato, *ſuperiori* tridentato, *inferiori* bidentato.

Cor. *Petalum* unicum. *Tubus* ſuperne ampliatus & compreſſus. *Limbus* ringens. *Labium ſuperius* concavum, compreſſum, incurvum, emarginatum: L. *inferius* latum, trifidum: *laciniâ mediâ* majori, ſubrotunda, emarginata.

Stam. *Filamenta* duo, è medio bifida, ramis obtuſo ſinu remotis, *ramo altero* longiore, ſub labio ſuperiore recondito cui *Anthera* inſidet. *Alteri* vero *ramo* obtuſa appendix.

Pist. *Germen* quadrifidum. *Stylus* filiformis, longiſſimus, ſitu ſtaminum. *Stigma* bifidum.

Per. nullum. *Calyx* leviſſime connivens, in fundo ſemina gerens.

Sem. quatuor, ſubrotunda.

Obs. Filamentorum *bifurcatio ſingularis conſtituit eſſentialem characterem.*

Rudimenta *ſtaminum duorum ſed ſterilium, in fauce corollæ ſub labio ſuperiore ſæpius occurrunt.*

Appendix ſtaminum *obtuſa in aliis calloſa eſt & glandulæ ſimillima; in paucis verò antheræ quaſi rudimentum & parum farinifera.*

Spec. 1) *Officinalis*, (gewöhnliche S.) foliis lanceolato-ovatis integris, crenulatis, floribus ſpicatis, calycibus acutis. *Loc.* Europæ hortis. *Flos* cæruleus Jun. Jul. *Vis.* Adſtringens, tonica, ſtomachica, uterina: fragrans, amara.

2) *pratenſis*, (Wieſen, wilde S. Scharlach, Muſcateller-Kraut,) foliis cordato-oblongis, ſummis amplexicaulibus, verticillis ſubnutis, corollis galea glutinoſis. *Loc.* Pratis. *Flos.* Cæruleus, albus May-Aug. *Vis.* Adſtringens, vulneraria; temulenta cereviſia ſ. vino mixta. *Uſus.* Apibus flores; coriis parandis apta; Pecoribus inviſa.

DIAN-

DIANDRIA

II. DIGYNIA Mit zwey Staubwegen.

16) ANTHOXANTHVM, (Ruchgras, Flavie,) Linn. G. 42.

CAL. *Gluma* uniflora, bivalvis: *Valvulis* ovato-acuminatis, concavis, interiore majore.

COR. *Gluma* uniflora, bivalvis, longitudine valvulæ majoris calycinæ: valvula utraque ariſtam parvam è dorſo inferiore emittente. *Nectarium* diphyllum, tenuiſſimum, cylindricum, foliolis ſubovatis amplexantibus.

STAM. *Filamenta* duo, capillaria, longiſſima. *Antheræ* oblongæ, bifurcatæ utrinque.

PIST. *Germen* oblongum. *Styli* duo, filiformes. *Stigmata* ſimplicia.

PER. *Gluma* corollæ adnaſcitur ſemini.

SEM. unicum, utrinque acuminatum, ſubrotundum.

SPEC. 1) *Odoratum*, (wohlriechendes R.) ſpica ovato oblonga, floſculis ſubpedunculatis, ariſta longioribus, gramen pratenſe, ſpica flaveſcente. Loc. Pratis montanis, agris. *Flos.* May. *Vſus* Pecoribus omnibus, Pulvis tabaci fit ſuavior a commixto Anthoxantho odorato, aromatico.

2) *Paniculatum*, (Riſpenförmiges R.) floribus paniculatis. *Loc.* montoſis, ſylvis. *Flos.* May.

Claſſis III.

TRIANDRIA, Mit drey Staubfäden.

Ordo I.

MONOGYNIA, Mit einem Staubwege.

17) VALERIANA, (Baldrian,) Linn. G. 44.

CAL. vix ullus. *Margo* germen coronans.

COR. *Petalum* unicum. *Tubus* à latere inferiori, hinc gib-

gibbus, mel continens. *Limbus* quinquefidus, *laciniis* obtusis.

TAM. tria vel pauciora, subulata, erecta, longitudine corollæ. *Antheræ* subrotundæ.

IST. *Germen* infra receptaculum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* crassiusculum.

ER. *Capsula* non dehiscens, decidua, coronata.

EM. solitaria, oblonga.

BS. *Mira in hocce genere partium fructificationis inconstantia quoad numerum & figuram in diversis speciebus observatur. E. gr.*

Calycis *margo in quibusdam vix notabilis, in aliis quinquefidus.*

Corollæ tubus *in aliis oblongus, in aliis calcare mellifero instructus, in aliis brevissimus.* Limbus *in aliis æqualis, in aliis bilabiatus, labio superiori bifido.*

Stamina *in aliis tria, in difformibus duo, in aliis unicum; in aliis sexu distincta.*

Pistilli Stigma *in aliis trifidum; in aliis emarginatum; in aliis globosum.*

Per. *in aliis fere nullum; in aliis capsula crassa; in aliis biloculare.*

Sem. *in quibusdam pappo coronata; in aliis capsulâ tecta; figura varia.*

SPEC. 1) *Dioica*, (kleiner Sumpf-B.) floribus triandris, dioicis, foliis pinnatis integerrimis, caulinis. *Loc.* Campis uliginosis; *Flos* May. *Vis* debilior officinali. *Usus* Pecoribus pabulum.

2) *Officinalis*, (gewöhnlicher grosser B. Kazen-Augenwurzel, Theriacs-Kraut,) flor. triandr. fol. omnibus pinnatis. *Loc.* Nemoribus, paludosis, silvis, montibus. *Flos*, May. Jun. *Vis* narcotica, antispasmodica, sudorifea, diuretica, purgans aromatica, nervina oculorum vitiis, epilepsia, hysteria, hæmoptysi. Vermibus. *Usus.* Ovibus; felium amasia radix.

3) *Phu*, (grosser Garten B.) flor. triandr. fol. caulinis pinnatis, radicalibus indivisis. *Loc.* Rivulis pratorum. *Flos.* Jun. *Vis* cum officinali eadem.

4) *Locusta* olitoria, (Ackersalat, Lämmer-

Salat-

Salat-Lattich, Nüsleinsalat, Rapünzchen, Feldkrap, Sonnenwürbel,) flor. triandr. caul. dichotomo, fol. linearibus. *Loc.* Agris, *Flos* Mart. May. *Vis* refrigerans, involvens, antinephritica, rhevmatismo, scorbuto, podagra, arthritide. *Usus.* Ovibus; culinaris ad adcetaria.

18) CROCVS, (Safran) Linn. G. 55.

CAL. *Spatha* monophylla.
COR. Tubus simplex. *Limbus* sexpartitus, erectus: laciniis ovato-oblongis, æqualibus.
STAM. *Filamenta* tria, subulata, corollâ breviora. *Antheræ* sagittatæ.
PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* tria, convoluta, serrata.
PER. *Capsula* subrotunda, triloba, trilocularis, trivalvis.
SEM. plura, rotunda.

SPEC. *sativus*, (zahmer S.) Spatha univalvi radicali, corollæ tubo longissimo.

α) *officinalis* autumnalis, (officineller Herbst S.) foliis angustis, margine replicatis; *Loc.* Agris Austriæ. *Flos* Oct. *Vis.* anodyna, resolvens, uterina, pellens; suaveolens, aromatica. *Usus* ob stigmata luteo tinctorius, & culinaris.

β) *vernus*, (Frühlings S.) foliis latis, margine expansis. *Loc.* Agris austriæ, alpibus helveticis. *Flos.* Apr. *Usus* tinctorius & culinaris.

19) IRIS, (Schwertel, Schwerdlilie,) Linn. G. 59.

CAL. nullus. *Spathæ* bivalves, flores distinguentes, persistentes.
COR sexpartita. *Petala* oblonga, obtusa, tria exteriora reflexa, tria anteriora erecta & acutiora, omnia unguibus connata.
STAM. *Filamenta* tria, subulata, petalis reflexis incumbentia. *Antheræ* oblongæ, rectæ, depressæ.
PIST. *Germen* oblongum, infra receptaculum. *Stylus* simplex, brevissimus. *Stigma* maximum, tripartitum, *laciniis* petala mentientibus, latis; reflexis, sta-

ſtamina & petala alterna deprimentibus, apicibus bifidis.

ER. *Capſula* oblonga, angulata, trilocularis, trivalvis.

EM. plura, magna.

BS. Nectarium *in quibuſdam eſt* linea *longitudinalis villoſa, baſi petalorum reflexorum inſculpta; in aliis verò* puncta *tria mellifera externe ad baſin floris.* Capſula *in aliis trigona, in aliis hexagona, obſervatur.*

SPEC. 1) *Germanica* vulgaris, noſtras, Gladiolus cœruleus, (gemeine Veilwurz, blauer S. Lilienwurzel) corollis barbatis, caule foliis longiore multifloro, floribus inferioribus pedunculatis. *Loc.* in rivis paludibus, vineis, hortis. *Flos.* May. *Vis.* Radix acris, urens, purgans, ſiccata diſcutiens, diuretica, pellens. *Uſus.* Pictoribus, ſuccus florum cæruleorum, & ſuccus corollæ cum alumine viride exhibet atramentum.

2) *Pſeud-acorus*, (Waſſer S. gelbe Waſſerilgen, Teichlilie, rother Calmus.) Cor. imberbibus, petalis interioribus ſtigmate minoribus, foliis enſiformibus. *Loc.* ad ripas paludum foſſarum, *Flos.* May. Jun. *Vis.* Adſtringens, purgans ſuccus radicis. *Uſus.* Succus radicis ruber, coriis tingendis aptus; folia pecoribus ſtramen, capris pabulum, reliquis animalibus venenoſa planta.

20) SCHOENUS, (Strikgras) Linn. G. 65.

AL. *Gluma* communis, multiflora, bivalvis, magna, erecta, attenuata, perſiſtens.

OR. propria *petalis* ſex, lanceolatis, acutis, conniventibus, perſiſtentibus, ſitu inæqualibus, fereque imbricatis: exterioribus brevioribus.

TAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* oblongæ, erectæ.

IST. *Germen* ovato-triquetrum, obtuſum. *Stylus* ſetaceus, longitudine corollæ. *Stigma* trifidum, tenue.

ER. nullum. *Corolla* laxe connivens, demittens maturum ſemen.

Sem. unicum, ſubovatum, ſuperne craſſius, obſolete trigonum, nitidum.

Obs. *Datur ſpecies, in qua ſetæ aliquot minimæ è receptaculo proprio enatæ ſemen cingunt.*

Spec. *Mariſcus*, (teutſcher Galgant) culmo tereti, foliis margine dorſoque aculeatis. *Loc.* In paludibus Europæ. *Flos.* Aug. *Uſus.* Paludes profundas & ceſpitoſas reddit foecundas; foliis in Gotlandia domus teguntur, radices turfas generant.

21) SCIRPUS, (Semſen) Linn. G. 67.

Cal. *Spica* imbricata: *ſquamis* ovatis, plano-inflexis, flores diſtinguentibus. Cor. nulla.

Stam. *Filamenta* tria, tandem longiora. *Antheræ* oblongæ.

Pist. *Germen* minimum. *Stylus* filiformis, longus. *Stigmata* tria, capillaria.

Per. nullum.

Sem. unicum, triquetrum, acuminatum, villis calyce brevioribus inſtructum.

Obs. Villi *ſeminis ad apicem, ſæpe ad baſin ſemini annectuntur.*

Spec. 1) *Paluſtris*, (Sumpf S. Binſengras,) culmo tereti nudo, ſpica ſubovata terminali. *Loc.* Inundatis, foſſis, paludibus. *Flos.* Jul. *Uſus.* Luxuriante reptatu ſilvas ſteriles foecundas ſæpe reddit.

2) *Ceſpitoſus*, (Torf S.) culmo ſtriato nudo, ſpica bivalvi terminali longitudine calycis, radicibus ſquamula interſtinctis. *Loc.* In paludibus ceſpitoſis ſylvaticis. *Uſus.* Radices turfas generant; & maritimos locos foecundant.

3) *Lacuſtris*, (See S Seebinſengras.) culmo tereti nudo, ſpicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus. *Loc.* In paludibus. *Flos.* Jul. *Uſus.* Lacuum & fluviorum ripis fertilitatem adfert, in Suecia bobus & equis pabulum, tuguriis tegendis, & clitellis infarciendis aptiſſimus.

22) ERI-

22) ERIOPHORUM, (Wolgras) Linn. G. 68.

CAL. *Spica* imbricata; *ſquamis* ovato-oblongis, plano-inflexis, membranaceis, laxis, acuminatis, flores diſtinguentibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* erectæ, oblongæ.

PIST. *Germen* minimum. *Stylus* filiformis, longitudine ſquamæ calycis. *Stigmata* tria, ſtylo longiora, reflexa.

PER. nullum.

SEM. triquetrum, acuminatum, villis ſpica longioribus inſtructum.

SPEC. 1) *Polyſtachyon*, gram. prat. tomentoſum panicula ſparſa, (vielähriges Woll-Flachs-Gras, Quispel-Feder-Seiden-Flockenbinſe, Binſen-Wieſen Watte, Wieſen-Flachs-Wolle, wilde Baumwolle, Judenfeder.) Culmis teretibus, foliis planis, ſpicis pedunculatis. *Loc.* Uliginoſis turfoſis. *Flos.* May. Jun. *Uſus.* Lana ſpica ſeſſilis longa, tenera, nivea in Suecia chirotecis, pauperum pulvinaribus, culcitris implendis, ellychniis, chartis, pileis inſervit, & pannis lana animali aut ſerico miſta.

2) *Alpinum* (Alpen W.) culmis nudis triquetris, ſpica pappo breviore. *Loc.* In Alpibus, locisque affinibus. *Uſus.* Lana brevior ad combuſtiones anodynum.

Claſſis III.

TRIANDRIA. *Ordo II.* DIGYNIA.

23) PHALARIS, (Glanzgras,) Linn. G. 74.

CAL. *Gluma* uniflora, bivalvis, maxima, compreſſa, obtuſa: *valvulis* navicularibus, compreſſis, carinatis, ſuperne obtuſioribus, marginibus rectis, parallele conniventibus.

COR. bivalvis, calyce minor: *Valvulâ exteriore* oblonga, acuminata, convoluta; *interiore* minore.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, calyce breviora. *Antheræ* oblongæ.

PIST. *Germen* ſubrotundum. *Styli* duo, capillares. *Stigmata* villoſa.
PER. *Corolla* circumnaſcitur ſemini cruſtæ inſtar, nec dehiſcit.
SEM. unicum, tectum, glabrum, è rotundo utrinque acuminatum.

SPEC. 1) *Canarienſis*, (Canarien-Gras) panicula ſubovata ſpiciformi, glumis carinatis. *Loc.* Inſulis Canar. & hortis Europæ. *Flos.* Jun. *Uſus.* Pabulum avibus canariæ; & e farina panis nutriens confici poteſt.

2) *Arundinacea*, (ſchilfiches Glgr. Rohrſtrausgras,) panicula oblonga ventricoſa. *Loc.* ſubhumidis ad ripas lacuum. *Flos.* May.

24) PANICUM, (Schroden,) Linn. G. 76.

CAL. *Gluma* uniflora, trivalvis: *Valvulis* ſubovatis: ovato-acuminatis, tertia minima à tergo alterius poſita.
COR. bivalvis: *Valvulæ* ſubovatæ, altera minor planior.
STAM. *Filamenta* tria, capillaria, brevia. *Antheræ* oblongæ.
PIST. *Germen* ſubrotundum. *Styli* duo, capillares. *Stigmata* plumoſa.
PER. *Corolla* adnaſcitur ſemini, nec dihiſcit.
SEM. unicum, tectum, ſubrotundum, inde planiuſculum.
OBS. *Ariſtæ terminant in quibuſdam corollæ valvulam planiorem.*

Species datur involucro deſtitutas.

SPEC. 1) *Verticillatum*, (quirlförmiger S.) ſpica verticillata, racemulis quaternis, involucellis unifloris biſetis, culmis diffuſis. *Loc.* Viis ordinar. *Flos.* Jul.

2) *Crusgalli*, (Hahnenfus) ſpicis alternis conjugatisque, ſpiculis ſubdiviſis, glumis ariſtatis hiſpidis, rachi quinquangulari. *Loc.*, cultis, foſſis pratorum. *Flos.* Jul.

25) PHLEUM, (Liſchgras) Linn. G. 77.

CAL. *Gluma* uniflora, bivalvis, oblonga, linearis, compreſſa, apice bicuſpide dehiſcens: *valvulis* rectis, concavis, compreſſis, amplexantibus, æqualibus, truncatis, carinæ apice mucronatis.
COR. bivalvis, calyce brevior: *Valvulâ exteriore* amplexante *interiorem* minorem.

STAM.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, calyce longiora. *Antheræ* oblongæ, bifurcatæ.
PIST. *Germen* ſubrotundum. *Styli* duo, capillares, reflexi. *Stigmata* plumoſa.
PER. nullum. *Calyx & corolla* includentia ſemen.
SEM unicum, ſubrotundum.
SPEC. *Pratenſe*, (Wieſen L. Kolbengras, langer Fuchſchwanz, weiſſer Fänch, Wieſenfönnich.) Spica cylindrica longiſſima culmo recto. *Loc.* In verſuris & pratis. *Flos.* Jul. *Uſus.* Equis & porcis pabulum; bobus & capris adverſum.

26) ALOPECURUS (Fuchſchwanz) Linn. G. 78.

CAL. *Gluma* uniflora, bivalvis: *Valvulis* ovato-lanceolatis, concavis, compreſſis, æqualibus.
COR. univalvis: *Valvula* concava, longitudine calycis. *Ariſta* longa, dorſo valvulæ propè baſin inſerta.
STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* utrinque bifurcæ.
PIST. *Germen* ſubrotundum. *Styli* duo, cirroſi, reflexi, calyce longiores. *Stigmata* ſimplicia.
PER. *Corolla* includit ſemen.
SEM. unicum, ſubrotundum, tectum.
SPEC. 1) *Pratenſis*, (Wieſen F.) culmo ſpicato erecto, glumis villoſis. *Loc.* Pratis ſubſiccis. *Flos.* May. Jun. *Uſus.* Pecoribus pabulum.
2) *Geniculatus*, (kriechender Waſſer F. Spies-Flut-Flokgras, kleines weiſſes.) culmo ſpicato infracto. *Loc.* Uliginoſis. *Obſ.* Ovibus noxium ob locum natalem.

27) MILIUM, (Hirſchengras) Linn. G. 79.

CAL. *Gluma* uniflora, bivalvis: *Valvulis* ovatis, acuminatis.
COR. bivalvis, calyce minor: *Valvulæ* ovatæ, altera earum minore.
STAM. *Filamenta* tria, capillaria, breviſſima. *Antheræ* oblongæ.
PIST. *Germen* ſubrotundum. *Styli* duo, capillares. *Stigmata* penicilliformia.
PER. *Corolla* adnaſcitur ſemini, nec dehiſcit.

Sem. unicum, tectum, ſubrotundum, glaberrimum.
Obs. Milium *calyce bivalvi* à Panico *calyce trivalvi differt.*
Spec. Effuſum, (zerſtreutes Hirſengr. Waldhirſe, Fladergr.) floribus paniculatis diſperſis muticis. *Loc.* Nemoribus umbroſis. *Flos.* May. Jun. *Uſus.* Ovibus; & culmi ſtraminis loco: ſuaveolens pellit inſecta & tineas.

28) AGROSTIS, (Strausgras,) Linn. G. 80.

Cal. *Gluma* uniflora, bivalvis, acuminata.
Cor. bivalvis, acuminata, vix longitudine calycis, altera major ariſtata.
Stam. *Filamenta* tria, capillaria, corollâ longiora. *Antheræ* furcatæ.
Pist. *Germen* ſubrotundum. *Styli* duo, reflexi, villoſi. *Stigmata* conſimilia.
Per. *Corolla* adnaſcitur ſemini, nec dehiſcit.
Sem. unicum, ſubrotundum, utrinque acuminatum.
Spec. 1) *Spica venti*, (Acker-Strausgr. Riedgr, groſe Ackerſchmielen, Windhalm,) petalo exteriore exſerente ariſtam rectam ſtrictam longiſſimam. *Loc.* Intra ſegetes, ad agros. *Flos.* Jun. *Uſus.* Spicularum extremarum ſuccus viridis tinctorius. Culmus ſtraminis loco ſiccatus.
2) *Capillaris*, (Haarförmiges St.) panicula capillari patente, calycibus ſubulatis æqualibus hiſpidiuſculis coloratis, floſculis muticis, *Loc.* Pratis. *Flos.* May. *Uſus.* Vaccis pecoribus pabulum.

29) AIRA, (Schmelen) Linn. G. 81.

Cal. *Gluma* biflora. bivalvis: *Valvulis* ovato-lanceolatis, acutis, æqualibus.
Cor. bivalvis: *Valvulæ* calyci ſimillimæ:
Stam. *Filamenta* tria, capillaria, longitudine floris. *Antheræ* oblongæ, utrinque furcatæ.
Pist. *Germen* ovatum. *Styli* duo, ſetacei, patentes. *Stigmata* pubeſcentia.
Per. nullum. *Corolla* includens ſemen adnaſcitur.
Sem. ſubovatum, tectum.
Spec. 1) *Cærulea* (blaue S. Schmielen, Blandſchmielen) foliis planis, panicula coarctata, floribus pedunculatis muticis convoluto ſubulatis. *Loc.* Paſcuis

Paſcuis aquoſis, montibus, arvis. *Flos.* Jun. Jul. *Uſus.* Culmus ſtraminis loco.

2) *Aquatica*, (Waſſer S. Milenz, Qwellgras, ſüs Waſſer-Gras-Hirſe) foliis planis, panicula patente, floribus muticis lævibus calyce longioribus. *Loc.* aquoſis, foſſis. *Flos.* May. *Uſus.* Pecoribus.

3) *Ceſpitoſa* (Raſen S.) foliis planis, panicula patente, petalis baſi villoſis ariſtatisque: ariſta recta brevi. *Loc.* In pratis. *Flos.* Jun. *Uſus.* Pecoribus.

4) *Caryophyllea*, (Nägeleins S. Gras,) fol. ſetaceis, panicula divaricata, flor. ariſtatis diſtantibus. *Loc.* glareoſis, & ad ceſpites arborum. *Uſus.* Suaveolens pellit tineas.

30) MELICA, (Perlgras) Linn. G. 82.

CAL. *Gluma* biflora, bivalvis: *Valvulis* ovatis, concavis, fere æqualibus.

COR. bivalvis: *Valvulæ* ovatæ, muticæ: alterâ concava: alterâ vero plana. Corpuſculum inter floſculos.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, longitudine floris. *Antheræ* oblongæ, utrique bifurcatæ.

PIST. *Germen* ovato-turbinatum. *Styli* duo, ſetacei, patentes. *Stigmata* oblonga villoſa.

PER. nullum. *Corolla* includit ſemen, demittit.

SEM. unicum, ovatum.

OBS. *Corpuſculum pedunculatum intra floſculos (floris rudimentum) charakterem eſſentialem præbet: hoc conſtat duobus rudimentis floſculis truncatis, alternis: glumis convolutis, pellucidis.*

SPEC. *Nutans*, (überhangendes glattes P.) petalis imberbibus, panicula nutante ſimplici. *Loc.* Pratis, ſepibus ſilvis. *Flos.* May. Jun. *Uſus.* Pecoribus & feris pabulum.

31) POA, (Riſpengras) Linn. G. 83.

CAL. *Gluma* multiflora, bivalvis, mutica, flores in ſpicam diſticham ovato-oblongam colligens: *Valvulis* ovato-acuminatis.

COR. bivalvis: *Valvulæ* ovato-acuminatæ, concavæ, compreſſæ; calyce paulo longiores, margine ſubſcarioſo.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* bifurcatæ.
PIST. *Germen* ſubrotundum. *Styli* duo, reflexi, villoſi. *Stigmata* conſimilia.
PER. *Corolla* adnaſcitur ſemini, nec dehiſcit.
SEM. unicum, oblongum, acuminatum utrinque, compreſſum, tectum.

SPEC. 1) *Aquatica*, (Waſſer R. Viehgras, Miliz) panicula diffuſa, ſpiculis ſexfloris linearibus. *Loc.* Ad ripas piſcinarum, fluviorum. *Uſus.* Pecoribus, ovibus præcipue pabulum.

2) *Anguſtifolia*, (ſchmalblätriges R. Viehgras,) panic. diff. ſpic. quadrifloris pubeſcentibus, culmo erecto tereti. *Loc.* Ad agrorum verſuras, ad vias. *Flos.* May. *Uſus.* Pecoribus, bobus, capris, ovibus, equis, ſuibus pabulum.

3) *Pratenſis*, (Wieſen R. gemeines groſes Viehgras,) panic. diff. ſpic. quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. *Loc.* Pratis fertiliſſimis. *Flos.* May. Jun. *Uſus.* Pecoribus pabulum.

4) *Compreſſa*, (zuſamengedruktes R.) panic. ſecunda coarctata, culmo obliquo compreſſo. *Loc.* ſiccis, muris, tectis, ſterilibus montoſis, pratis montanis. *Flos.* May - Aug. *Uſus.* Pecoribus pabulum.

32) BRIZA, (Zittergras,) Linn. G. 84.

CAL. *Gluma* multiflora, bivalvis, patens, flores in ſpicam cordatam diſticham colligens: *valvulis* cordatis, concavis, æqualibus obtuſis.
COR. bivalvis: *Valvula inferior* magnitudine & figura calycis; *ſuperior* minima, plana, ſubrotunda, ventrem alterius claudens.
STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* oblongæ.
PIST. *Germen* ſubrotundum. *Styli* duo, capillares, recurvi. *Stigmata* plumoſa.
PER. *Corolla* immutata continet ſemen, dehiſcit, demittit.
SEM. unicum, ſubrotundum, compreſſum, minimum.

SPEC. *Media*, (mitleres Zitter-Flittergras, Haſenbrod) ſpiculis ovatis, calyce floſculis breviore. *Loc.* Pratis ſiccioribus, ſilvis. *Flos.* Apr. May.

33) DA-

33) DACTYLIS, (Hundsgras) Linn. G. 86.

CAL. *Glumæ* compreſſæ ſecundæ, carinatæ, acutæ: valvula altera floſculo longiore, altera eodem breviore.

COR. *Glumæ* compreſſa, oblonga, acuta: *Valvula* altera intra calycis maiorem longiore, carinata.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, longitudine corollæ. *Antheræ* bifurcæ.

PIST. *Germen* turbinatum. *Styli* duo, capillares, patentes. *Stigmata* plumoſa, ſimplicia.

PER. nullum. *Corolla* ſemen includens, demittens.

SEM. ſolitarium, ſubrotundum, hinc depreſſum, inde convexum, nudum.

OBS. *Species aliæ calyce unifloro, aliæ bifloro ſunt.*

SPEC. *Glomerata* (büſchelweiſe vertheiltes H. Knaulgras.) panicula ſecunda glomerata. *Loc.* cultis ruderatis, pratis paludoſis. *Flos.* May. Jun. *Uſus.* Equis gratum, pecoribus reliquis adverſum, canibus vomitorium.

34) CYNOSURUS, (Kammgras.) Linn. G. 87.

CAL. *Involucrum* partiale, laterale, ſæpe triphyllum, magnum:
Gluma multiflora, bivalvis: *valvulis* linearibus, acuminatis, æqualibus.

COR bivalvis: *exterior* concava, longior, *interior* plana, mutica.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* oblongæ.

PIST. *Germen* turbinatum. *Styli* duo, villoſi, reflexi. *Stigmata* ſimplicia.

PER. nullum. *Corolla* arcte obvolvens ſemen, nec dehiſcens.

SEM. unicum, oblongum, utrinque acuminatum.

OBS. Involucra in plurimis ſunt pinnatifida ſ. pectiniformia.

SPEC. *Criſtatus*, (ſteifes K.) bracteis pinnatifidis. *Loc.* Pratis. *Flos.* Jun. *Uſus.* Arietibus faginatio, & ovibus pabulum.

35) FESTUCA (Schwingel.) Linn. G. 88.

CAL. *Gluma* multiflora, bivalvis, erecta, flores in ſpicam tenuem continens: *valvulis* ſubulatis acuminatis, inferiore minore.

Cor. bivalvis: *Valvula inferior* major, figurâ calycis, magnitudine calycem ſuperans, teretiuſcula, acuminata in mucronem rectum deſinens.

Stam. *Filam.* tria, capillaria, corollâ breviora. *Anth.* oblongæ.

Pist. *Germ.* turbinat. *Styli* duo breves, reflexi. *Stigmata* ſimplicia.

Per. *Corolla* arctiſſime clauſa adnaſcitur, nec dehiſcit.

Sem. unicum tenui-oblongum, utrinque acutiſſimum, longitudinaliter ſulco notatum.

Spec. 1) *Ovina* (Schaf-S. Gras, kleiner Bocksbart,) panicula ſecunda coarctata ariſtata, culmo tetragono nudiuſculo, foliis ſetaceis. *Loc.* Collibus, montoſis, apricis, aridis pratis. *Flos.* May-Sept. *Uſus.* Ovibus pabulum uti et bobus, capris, equis.

2) *Rubra*, (rother Schwingel, Hartſchwingel, rot. Bocksbart,) panic. ſec. ſcabra, ſpiculis ſexfloris ariſtatis, floſculo ultimo mutico, culmo ſemitereti. *Loc.* Sterilibus ſiccis. montoſis. *Fl.* May. *Uſus.* Ovibus, capris, equis pab.

3) *Fluitans*, (Mannaſchw. Brandenburgiſch Manna-Entengras, gem. wilder Schwaden,) panicula ramoſa erecta, ſpiculis ſubſeſſilibus teretibus muticis. *Loc.* Foſſis, paludibus. *Fl.* May.-Iul. *Uſ.* Pecoribus, equis & porcis inprimis pab. Semina flava nutrientia, ad cerealia referuntur.

36) BROMUS (Treſpe,) Linn. G. 89.

Cal. *Gluma* multiflora, bivalvis, patens, flores in ſpicam ovato-oblongam colligens; *valvulis* ovato-oblongis, acuminatis, muticis, inferiore minore.

Cor. bivalvis: *Valvula inferior* major, magnitudine & figura calycis, concava, obtuſa, *ariſtam* infra apicem rectam emittens, *V. ſuperior* lanceolata, parva, mutica.

Stam. *Filamenta* tria, capillaria, corollâ breviora. *Antheræ* oblongæ.

Pist. *Germen* turbinatum. *Styli* duo, breves, reflexi, villoſi. *Stigmata* ſimplicia.

Per. *Corolla* arctiſſime clauſa, adnata, nec dehiſcens.

Sem. 1. oblong. tectum, hinc convexum, inde ſulcatum.

Spec. 1) *Secalinus* (Roggen T.) panic. patente, ſpiculis ovat. ariſtis rectis. *Loc.* Agris ſecalinis

are-

arenoſis. *Flos.* Jun. *Uſus.* Ovibus pab. Viridi tinctorius: augmentum frumenti pauperibus.

2) *Tectorum* (Dach-Berg-Sand-Taube T.) panic. nutante, ſpiculis linear. *Loc.* Collibus ſiccis, tectis, terreſtribus. *Fl.* Maj. *Uſ.* Ovibus.

3) *Pinnatus* (gefiederte T.) ſpic. alternis, ſubſeſſilibus teretibus, culmo indiviſo. *Loc.* Sylvis montoſis aſperis, agris. *Fl.* Jun. *Uſ.* Ovibus pab.

37) AVENA (Haber) Linn. G. 91.

CAL. *Gluma* multiflora, bivalvis, flores laxe colligens: *valvulis* lanceolatis, acutis, ventricoſis, laxis, magnis, muticis.

COR. bivalvis: *Valvula inferior* calyce durior, calycis magnitudine, teretiuſcula, ventricoſa, utrinque acuminata, é dorſo. *Ariſtam* ſpiraliter intortam, geniculo veluti reflexam emittens.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* oblongæ, bifurcatæ.

PIST. *Germen* obtuſum. *Styli* duo, reflexi, piloſi. *Stigmata* ſimplicia.

PER. *Corolla* arctiſſime clauſa adnaſcitur, nec dehiſcit.

SEM. unicum, tenui-oblongum, utrinque acuminatiſſimum, ſulco longitudinali notatum.

OBS. Ariſta *è dorſo corollæ articulata, intorta, conſtituit, eſſentialem characterem.*

SPEC. 1) *Elatior*, (Wieſenhafer, franzöſiſch Raygras,) paniculata, calycibus bifloris, floſculo hermaphrodito mutico, maſculo ariſtato. *Loc.* Apricis, ad rivos, in pratis, *Flos.* Maj.--Jul. *Uſ.* Pecoribus pab. arietibus ſaginatio; farina nutriens.

2) *Fatua*, (Wind-Flug-Bruch-Bart-Gauch-Taub-Mäuſe H. Riffen, Riſpen,) panic. calyc. trifloris, floſculis omnibus baſi piloſis ariſtis totis lævibus. *Loc.* agris intra ſegetes. *Fl.* Jun. *Uſ.* Pecoribus pab. agris cæterum infeſta planta.

3) *Flaveſcens*, (Gold-H.) panic. laxa, calycibus trifloris brevibus, floſculis omnibus ariſtat. *Loc.* Agris *Fl.* Jul. *Uſ.* Pecoribus pab.

4) *Pratenſis* (Wieſen-H.) ſpicata, calycibus quinquefloris. *Loc.* Paſcuis ſiccis apricis. *Fl.* Jun. *Uſ.* Bobus, capris, ovibus, equis pab.

38)

38) ARVNDO (Rohr, Schilf) Linn. G. 93.

CAL. *Gluma* uni- vel multi-flora, bivalvis, erecta: *Valvulis* oblongis, acuminatis, muticis; altera breviore.

COR. bivalvis: *Valvulæ* longitudine calycis, oblongæ, acuminatæ, è quarum basi lanugo longitudine fere floris assurgit.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* utrinque bifurcatæ.

PIST. *Germen* oblongum. *Styli* duo, capillares, reflexi, villosi. *Stigmata* simplicia.

PER. *Corolla* adnascitur semini, nec dehiscit.

SEM. unicum, oblongum, utrinque acuminatum, basi pappo longo instructum.

SPEC. *Phragmitis* (gemeines R. S.) calycibus quinquefloris, panicula laxa. *Loc.* Lacubus, fluviis. *Fl.* Aug. *Us.* Fœni succedaneum, storeisque hortorum, & stramini apta, tectis utilis & gypsariis pro basi: panicula viridi tingit colore.

39) LOLIVM (Lolch,) Linn. G. 95.

CAL. *Receptaculum* commune elongatum in spicam, flores distiche spicatos angulo culmi apprimens. *Gluma* univalvis, rachi oppositа, subulata, persistens.

COR. bivalvis: *Valvula inferior* angusto-lanceolata, convoluta, acuminata, longitudine calycis; *V. superior* brevior, linearis, obtusior, sursum concava.

STAM. *Filamenta* tria capillaria, corolla breviora. *Antheræ* oblongæ.

PIST. *Germen* turbinatum. *Styli* duo, capillares, reflexi. *Stigmata* plumosa.

PER. nullum. *Corolla* fovet semen, dehiscit, demittit.

SEM. unicum, oblongum, hinc convexum, inde sulcato-planum, compressum.

OBS. *Spicæ sessiles in eodem plano cum culmo ponuntur, unde caulis vicem valvulæ alterius calycis (deficientis & oppositæ) gerit.*

SPEC. 1) *Perenne*, (süsser Winter-Lolch, englisch Raygras,) spica mutica, spiculis compressis, multifloris. *Loc.* Ad agrorum versuras, solo fertili, in pratis. *Fl.* Jun.--Sept. *Us.* Bobus, Capris, equis pab. ad cespites densos.

2) *Temulentum* (Sommer-Lolch, Schwindel-Haber,

ber, Töberich, Tolkranz) ſpica & ſpiculis compreſſis ariſtatis. *Loc.* In agris inter Hordeum & Linum. *Fl.* Aug. *Uſ.* Ovibus pab. cæterum cæcitatem & fere temulentiam inducit.

40) SECALE (Roggen) Linn. G. 97.

CAL. *Receptaculum* commune elongatum in ſpicam. *Gluma* biflora, diphylla: *foliolis* oppoſitis, diſtantibus, erectis, linearibus, acuminatis, corolla minoribus. Floſculi ſeſſiles.

COR. bivalvis: *Valvula exterior* rigidior, ventricoſa, acuminata, compreſſa, carina ciliata, definens in Ariſtam longam: *V. interior* plana, lanceolata.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, extra florem pendula. *Antheræ* oblongæ, furcatæ.

PIST. *Germen* turbinatum. *Styli* duo, reflexi, villoſi. *Stigma* ſimplex.

PER. nullum. *Corolla* fovet ſemen, dehiſcit, demittit.

SEM. unicum, oblongum, fere cylindraceum, nudum, hinc acuminatum.

OBS. Flos tertius *pedunculatus ſæpe inter duos majores, ſeſſiles.*

SPEC. *Cereale*, hybernum & vernum, (Sommer- Winter-R.) glumarum ciliis ſcabris. *Loc.* in agris. *Fl.* Jun. *Vis* Nutriens feminis, cereale, panis ex eo præparatur, externe emolliens, diſcutiens abſtergens farina ejus, ſemina ſpiritum exhibent volatilem & toſta ſuccedaneum potus coffee. *Uſ.* Culinaris: bobus, vaccis pabulum.

41) HORDEVM (Gerſte) Linn. G. 98.

CAL. *Receptac.* commune elongatum in ſpicam. *Gluma* triflora, hexaphylla, floribus ſeſſilibus, foliolis diſtantibus, per paria digeſtis, linearibus, acuminatis.

COR. bivalvis: *Valvula inferior* ventricoſa, angulata, ovato-acuminata, calyce longior, definens in Ariſtam longiſſimam: *V. interior* lanceolata, plana, minor.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, corolla brèviora. *Antheræ* oblongæ.

PIST. *Germen* ovato-turbinatum. *Styli* duo, villoſi, reflexi. *Stigmata* ſimilia.

PER. *Corolla* circumnaſcitur ſemini, nec dehiſcit.

SEM. oblongum, ventricoſum, angulatum, utrinque acuminatum, inde ſulco longitudinali notatum.

OBS.

Obs. *In quibusdam omnes tres flores, involucro contenti,* hermaphroditi *sunt fertiles; in aliis* 3, 4, 6, 7, *flores laterales* mares *sunt, intermedius autem solus fertilis hermaphroditus.*

Spec. 1) *Vulgare* (gemeine G.) floſculis omnibus hermaphroditis ariſtatis, ordinibus duobus erectioribus. *Loc.* Agris. *Fl.* Jun. *Vis.* Semen farinoſum nutriens, emolliens, reſolvens, refrigerans. *Uſ.* culinaris, ad cereviſiam, ſuccedaneum potus coffee, panis in annona, gallinis pab.

2) *Murinum* (taube-Mäuſe G. Kazenkorn, Löthen-Gras) floſculis lateralibus maſculis ariſtatis, involucris intermediis ciliatis. *Loc.* ruderatis, ad muros. *Fl.* Maj. Jun.

42) TRITICVM (Weizen) Linn. G. 99.

Cal. *Recept.* commune elongatum in ſpicam. *Gluma* bivalvis, ſubmultiflora, *valvulis* ovatis, obtuſiuſculis, concavis.

Cor. bivalvis, fere æqualis, magnitudine calycis: *Valvula exterior* ventricoſa, obtuſa, cum acumine: *V. interior* plana.

Stam. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* oblongæ, bifurcatæ.

Pist. *Germen* turbinatum. *Styli* duo, capillares, reflexi. *Stigmata* plumoſa.

Per. nullum. *Corolla* fovet ſemen, dehiſcit, demittit.

Sem. unicum, ovato-oblongum, utrinque obtuſum, hinc convexum, inde ſulcatum.

Obs. *Corollæ valvula exterior in aliis ariſtata, in aliis mutica. Floſculus intermedius ſæpe maſculus eſt.*

Spec. 1) *Hybernum*, (Winter-W.) calycibus quadrifloris ventricoſis lævibus imbricatis ſubmuticis, ariſtis carens. *Vis.* Seminis farinoſi mucilaginoſa: nutriens, cereale, in annona.

2) *Repens*, (Graswurzel, Hundsgras, Quecken) calycibus ſubulatis, quadrifloris acuminatis. *Loc.* Cultis. *Fl.* Jun. *Vis* Nutriens, mundificans, diuretica, ſaponacea, ad vermes, aperiens, refrigerans. *Uſ.* In annona loco panis radices & porcis pab. herba pecor. pab. ſtraminis loco, & canibus vomitorium.

Claſſis

Classis IV.

TETRANDRIA (Mit vier Staubfäden.)

Ord. I. MONOGYNIA (Mit 1. Staubwege.)

43) GLOBULARIA, (Kugelblume) Linn. G. 172.

CAL. *Perianthium commune* imbricatum, squamis longitudine disci, æqualibus.
Perianth. proprium monophyllum, tubulatum, quinquefidum, acutum persistens.
COR. *universalis* fere æqualis.
Prop. monopetala, basi tubulata, *Limb.* 5. partitus. *Labio* superiore angustissimo, bipartito, breviore; labio inferiore laciniis 3. maioribus, æqualibus.
STAM. *Filamenta* quatuor, simplicia, longitudine corollulæ. *Antheræ* distinctæ, incumbentes.
PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigma* obtusum.
PER. nullum. *Calyx proprius* connivens, includens semen. *Receptaculum commune* oblongum, paleis distinctum.
SEM. solitaria, ovata.

SPEC. *Vulgaris* (gemeine K.) caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis, caulinis lanceolatis. *Loc.* apricis duris. *Flos.* Aug.

44) DIPSACUS, (Karten) Linn. G. 114.

CAL. *Perianth.* commune, multiflor. polyphyllum: *foliolis* flosculo longioribus, laxis, persistentibus. *Perianth. proprium* vix manifestum, superum.
COR. propria universalis æqualis, monopetala, tubulosa, limbo quadrifido, erecto; lacinia exteriori maiore, acutiore.
STAM. *Filamenta* quatuor, capillaria, corollâ longiora. *Antheræ* incumbentes.
PIST. *Germen* inferum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* simplex.
PER. nullum. RECEPTAC. *commune* conicum, paleis longioribus distinctum.
SEM. solitaria, columnaria, margine calycino integro coronata.

SPEC. *Fullonum* (Weber K. Walkerdistel, wilde K.

K. Diſtel.) foliis feſſilibus ſerratis. *Loc.* ad vias. *Fl.* Jul. *Vis.* Radicis mucilaginoſæ ad rhagades ani, & phtiſicis. *Uſ.* capita plantæ echinata inſtar pectinis fullonibus. *Flores* apibus.

45) SCABIOSA, (Scabioſe) Linn. G. 115.

Cal. *Perianth. commune* multiflorum patens. polyphyll. *foliolis* ſeriebus variis receptaculum cingentibus eique inſidentibus, quorum interiora gradatim minora. *Perianthium proprium* duplex, utrumque germini inſidens, quorum.
P. exterius brevius, membranac., plicatum, perſiſtens.
P. interius ſ. partitum: *laciniis* ſubulato-capillaceis.

Cor. ſingula monopetala. *Petalum* erectum, tubulatum, ſenſim ampliatum, ſemi-quinqueſidum (quadrifidumve:) *laciniis* exterioribus majoribus.

Stam. *Filamenta* quatuor, ſubulato-capillaria, debilia. *Antheræ* oblongæ, incumbentes.

Pist. *Germen* infra receptaculum proprium floſculi, propriâ vaginâ involutum tanquam calyculo. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* obtuſum, oblique emarginatum.

Per. nullum. Receptaculum *commune* convexum, foliolis ſubpaleaceum.

Sem. ſolitaria, ovata, oblonga, involuta, calycibus propriis coronata.

Obs. Figura *in hocce genere maxime inconſtans eſt.* Corollulæ *exteriores ſæpe majores, magis inæquales.* Seminum coronæ *variæ in diverſis: floſculi quadrifidi & 5fidi primario ſpecies diſtinguunt.*

Spec. 1) *Succiſa* (Teufels-Abbis,) corollulis quadrifidis æqualibus, caule ſimplici, ramis approximatis, foliis lanceolato ovatis integerrimis. *Loc.* Paſcuis humidiuſculis montoſis. *Fl.* Jun. Jul. *Vis.* Herba & radix adſtringens, ſubamara. *Uſ.* radicis luteo tinctorius & viridi tinct. foliorum. *Flos.* Apibus, bobus, capr. ovibus, equis pabul.

2) *Arvenſis*, (gemeine, Acker S. Apoſtemkraut,) corollul. quadrifidis radiantibus, caule hiſpido, foliis pinnatifidis, lobis diſtantibus. *Loc.* In pratis, juxta ſegetes. *Fl.* May-Aug. *Vis.* Radicis diluens, exanthèmatica, adſtringens. *Uſ. Pecoribus* pab. herba & apibus flores. 3) *Co-*

3) *Columbaria* (kleine blaue berg S. klein A.) coroll. quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis ſetaceis. *Loc.* Montoſis ſiccioribus, ſilvis. pratis, collibus. *Fl.* Jun-Aug. *Vis* herbæ aperiens, attenuans. *Uſ.* apibus pabul.

46) SCHERARDIA, (Scherarde.) Linn. G. 120.

Cal. *Perianthium* parvum, quadridentatum, germini inſidens, perſiſtens.
Cor. *Petalum* unicum. *Tubus* cylindraceus, longus. *Limbus* quadripartitus, planus, acutus.
Stam. *Filam.* 4. ad apicem tubi poſita. *Anth.* ſimplices.
Pist. *Germen* didymum, oblong. infra receptac. *Stylus* filiformis, ſuperne bifidus, *Stigmata* capitata.
Per. nullum. *Fructus* oblongus, coronatus, longitudinaliter in duo ſemina ſeparabilis.
Sem. bina, oblonga, apice tribus acuminibus notata, hinc convexa, inde plana.

Spec. *Arvenſis* (kleines blaues Sternkraut, Ackerpflanze S.) foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus. *Loc.* In arvis. *Fl.* Jul-Aug. Obs. ovibus adverſa.

47) ASPERULA, (Waldmeiſter, Megerkraut,) Linn. G. 121.

Cal. *Perianth.* parvum, 4dentatum, germini inſidens.
Cor. *Petal.* 1. *Tubus* cylindraceus, longus. *Limbus* quadripartitus: *laciniis* oblongis, obtuſis, reflexis.
Stam. *Filam.* 4. ad apicem tubi poſita. *Anth.* ſimplices,
Pist. *Germ.* didymum, ſubrotund. infra receptac. *Stylus* filiformis, ſuperne bifidus. *Stigmata* capitata.
Per. *Baccæ* ſiccæ, duæ, globoſæ, coalitæ.
Sem. ſolitaria, ſubrotunda, magna.

Spec. 1) *Odorata*, (wahrer W. Sternleberkraut, Herzfreud,) foliis octonis lanceolatis, florum faſciculatis pedunculatis. *Loc.* Umbroſis ſilvis. *Fl.* May-Jul. *Vis* Adſtringens herbæ ad rabiem caninam, diluens, diuretica. *Uſ.* Bobus capr. ovib. equis pabul. flores apibus, ob ſuaveolentiam ad tineas.

2) *Arvenſis*, (kleines blaues Sternkraut, Acker W.) foliis ſenis, floribus ſeſſilibus aggregatis

terminalibus. *Loc.* Agris. *Fl.* cæruleus Jul. *Uſ.* rubro tinctorius.

48) GALIUM, (Labkraut,) Linn. G. 125.

CAL. *Perianth.* minimum, quadridentatum, ſuperum.
COR monopetala, rotata, quadripartita, acuta, tubo nullo.
STAM. *Filamenta* quatuor, ſubulata, corollâ breviora. *Antheræ* ſimplices.
PIST. *Germ.* didymum, inferum. *Stylus* filiformis, ſemibifidus, longitudine ſtaminum. *Stigmata* globoſa.
PER. *Baccæ* ſiccæ, duæ, globoſæ, coalitæ.
SEM. ſolitaria, reniformia, magna.

SPEC. 1) *Verum* (wahres Lab-Megerkraut, Waldbetſtroh,) foliis octonis linear. ſulcatis, ramis floriferis brevibus. *Loc.* Dumetis, pratis. ad muros. *Fl.* Luteus Jun. Jul. *Vis.* Coagulans lac, fragrans, ſubadſtring. farina ad cerevitias. *Uſ.* Rad. rubro & florum luteo tinctorius capr. ovibus pab.

2) *Mollugo*, (breitblätrig Labkraut, weis Wald-Wellſtroh - Megerkraut, Meyerkraut,) foliis octonis ovato linear. ſubſerratis patentiſſimis, mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. *Loc.* Montoſis, pratis hnmidis. *Flos.* Jun *Vis.* Florum antepileptica, antipodagrica. *Uſ.* Radic. rubro tinctorius.

3) *Aparine*, (Klebkraut, Nabelſaamen,) fol. octon. lanceol. carinat. ſcabris retrorſum aculeat. geniculis villoſis, fructu hiſpido. *Loc.* Cultis, ruderatis, hortis, ſepibus, ſegetibus. *Fl.* Jun. Jul. *Uſ.* Rad. rubro tinctor. bobus capr. ovib. equis pabul. & anſeribus.

49) RUBIA, (Röthe) Linn. G. 127.

CAL. *Perianth.* minimum, quadridentatum, ſuperum.
COR. monopetala campanulata, quadripartita, absque tubo.
STAM. *Filamenta* quatuor, ſubulata, corollâ breviora. *Antheræ* ſimplices.
PIST. *Germen* didymum, inferum. *Stylus* filiformis, ſuperne bifidus. *Stigmata* capitata.
PER. *Baccæ* duæ, coalitæ, glabræ.

SEM.

Sem. ſolitaria, ſubrotunda, umbilicata.
Obs. Flos ſæpe quinqueſidus evadit.
Spec. *Tinctorum*, (Färber-Krap, R.) ſativa perennis, fol. ſubſenis, quinis. *Loc.* Agris, hortis. *Fl.* Jul. *Vis.* Adſtringens, aperiens, pellens, diuretica, urinam & oſſa rubra tingens. *Uſus* Rubro tinctorius radicis.

50) PLANTAGO, (Wegerich,) Linn. G. 142.

Cal. *Perianthium* quadripartitum, erectum, breviſſimum, perſiſtens.
Cor. monopetala, perſiſtens, tabeſcens. *Tubus* cylindraceo-globoſus. *Limbus* quadripartitus, depreſſus: *laciniis* ovatis, acutis.
Stam. *Filam.* 4. capillaria, erecta, omnium longiſſima. *Antheræ* oblongiuſculæ, compreſſæ, incumbentes.
Pist. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, ſtaminibus dimidio brevior. *Stigma* ſimplex.
Per. *Capſula* ovata, bilocularis, circumſciſſa, diſſepimento libero.
Sem. plurima, oblonga.
Obs. Calyx *in quibuſdam inæqualis eſt, in aliis æqualis, uniflora monoica eſt.*
Spec. 1) *Maior*, (groſſer, breiter Wegerich, Wegbreit.) fol. ovatis glabris, ſcapo tereti, ſpica floſculis imbricatis. *Loc.* Ad vias. *Fl.* May. Jun. *Vis.* Adſtring. vulneraria. *Uſ.* Ad olera in annona, pabul. capr. ovib. porcis.
2) *Media* (mitlerer W. weiſſer Wegbreit,) fol. ovato-lanceol. pubeſcentibus, ſpica cylindrica, ſcapo tereti. *Loc.* Paſcuis, ſterilibus, apricis. *Fl.* May. *Uſ.* Succedaneum maioris, pl. flores apibus.
3) *Lanceolata* (kleiner-ſpiziger-ſchmaler langblätriger Wegerich, Hunderibbe,) fol. lanceol. ſpica ſubov. nuda, ſcapo angulato. *Loc.* Saxoſis ſterilibus, ad vias. *Fl.* May. *Vis.* Exſiccans, adſtring. lac augens, antiputredinoſum. *Uſ.* Capr. ovib. equis pabul.

51) SANGUISORBA, (Wieſenkopf Sperbenkr.) Linn. G. 146.

Cal. *Perianthium* diphyllum: *foliolis* oppoſitis, breviſſimis, caducis.

Cor monopetala, rotata, quadripartita: *laciniis* ovatis, obtusis, unguibus cohærentibus.
Stam. *Filamenta* quatuor, superne latiora, longitudine corollæ. *Antheræ* subrotundæ, parvæ.
Pist. *Germ.* quadragonum, inter calycem & corollam positum. *Styl.* filiformis, brevissimus. *Stigm.* obtusum.
Per. Capsula, parva, bilocularis. Sem. parva.
Spec. *Officinalis*, (gewöhnliche W. grosse falsche Biebernel, Wiesen - Pimpirnelle,) spicis ovatis. *Loc.* Pratis siccioribus, montosis. *Fl.* May. Jun. *Vis.* Adstring. tonica, refriger. *Us.* Herbæ coriis parandis; pecor. ovib. pab.

52) CORNUS, (Kornelle Härtern,) Linn. G. 149.

Cal. *Involucr.* tetraphyllum, multiflorum, *foliolis* ovatis, oppositis minoribus, coloratis, deciduis. *Perianthium* minimum, quadridentatum, superum, deciduum.
Cor. *Petala* 4 oblonga, acuta, plana, involucro minora.
Stam. *Filam.* 4. subulata, erecta, corollâ longiora. *Antheræ* subrotundæ, incumbentes.
Pist. *Germ.* subrotundum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* obtusum.
Per. *Drupa* subrotunda, umbilicata.
Sem. *Nux* cordata seu oblonga, bilocularis.
Spec. 1) *Mas*, (gemeine K. Cornelkirschenbaum, Ruhrkirschen, Dürlizen,) hortensis, arborea, umbellis involucrum æquantibus. *Loc.* Sepibus Austriæ, & hortis Germaniæ. *Fl.* Flavus Mart. baccæ rubræ esculentæ matureseunt Aug. Sept. sunt acidæ, adstringent. temperant. stipticæ.
2) *Sanguinea*, (Hartriegel, Hartreder, Hundsbeerstrauch, Schiefsbeerholz, Teufelsmatten, wilde Dürlizen.) arborea, (femina,) cymis nudis, umbellis involucro multoties longioribus. *Loc.* Sepibus, dumetis. *Fl.* May. Jun. *Us.* Sepibus, aggeribus, lignum durum tenax scapis sclopetorum, tornatoribus loco buxi, lanionibus ad verrucula: e baccis oleum pro lucernis Tridentini.

53) TRAPA, (Stachel-Wassernuss.) Linn. G. 157.

Cal. *Perianthium* monophyllum, quadripartitum, acutum, persistens.

Cor.

Cor. *Petala* 4. obovata, calyce majora.
Stam. *Filam.* 4. longitudine calycis. *Antheræ* ſimplices.
Pist. *Germen* ovatum. *Stylus* ſimplex, longitudine calycis. *Stigma* capitatum, emarginatum.
Per. nullum.
Sem. *Nux* ovato-oblonga, unilocularis; *Spinis* 4. in medio latere oppoſitis, patentibus (quæ calycis folia fuere) acutis, craſſis armata.

Spec. *Natans* (ſchwimmende W. Stachelnuſs,) petiolis foliorum natantium ventricoſis. *Loc.* Stagnis limoſis. *Uſ.* Nucleus farinaceus loco panis.

54) ALCHEMILLA, (Sinau.) Linn. G. 165.

Cal. *Perianth.* monophyll. tubulatum, perſiſtens: *ore plano*, octipartito: *laciniis* alternis minoribus.
Cor. nulla.
Stam. *Filamenta* 4. erecta, ſubulata, minima, ori calycis impoſita. *Antheræ* ſubrotundæ.
Pist. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtamin. ad baſin germinis inſertum. *Stigma* globoſum.
Per. nullum. *Calycis* Collum clauditur, nec dehiſcit.
Sem. ſolitarium, ellipticum, compreſſum.

Spec. 1) *Vulgaris*, (gemeiner S. Löwenfus, unſerer lieben Frauen Mantel,) foliis lobat. palmatis. *Loc.* Paſcuis, ſepibus, agris. *Fl.* May. Aug. *Vis.* Vulneraria, ſtiptica. *Uſ.* Coriis parandis, capr. ovib. equis, pecor. pabul.

2) *Alpina* (Alpen S.) foliis digitatis ſerratis. *Loc.* Alpibus. *Uſ.* Bob. capr. pabul.

Claſſis IV.

TETRANDRIA. *Ordo II.* DIGYNIA.

55) CUSCUTA, (Flachsſeide) Linn. G. 170.

Cal. *Perianthium* monophyllum, cyathiforme, ſemiquadrifidum, obtuſum, baſi carnoſum.
Cor. monopetala, ovata, calyce paulo longior: *ore* quadrifido, obtuſo. Nectarium e ſquamis 4. linearibus, bifidis, acutis ad baſin ſtaminum corollæ adnatis.
Stam. *Filam.* 4. ſubulata, longitudine calycis. *Anth.* ſubrotundæ.

PIST. *Germen* ſubrotundum. *Styli* duo, erecti breves. *Stigmata* ſimplicia.
PER. carnoſ. ſubrotundum, biloculare, circumſciſſum.
SEM. bina.
OBS. in quibusdam 1/2 pars additur fructificat. partibus.
SPEC. *Europæa*, (europäiſche F.) floribus ſeſſilibus, repens nuda filiformis. *Loc.* in plantis europæ paraſitica. *Fl.* Aug. *Vis.* Purgans. *Uſ.* Pecor. pabul. caules tingunt colore pupuraſcente.

TETRANDRIA, TETRAGYNIA, (Mit vier Staubwegen.)

56) POTAMOGETON, (Saamkraut) Linn. G. 174.

CAL. nullus.
COR. *Petala* quatuor, ſubrotunda, obtuſa, concava, erecta, unguiculata, decidua.
STAM. *Filamenta* quatuor, plana, obtuſa, breviſſima. *Antheræ* didymæ, breves.
PIST. *Germina* quatuor, ovato-acuminata. *Stylus* nullus. *Stigmata* obtuſa.
PER. nullum.
SEM. quatuor, ſubrotunda, acuminata, hinc gibba, inde compreſſa, angulataque.
SPEC. *Natans*, (ſchwimmendes S. Seeſalden, Fluskraut) foliis oblongo-ovat. petiolat. natantibus. *Loc.* Lacubus & fluviis. *Fl.* Jul. *Vis.* Refrigerans, adſtring. *Uſ.* Aquas piſcibus pacatas reddit. bob. capr. pabul.

57) SAGINA, (Maſtk. Vierling,) Linn. G. 176.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* ovatis, concavis, patentiſſimis, perſiſtentibus.
COR. *Petala* 4. ovata, obtuſa, calyce breviora, patentia.
STAM. *Filam.* 4. capillaria. *Antheræ* ſubrotundæ.
PIST. *Germen* ſubgloboſum. *Styli* 4. ſubulati, recurvi, pubeſcentes. *Stigmata* ſimplicia.
PER. *Capſula* ovata, recta quadrilocularis, quadrivalvis.
SEM. numeroſa, minima, receptaculo affixa.
SPEC. *Procumbens*, (geſtrecktes Maſtkraut, Vierling,) Ramis procumbentibus, petalis breviſſimis. *Loc.* Paſcuis, ſterilibus, uliginoſis, aridis. *Fl.* Jun.-Sept. Claſ-

Classis V.

PENTANDRIA, (Mit 5 Staubfäden.)

Ordo I. MONOGYNIA.

58) MYOSOTIS, (Mausöhrgen,) Linn. G. 180.

Cal. *Perianthium* semiquinquefidum, oblong. erectum, acutum, persistens.

Cor. monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* cylindraceus, brevis. *Limbus* semiquinquefidus, planus: *laciniis* emarginatis, obtusis. *Faux* clausa: *squamulis* quinque, convexis, prominentibus, conniventibus.

Stam. *Filamenta* quinque, in collo tubi, brevissima. *Antheræ* minimæ, tectæ.

Pist. *Germina* quatuor. *Stylus* filiformis, longitudine tubi corollæ. *Stigma* obtusum.

Per. nullum. *Cal.* major, erectus, in sinu semina fovens.

Sem. quatuor, ovata, acuminata, glabra.

Obs. *Species* aliæ seminibus lævibus, aliæ aculeis uncinatis,

Spec. 1) *Scorpioides*, palustris, (Vergis mein nicht, Je länger je lieber,) seminibus nudis, foliorum apicibus callosis, foliis glabris. *Loc.* Aquosis, scaturiginosis. *Fl.* Jun. *Us.* Capris pabul. ovibus venenum.

2) *Scorpioid. Arvensis*, (scorpionartiges Acker M.) foliis hirsutis. *Loc.* Campis aridis, arvis. *Fl.* May. Planta nutriens.

59) LITHOSPERMUM, (Steinsame) Linn. G. 181.

Cal. *Perianth.* quinquepartitum, oblongum, rectum, acutum, persistens; *laciniis* subulatis, carinatis.

Cor. monopetala infundibuliformis, longitudine calycis. *Tubus* cylindraceus. *Limbus* semiquinquefidus, obtusus, erectus. *Faux* perforata.

Stam. *Filamenta* quinque, brevissima. *Antheræ* oblongæ, in fauce corollæ.

Pist. *Germina* quatuor. *Stylus* filiformis, longitudine tubi corollæ. *Stigma* obtusum, bifidum.

Per. nullum. *Calyx* patulus, semina, quibus decies longior, in sinu continens.

Sem. quatuor, ovato-acuminata, dura, glabra.

Spec. 1) *Officinale*, (gew. St. Steinhirſe,) ſeminibus lævibus, corollis calycem vix ſuperantibus, foliis lanceolatis. *Loc.* Ruderatis, arvis, agris. *Fl.* Apr. May. *Vis.* Abſorbens, adſtringens, diuretica. *Uſ.* Capris pab.

2) *Arvenſe*, (Acker St. wilde Steinhirſe, Rothwurz, rothe Ochſenzunge, falſcher Meerhirſen, Schminkwurzel,) ſeminibus rugoſis, corollis vix calycem ſuperantibus *Loc.* Agris, arvis. *Fl.* May. *Vis.* Foliorum adſtringens, irritans. *Uſ.* Radicis rubro tinctorius; Helſingis pigmentum cosmeticum: floris apibus.

60) ANCHUSA, (Ochſenzunge,) Linn. G. 182.

Cal. *Perianthium* quinquepartitum, oblongum, teres, acutum, perſiſtens.

Cor. *Petalum* unicum infundibuliforme. *Tubus* cylindraceus, longitudine calycis. *Limbus* ſemiquinquefidus, erecto-patens, obtuſus. *Faux* clauſa *ſquamulis* 5. convex. prominentib. oblongis, conniventibus.

Stam. *Filam.* 5. breviſſima, in fauce corollæ. *Anth.* oblongæ, incumbentes, tectæ.

Pist. *Germina* quatuor. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* obtuſum, emarginatum.

Per. nullum. *Cal.* major, erectus, in ſinu contin. ſemina.

Sem. quatuor, oblongiuſcula, obtuſa, gibba.

Spec. 1) *Officinalis*, (gem. O.) foliis lanceolatis, ſpicis imbricatis ſecundis. *Loc.* Ad Ruderata, vias, agros. *Fl.* May. Jun. *Vis.* cordialis, exhilarans. *Uſ.* Foliorum recentium ad olera; Corollæ in efflorescentia purpureæ, dein cæruleæ, alumine mixtæ tingunt colore viridi: pecor. pab.

2) *Tinctoria*, (färbe O.) tomentoſa, fol. lanceol. obtuſis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Loc.* Monſpelii. *Uſ.* Rubro tinctorius.

61) CYNOGLOSSUM, (Hundszunge) Linn. G. 183.

Cal. *Perianthium* quinquepartitum, oblongum, acutum, perſiſtens.

Cor. monopetal. infundibuliformis, longitudine calycis. *Tubus* cylindraceus, limbo brevior. *Limbus* ſemiquinquefidus, obtuſus. *Faux* clauſa: *ſquamulis* 5. convexis, prominentibus, conniventibus.

Stam.

STAM. *Filamenta* quinque, breviſſima, in fauce corollæ. *Antheræ* ſubrotundæ, nudæ.
PIST. *Germina* 4. *Stylus* ſubulatus, longitudine ſtaminum, perſiſtens. *Stigma* emarginatum.
PER. nullum, ſed *Arilli* ſeminum 4. depreſſi, ſubrotundi, extrorſum obtuſiores, ſcabri, non dehiſcentes, latere exteriore planiuſculi, apice affixi.
SEM. ſolitaria, ſubovata, gibba, acuminata, glabra.
OBS. Eſſentia *generis conſiſtit in quatuor Arillis monoſpermis ſtylo affixis.*

SPEC *Officinale*, (gebräuchliche H.) ſtaminibus corolla brevioribus, fol. lato lanceol. tomentoſis ſeſſilibus. *Loc.* Ruderatis, viis lapidoſis. *Fl.* May. Jun. *Vis.* Adſtring. narcotica rad. anodina. *Uſ.* Capr. pab. aliis pecoribus adverſa.

62) PULMONARIA, (Lungenkraut) Linn. G. 184.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquedentatum, pentagonum, perſiſtens.
COR. monopetala infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, longitudine calycis. *Limbus* ſemiquinquefidus, obtuſus, erecto-patens. *Faux* pervia.
STAM. *Filamenta* quinque, in fauce, breviſſima. *Antheræ* erectæ, conniventes.
PIST. *Germina* quatuor. *Stylus* filiformis, calyce brevior. *Stigma* obtuſum, emarginatum.
PER. nullum. *Calyx* immutatus, in fundo ſemina fovens.
SEM. quatuor, ſubrotunda, obtuſa

SPEC. *Officinalis* (gewöhnliches gefleckt L.) fol. radicalibus ovato cordatis ſcabris. *Loc.* Nemoribus, ſilvis. *Fl.* Mart-May *Vis.* Vulneraria, glutinans, bechica, mucilaginoſa. *Uſ.* Ad olera; pecor. pab.

63) SYMPHITUM, (Beinwel, Schwarzwurz.) Linn. G. 185.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, erectum, pentagonum, acutum, perſiſtens.
COR. *Petalum* unicum, campanulatum. *Tubus* breviſſimus. *Limbus* tubulato-ventricoſus, tubo paulo craſſior: *ore* quinquedentato, obtuſo, reflexo. *Faux*

munita: *radiis* 5. ſubulatis, limbo brevioribus in conum conniventibus.

Stam. *Filamenta* 5. ſubulata, cum radiis faucis alterna. *Antheræ* acutæ, erectæ, tectæ.

Pist. *Germina* 4. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* ſimplex.

Per. nullum. *Calyx* major, ampliatus.

Sem. quatuor, gibba, acuminata, apicibus conniventia.

Spec. *Officinale*, (gemeines B. Walwurz,) foliis ovato lanceolatis decurrentibus. *Loc.* Umbroſis ſubhumidis. *Fl.* May-Aug. *Vis.* Glutinans, vulneraria, adſtring. inviſcans radic. *Uſ.* Summitates ad olera, herba coriis parandis, flos apibus.

64) BORRAGO, (Boretſch) Linn. G. 188.

Cal. *Perianthium* quinquepartitum, perſiſtens.

Cor. *Petalum* unicum rotatum, longitudine calycis. *Tubus* calyce brevior. *Limbus* 5. partitus, rotatus, planus: *Faux* coronata: *prominentiis* 5. emarginatis, obtuſis.

Stam. *Filamenta* 5. ſubulata, conniventia. *Antheræ* oblongæ, filamentorum lateri interiori in medio affixæ, conniventes.

Pist. *Germina* quatuor. *Stylus* filiformis, ſtaminibus longior. *Stigma* ſimplex.

Per. nullum. *Calyx* major inflatus.

Sem. quatuor, ſubrotunda, rugoſa, apice extrorſum carinata, baſi globoſa, receptaculo excavato inſerta longitudinaliter.

Obs. Calycis *laciniæ quoad figuram*, & Corollæ *Tubus quoad magnitudinem*, *differunt*.

Spec. *Officinaliis*, (gewöhnliche B. Borragen,) fol. omnibus alternis, calycibus patentibus. *Loc.* Hortis. *Fl.* Cærul. Jun. Jul. *Vis.* Cordialis, exhilarans. *Uſ.* Folior. ad olera, & cum flor. ad acetaria.

65) ASPERUGO, (Scharfkraut) Linn. G. 189.

Cal. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, dentículis erectum, in æqualibus, perſiſtens.

Cor. *Petalum* 1. infundibulif. *Tubus* cylindraceus breviſſimus. *Limbus* ſemiquinquefidus, obtuſus, pravus. *Faux* clauſa: *ſquamulis* 5. convexis, prominentibus, conniventibus.

Stam.

STAM. *Filamenta* quinque, in fauce, breviſſima. *Antheræ* oblongiuſculæ, tectæ.
PIST. *Germina* quatuor, compreſſa. *Stylus* filiformis, brevis, *Stigma* obtuſum.
PER. nullum. *Calyx* maximus, erectus, compreſſus, connivens.
SEM. quatuor, *oblonga*, compreſſa, per paria diſtantia.
SPEC. *Procumbens*, (geſtrecktes S. groſſes blaues Klebkraut, kleine wilde Ochſenzunge,) calycibus fructus compreſſis. *Loc.* Ruderatis pinguibus. *Fl.* Jun. *Uſ.* Folia juniora ad olera; bob. capr. ovib. equis pabulum.

66) LYCOPSIS, (Wolfsgeſicht, Krumhals,) Linn. G. 190.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: *laciniis* oblongis, acutis, patulis, perſiſtentibus.
COR. *Petalum* 1. infundibuliforme. *Tubus* cylindraceus, curvato-flexus. *Limbus* ſemiquinquefidus, obtuſus. *Faux* clauſa: *ſquamulis* quinque convexis, prominentibus, connivéntibus.
STAM. *Filamenta* quinque, minima, ad flexuram tubi corollæ. *Antheræ* parvæ, tectæ.
PIST. *Germina* quatuor. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* obtuſum, bifidum.
PER. nullum. *Calyx* maximus, inflatus.
SEM. quatuor, ſublonga.
OBS. Eſſentia *generis conſiſtit in curvatura tubi corollæ.*
SPEC. *Arverſis*, (Acker W. Ackerkrumhals, rauhe Feldochſenzunge,) fol. lanceol. hiſpidis, calycibus floreſcentibus erectis. *Loc.* Agris, ſaxoſis ad aquas. *Fl.* Aug. *Uſ.* Ovibus pabul. bob. capr. equis & apibus.

67) ECHIUM, (Otter-Natter Kopf.) Linn. G. 191.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, erectum, perſiſtens: *laciniis* ſubulatis, erectis.
COR. *Petal.* 1. campanulatum. *Tubus* breviſſim. *Limb.* erect. ſenſim ampliat. quinquefid. obtuſus: *laciniis* ſæpius inæqualibus: *ſuperioribus* 2. longioribus, *infimâ* minore acuta, reflexa. *Faux pervia.*
STAM. *Filam.* 5. ſubulata, longitudine corollæ, declinata, inæqualia, *Anth.* oblongæ, incumbentes.
PIST.

PIST. *Germina* quatuor. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* obtuſum, bifidum.
PER. nullum. *Calyx* rigidior, in ſinu ſemina fovens.
SEM. quatuor, ſubrotunda, oblique acuminata.
SPEC. *Vulgare*, (gem. O. N. K. wilde Ochſenzunge, falſcher Wayd.) caule tuberculato hiſpido, foliis caulinis lanceolatis hiſpidis, floribus ſpicatis lateralibus. *Loc.* Saxoſis ad vias, & agros. *Fl.* Jun. *Uſ.* Apibus.

68) PRIMULA, (Schlüſſelblume) Linn. G. 197.

CAL. *Involucrum*, polyphyllum, multiflorum, minimum. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, pentagonum, quinquedentatum, acutum, erectum, perſiſtens.
COR. *Petal.* 1. *Tubus* cylindraceus, longitudine calycis, terminatus collo parvo, hemiſphærico. *Limbus* patens, ſemiquinquefidus: *laciniis* obcordatis, emarginatis, obtuſis. *Faux* pervia.
STAM. *Filam.* 5. breviſſima intra collum corollæ. *Anth.* acuminatæ, erectæ, conniventes, incluſæ.
PIST. *Germen* globoſum. *Stylus* filiformis, longitudine calycis. *Stigma* globoſum.
PER. *Capſula* teres, longitudine ferme perianthii, tecta, unilocularis, dehiſcens, apice decemdentato.
SEM. numeroſa, ſubrotunda. *Receptaculum* ovato-oblongum, liberum.
SPEC. 1) *Veris*, Officinalis, (Frühlings S. Himmelsſchlüſſel, wilde Bathengen,) foliis dentatis rugoſis, odorata. *Loc.* Pratis, ſilvis, montibus. *Fl.* Luteus Apr. May. *Vis.* Narcotica, nervina, anodyna, ſtimulans. *Uſ.* Ad olera, apibus, pecor. pabulum, flores vinum, radix cereviſiam fragrantem efficit.
2) *Auricula*, (Aurikel,) fol. ſerrat. glabris carnoſis. *Loc.* Alpibus, & hortis Europæ. *Fl.* Variegatus. Apr. & Sept. *Obſ.* Planta ſuaveolens, & ornamentum hortorum, apibus pab.

69) MENYANTHES, (Monatsblume, Zottenblume,) Linn. G. 202.

CAL. *Perianth.* 1. phyllum, 5 partitum, erectum, perſiſtens.
COR. *Petalum* unicum, infundibulif. *Tubus* cylindraceo-infundibuliformis, brevis.

Lim-

Limbus ultra medium quinquefidus: *laciniis* reflexo-patentibus, obtufis, hirfutie notatis.

STAM. *Filamenta* quinque, fubulata, brevia. *Antheræ* acutæ, bafi bifidæ, erectæ.

PIST. *Germen* conicum. *Stylus* cylindraceus, longitudine ferme corollæ. *Stigma* bifidum, compreffum.

PER. *Capfula* ovata, calyce cincta, unilocularis.

SEM. plurima, ovata, exigua.

SPEC. *Trifoliata*, (Bieber-Klee, Fieber-Waffer-Scharboks-Klee, Dreyblat,) foliis ternatis. *Loc.* Paludibus. *Fl.* Jul. *Vis.* Tonica balfamica, diuretica, anthelmintica, incidens. *Uf.* Pecorib. ovib. capr. pabulum: loco humuli ad crevifiam; in annona loco panis radix; folia viridi tinctoria.

70) LYSIMACHIA, (Lyfimachskr.) Linn. G. 205.

CAL. *Perianth.* 5partitum, acut. erectum, perfiftens.

COR. *Petalum* unicum rotatum. *Tubus* nullus. *Limbus* quinquepartitus, planus: *laciniis* ovato-oblongis.

STAM. *Filamenta* quinque, fubulata, *Anth.* acuminatæ.

PIST. *Germen* fubrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine ftaminum. *Stigma* obtufum.

PER. *Capfula* globofa, unilocularis, decemvalvis.

SEM. plurima, angulata. *Receptaculum* globofum, maximum, punctatum.

SPEC. 1) Vulgaris, (gemeiner gelber Weiderich, L.) paniculata, racemis terminalibus. *Loc.* Ad ripas & paludes. *Fl.* Aug. *Vis.* Adftringens, capillos dealbant flores. *Uf.* Apibus flor. bob. capr. ovibus pabul. herba & luteo tinctoria.

2) *Numularia*, (Pfennigkraut, Wiefengeld, Egelnkraut,) fol. fubcordatis, florib. folitariis, caule repente. *Loc.* Ad agros, fcrobes, in filvis, fepibus. *Fl.* Jun. Jul. *Vis.* Subadftringens, vulneraria, faponacea. *Uf.* Bob. capr. ovib. pecoribus pabulum.

71) ANAGALLIS, (Gauchheil,) Linn. G. 206.

CAL, *Perianthium* quinquepartitum, acutum, perfiftens: *laciniis* carinatis.

COR. *Petal.* 1. rotatum. *Tubus* nullus. *Limbus* 5partitus, planus: *laciniis* ovato-orbiculatis, unguibus connexis.

STAM. *Filam.* quinque, erecta, corollâ breviora, inferne hirfuta. *Antheræ* fimplices,

PIST.

PIST. *Germen* globoſum. *Stylus* filiformis, leviter inclinatus. *Stigma* capitatum.
PER. *Capſula* globoſa, unilocularis, horizontaliter in duo hemiſphæria dehiſcens.
SEM. plurima, angulata. *Receptac.* globoſum, maximum.
SPEC. *Arvenſis*, (Acker G. rother Hünerdarm-Miere-Hünertritt,) foliis indiviſis, caule procumbente. *Loc.* Hortis, arvis, agris, ad vias. *Fl.* Ruber Jun. *Uſ.* Herbæ ad rabiem caninam, epilepſ. melanchol. & bob. capr. pabul. ſemina ovibus minor. pab.

72) CONVOLVULUS, (Winde,) Linn. G. 215.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, connivens, ovatum, obtuſum, minimum, perſiſtens.
COR. *Petalum* 1. campanulato-patens, magnum, plicatum, obſolete ſ lobum.
STAM. *Filamenta* quinque, ſubulata, corollâ dimidio breviora. *Antheræ* ovatæ, compreſſæ.
PIST. *Germen* ſubrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, oblonga, latiuſcula.
PER. *Capſula* calyce obvoluta ſubrot. uni-bi-trivalvis.
SEM. bina, ſubrotunda, ſæpe acuta.
OBS. *Corolla communiter decem Crenis inciſa, ſed datur etiam limbo quinquefido.*
SPEC. 1) *Arvenſis*, (kleine Acker-Feld-Erd W.) fol. ſagittat. utrinque acutis, pedunculis unifloris. *Loc.* Agris. *Fl.* Jun. Jul. *Vis.* Vulneraria, reſolvens, detergens, anodyna. *Uſ.* Bob. capr. equ. ovib. pabul.
2) *Sepium*, (Hecken-Zaum W. Glocke,) foliis ſagittatis, poſtice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris. *Loc.* Sepibus. *Fl.* Albus Jun. Jul. *Vis.* Herbæ lacteſcentis purg. reſolvens, anodina.
3) *Scammonia*, (Purgier W.) fol. ſagitt. poſtice truncatis, pedunculis teretibus ſubtrifloris. *Loc.* Syria, & hortis Europæ. *Fl.* Jul. *Vis.* Purgans radix gummoſo reſinoſa.

73) CAMPANULA, (Glockenblume,) Lin. G. 215.

CAL. *Perianth.* ſ partitum, acut. erecto-patens, ſuperum.
COR. *Petal.* 1. campanulatum, baſi impervium, ſemiquinquefidum; marceſcens: *laciniis* latis, acutis, patulis.

Necta-

Nectarium in fundo corollæ, conſtructum *valvulis*, acutis 5, conniventibus receptaculum tegentibus.
STAM. *Filam.* 5. capillaria, breviſſ. inſerta valvularum Nectarii apicibus. *Anth.* filamentis longior. compreſſæ.
PIST. *Germ.* angulatum, infra receptaculum. *Stylus* filiformis, ſtaminibus longior. *Stigma* tripartitum, oblongum, craſſiuſculum, *laciniis* revolutis.
PER. *Capſula* ſubrotunda, angulata, 3. 5ve-locularis, totidem foraminibus lateralibus emittens ſemina.
SEM. numeroſa parva. *Receptac.* columnare, adnatum.
OBS. Pericarpii figura indeterminata eſt.
TRACHELII *Raj. Pericarp. villoſum ſcabr. triloculare.*
RAPVNCVLI *Raj. Pericarp. glabr. ovatum, triloculare.*

SPEC. 1) *Rotundifolia*, (rundblätr. kleine blaue Glas-Milch-Glöcklein, kleine wilde Rapuncel.) foliis radicalibus, reniformibus, caulinis linearibus. *Loc.* Pratis. *Fl.* Cærul. May-Aug. *Uſ.* Bob capr. ovib. equis pabul. corollæ expreſſæ cæruleum exhibent pigmentum pro ſcriptura, addito alumine viride.

2) *Rapunculus*, (Rapuncel) foliis undulatis, radicalib. lanceolato-ovalibus, panicula coarctata. *Loc.* Ad vias & hortis. *Fl.* Jul. *Uſ.* Ad olera & acetaria.

3) *Trachelium*, (Glockenblume mit Neſſelblättern,) caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. *Loc.* Sepibus, ſilvis. Fl. Jul. Aug. *Uſ.* Ad olera & acetaria: bobus pabul.

4) PHYTEUMA, (Rapuncel,) Linn. G. 220.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, acutum, erecto-patens, germini impoſitum.
COR. *Petalum* 1. ſtellatum, patens, quinquepartitum: *laciniis* linearibus, acutis, recurvis.
STAM. *Filam.* 5. corollâ breviora. *Anth.* oblongæ.
PIST. *Germ.* inferum. *Stylus* filif. longitudine corollæ, recurvus. *Stigma* tripartit. oblongum, revolutum,
PER. *Capſula* ſubrotunda, trilocularis.
SEM. plurima, parva, ſubrotunda.

SPEC. *Spicata*, (ährige gemeine groſſe wilde Rapuncel,) ſpica oblonga, capſulis bilocularibus, foliis radicalibus cordatis. *Loc.* Silvis. *Fl.* May. Jun. *Uſ.* Ad acetaria; flores apibus.

75) LONICERA, (Lonicere) Linn. G. 233.

CAL. *Perianth.* quinquepartitum, parvum, ſuperum.
COR. *Petalum* 1. tubuloſum. *Tubus* oblongus, gibbus. *Limbus* quinquepartitus, *laciniis* revolutis, quarum una profundius ſeparata.
STAM. *Filamenta* quinque ſubulata, longitudine ferè corollæ. *Antheræ* oblongæ.
PIST. *Germen* ſubrotundum, inferum. *Stylus* filiformis longitudine corollæ. *Stigma* obtuſo-capitatum.
PER. *Bacca*, umbilicata, bilocularis.
SEM. ſubrotunda, compreſſa.
OBS. Caprifolium. *Corollæ lacinia inferiori duplo profundius ſeparata. Baccæ ſolitariè poſitæ.*
Periclimenum. *Corollæ laciniis ferè æqualiter profunde ſectis. Baccæ diſtinctæ.*
Xyloſteum. *Corollæ laciniis ferè æqualiter profunde ſectis. Baccæ duæ eidem baſi inſiſtentes.*

SPEC. 1) *Caprifolium*, (Geisblatt, Specklilie, Jerichoroſe,) floribus verticillatis terminalibus ſeſſilibus, foliis ſummis connato perfoliatis. *Loc.* Hortis Europæ. *Fl.* May. Jun. *Obſ.* Flores ſuaveolentes.

2) *Periclymenum*, caprifolium germanicum, (gemeine Specklilie, Waldwinde, wildes gemeines deutſches Geisblat,) capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus diſtinctis non perfoliatis. *Loc.* Ad vias. *Fl.* Rubellus foetidus, May. Jun. *Vis.* Adſtringens, vulneraria, mundificans. *Uſ.* Ad ſepes, vivas & ambulacra tecta in hortis: rad. cærul. tinctoria, baccæ dulces purgans noxium; lignum fiſtulis tabacinis, dentibus textorum & pratorum pectinum utile.

3) Xyloſteum, (gemeine Heckenkirſche, Hunds-Teufelskirſche, Zweck- Bein- Seelenholz, Schieſsbeere.) Pedunculis biſloris, baccis diſtinctis, foliis integerrimis, pubeſcentibus. *Loc.* Humidis ſepibus. *Fl.* May. Jun. *Uſ.* *Baccæ* emeticum & purgans noxium: lignum venatoribus, & ad ſepes denſas; herba capris ovibus pabulum.

76) MIRABILIS, (Wunderblume,) Linn. G. 242.

CAL. *Perianth.* ſphyllum, erecto-ventricoſ. *foliolis* ovato-lanceolatis, perſiſtentibus.

COR.

Cor. *Petal.* 1. infundibulif. *Tubus* tenuis, longus, ſuperne craſſior, nectario impoſitus. *Limbus* erecto-patens, integer, obtuſe quinquefidus, plicatus. *Neſtarium* globoſum, petalo ſuppoſitum, perſiſtens.

Stam. *Filam.* 5. filiformia, è receptac. orta, petalo (non nectario) adnata, corollæ longitudine, inclinata, inæqualia. *Anth.* ſubrotundæ, aſſurgentes.

Pist. *Germen* ſubrotundum, intra nectarium. *Stylus* filiformis longitudine & ſitu ſtaminum. *Stigma* globoſum, punctatum, aſſurgens.

Per. nullum.

Sem. *Nux* ovato-pentagona, è Nectario indur. decidua.

Spec. *Ialappa*, (falſche Ialappen, Schweizerhoſen, peruvianiſche Wunderblume, mexicaniſcher Nachtſchatten,) floribus congeſtis terminalibus erectis. *Loc.* In India & Europæ hortis. *Fl.* Rubr. luteus Aug. Sept. *Vis.* Leniter purgans quam Convolvuli Jalapæ ſ. veræ. *Uſ.* Ornamentum hortorum, & apibus.

77) VERBASCUM, (Königskerze,) Linn. G. 245.

Cal. *Perianth.* monophyllum, quinquepartitum, parvum, perſiſtens: *laciniis* erectis, acutis.

Cor. *Petal.* 1. rotatum. *Tubus* cylindraceus, breviſſimus. *Limbus* patens, 5partitus: *laciniis* ovatis, obtuſis.

Stam. *Filam.* 5. ſubulata, declinata, corollâ breviora. *Anth.* ſubrotundæ, compreſſæ, erectæ.

Pist. *Germen* ſubrotundum. *Stylus* filiformis, longit. ſtaminum, inclinat. *Stigm.* craſſiuſculum, obtuſum.

Per. *Capſula* ſubrotunda, bilocularis, ſuperne dehiſc. *Receptacula* dimidiato-ovata, diſſepimento affixa.

Sem. numeroſa, angulata.

Obs. *In pleriſque ſtamina inclinata ſunt, & inæqualia villiſque coloratis inferne veſtita.*

Spec. 1) *Thapſus*, (weis Wollkraut, Königskerze, Fackelkraut,) foliis decurrentibus utrinque tomentoſis. *Loc.* Glareoſis ſterilibus. *Fl.* Luteus ſubodoratus, Jun. Jul. *Vis.* Anodyna, antiſpasmodica, emolliens, repellens. *Uſ.* Apibus flor. ornamentum ſepium.

2) *Nigrum*, (ſchwarzes W. K.) foliis oblongo-cordatis petiolatis. *Locis* ad pagos, vias, humidis. *Fl.* Ex luteo purpuraſcens, Jul. Aug. *Vis.* Emolliens, ſtupefaciens. *Uſ.* Apibus.

78) DATURA, (Stechapfel,) Linn. G. 246.

CAL. *Perianth.* monophyllum, oblong. tubulat. ventricos. ς angulare. ς dentatum, deciduum horizontaliter propè basin, parte remanente orbiculata persistente.

COR. *Petal.* 1. infundibulif. *Tubus* cylindraceus, calice ferè longior. *Limbus* erecto-patulus, ς. angularis ς plicatus, ferè integer, ς dentato-acuminatus.

STAM. *Filam.* quinque, subulata, longitudine calycis. *Antheræ* oblongæ, compressæ obtusæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, rectus. *Stigma* crassiusculum, obtusum, bilamellatum.

PER. *Capsula* subovata, bilocularis, quadrivalvis, basi calycis impositа. *Receptacula* convexa, magna, punctata, dissepimento affixa.

SEM. numerosa, reniformia.

OBS. *Capsulæ* glabrities & aculeata *asperitas in hoc genere mutantur.*

SPEC. *Stramonium*, (gemeine Stechapfel Stachelnus, Dolkraut,) pericarpiis spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *Loc.* incultis & cultis, ad vias. *Fl.* Albus May-Sept. *Vis.* Narcotica & stupefaciens totius plantæ; ad cel. Stoerk experim. in mania, epilepsia proficuum eius extractum.

79) HYOSCIAMUS, (Bilsenkraut,) Linn. G. 247.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulosum, inferne ventricosum, *ore* quinquefido, acuto, persistens.

COR. *Petal.* 1. infundibulif. *Tubus* cylindrac. brevis. *Limbus* erecto-patens, semiquinquefidus: *laciniis* obtusis, unicâ reliquis latiore.

STAM. *Filam.* ς. subulata, inclinata. *Anth.* subrotundæ.

PIST. *Germ.* subrotundum. *Styl.* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* capitatum.

PER. *Capsula* ovata, obtusa, linea utrinque insculpta, bilocularis, duabus capsulis arcte approximatis, tecta operculo horizontaliter dehiscente. *Receptacula* dimidiato-ovata, dissepimento affixa.

SEM. numerosa, inæqualia.

SPEC. *Niger*, (gemeines schwarzes B.) fol. amplexicaulib. sinuatis, florib. sessilibus. *Loc.* Ruderatis pinguibus, montibus. *Fl.* May. Jun. *Vis.* Narcotica, dementans, anodyna, antispasmodica, repellens, virosa, toxica, ad cel. Stoerr.

Stoerr. exper. in melancholia, malo hypochondriaco, mania extractum utile.

80) NICOTIANA, (Taback,) Linn. G. 248.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ovatum, semiquinquefidum, persistens.
COR. *Petal.* 1. intundibulif. *Tubus* calyce longior. *Limbus* patulus, semiquinquefidus, quiqueplicatus.
STAM. *Filamenta* quinque subulata, longitudine ferè corollæ, adscendentia. *Antheræ* oblongæ.
PIST. *Germen* ovatum *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* capitatum, emarginatum.
PER. *Capsula* ferè ovata, utrinque linea insculpta, bilocularis apice dehiscens. *Receptacula* dimidiato-ovata, punctata, dissepimento affixa.
SEM. numerosa, reniformia, rugosa.
OBS. *Figura* acuminata & obtusa *in hocce genere varia.*
SPEC. 1) *Tabacum*, (gemeiner T.) fol. lanceolato-ovatis sessilibus decurrent. florib. acutis. *Loc.* America, nunc Eur. hortis & agris. *Fl.* Jul. Aug. *Vis.* Anodyna, antispasmodica, narcotica, vomitoria, repellens, errhina.
2) *Rustica*, (kleiner T.) fol. petiolat. ovatis integerr. florib. obtusis. *Loc.* America nunc Europæ hortis & agris. *Fl.* Jun. Jul. *Vis.* Minor ac prioris speciei.

81) ATROPA, (Wolfskirsche) Linn. G. 249.

CAL. *Perianth.* monophyllum, 5. partitum, gibbum: *laciniis* ovato-acutis, persistens.
COR. *Petalum* 1. campanulatum. *Tubus* brevissimus. *Limbus* ventricosus, ovatus, calyce longior; ore parvo quinquefido patulo: *laciniis* sub æqualibus.
STAM. *Filam.* 5. subulata, è basi corollæ enata, longitudine corollæ, basi conniventia, superne extrorsum diverg. arcuata. *Anth.* crassiusculæ, assurgentes.
PIST. *Germen* semi-ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum, inclinatus. *Stigma* capitatum, assurgens, transverso-oblongum.
PER. *Bacca* globosa, calyci magno insidens, bilocularis: *Receptaculo* carnoso, utrinque convexo, reniformi.
SEM. plurima, reniformia.
SPEC. *Belladonna*, (gemeine W. Toll-Kraut-Kirschen-

ſchenbeere, Teufelsbeere, Schlafbeer, tödlicher Wald-Nachtſchatten,) caule herbaceo, fol. ovatis integris. *Loc.* Silvis montoſis. *Fl.* Jun. Jul. *Vis.* Narcotica, anodyna, antiſpasmodica, repellens, reſolvens, viroſa, toxica.

82) PHYSALIS, (Judenkirſchen, Schlutten.) Linn. G. 250.

CAL. *Perianth.* 1. phyllum, ventricoſ. ſemiquinquefid. parvum, pentagonum: *laciniis* acuminatis, perſiſtens.
COR. *Petal.* 1. rotatum. *Tubus* breviſſimus. *Limb.* ſemiquinquefidus, magnus, plicatus: *laciniis* latis, acutis.
STAM. *Filamenta* quinque, ſubulata, minima. *Anth.* erectæ, conniventes.
PIST. *Germen* ſubrotundum. *Stylus* filiformis, ſtaminibus fere longior. *Stigma* obtuſum.
PER. *Bacca* ſubgloboſa, bilocularis, parva intra *calycem* maximum, inflat. clauſ. pentagon. coloratum. *Receptaculum* reniforme, duplicatum.
SEM. plurima, reniforma, compreſſa.
SPEC. *Alkekengi*, (gemeine I. Bockerellen) foliis geminis integris acutis, caule herbaceo inferne ſubramoſo. *Loc.* Scrobibus, ad vias, montes. *Fl.* Jun. *Vis.* Subanodyna, diuretica, refrigerans.

83) SOLANUM, (Nachtſchatten.) Linn. G. 251.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ſemiquinquefidum, erectum, acutum, perſiſtens.
COR. *Petal.* 1. rotatum. *Tubus* breviſſim. *Limbus* magnus, ſemiquinquefidus, reflexo-planus, plicatus.
STAM. *Filam.* 5. ſubulata, minima. *Anth.* oblongæ, connivent. contingentes, apice poris 2. dehiſcentes.
PIST. *Germen* ſubrotundum. *Stylus* filiformis, ſtaminibus longior. *Stigma* obtuſum.
PER. *Bacca* ſubrotunda, glabra, apice punctato, bilocularis: *Receptac.* utrinque convexo, carnoſo.
SEM. plurima, ſubrotunda, nidulantia.
SPEC. 1) *Dulcamara*, (Bitterſüs, Hirſchkraut, ſteigend Wald N. Je länger je lieber,) caule inermi fruteſcente flexuoſo, foliis ſuperiorib. haſtatis, racemis cymoſis. *Loc.* Sepibus humentib. rivis. *Fl.* May. Jun. *Vis.* Anodyna, repellens purificans diuretica, reſolvens. *Uſ.* Ad aggeres, ſepes

ſepes in fluviis, & hortis; rami ad vincula cantharorum.

1) *Nigrum*, (gemeiner R.) caule inermi herbaceo, fol. ovatis dentato-angulatis, umbellis nutantibus. *Loc.* Ad muros. *Fl.* Jul. *Vis.* Anodyna, repellens, refrigerans. Gallinis ſuibus venenum.

2) *Tuberoſum* eſculentum, (Erdbirn, Grundbirn,) caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis, pedunculis ſubdiviſis. *Loc.* Peru & nunc in Eur. agris. *Uſ.* Culinaris notus, panis ſuccedaneum; pecorib. pabul. ad diapasma ad ſpiritum.

3) *Lycoperſicon*, (Liebes-Æpfel,) caule inermi herbaceo, fol. pinnatis inciſis, racemis ſimplicib. *Loc.* America & hortis Eur. *Fl.* Jun. Poma Jul. Aug. ad acetaria.

84) CAPSICUM, (Indianiſch. Pfeffer, Beisbeere,) Linn. G. 252.

CAL. *Perianth.* monoph. 5fidum, erectum, perſiſtens.
COR. *Petal.* 1. rotatum. *Tub.* breviſſimus. *Limb.* ſemiquinquefidus, patens, plicatus: *laciniis* latis, acutis.
STAM. *Filamenta* quinque, ſubulata, minima. *Antheræ* oblongæ, conniventes.
PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, ſtaminibus longior. *Stigma* obtuſum.
PER. *Bacca* ſine pulpa, ad ovatam figuram accedens, bilocularis, cava, colorata. *Receptacula* diſſepimento adnata, exſucca.
SEM. plurima, reniformia, compreſſa.
OBS. *Pericarpii figura indeterminata eſt; à congeneribus Pericarpio baccato exſucco differt.*

SPEC *Annuum.* (jähriger I. P.) caule herbaceo pedunc. ſolitariis. *Loc.* America & hortis Europæ. *Vis* Corrodens, rubefaciens, ſtimulans, acris, ſeptica fructus flavi.

84) RHAMNUS (Wegedorn,) Linn. G. 265.

CAL. nullus: niſi corollam pro calyce ſumas.
COR. *Petal.* imperforat. externè rude, internè coloratum, infundibuliforme. *Tubus* turbinato-cylindraceus. *Limbus* patens, diviſus, acutus.
Squamulæ 5. minimæ, ad baſin ſingulæ diviſuræ ſingulæ, introrſum conniventes.

STAM. *Filamenta* tot, quot laciniæ corollæ, ſubulata, petalo ſub ſquamula inſerta. *Antheræ* parvæ.
PIST. *Germen* ſubrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* obtuſum, diviſum in pauciores lacinias quam corolla.
PER. *Bacca* ſubrotunda, nuda, diviſa in pauciores, quam corolla, partes internas.
SEM. ſolitaria, ſubrotunda, hinc gibba, inde compreſſa.
OBS. *Structura floris ovo ſimilior, quid de differentiis fructus ſtatuendum, clare, dictitat: vana itaque ſunt genera omnia characteri conformia, nec inde excepta per α. β. γ. δ. ε.*
α. *Frangula* Stigmate *emarginato.* Bacca *tetraſperma.* Corolla *quinquefida.*
β. *Catharticus.* Stigmate *quadrifido.* Bacca *tetraſperma.* Corolla *quadrifida: Dioica Tetrandra.*
γ. *Paliurus.* Styli *tres.* Nucleo *triloculari.* Corolla *quinquefida: margine membranaceo, cingente baccam.*
δ. *Alaternus.* Stigmate *trifido.* Bacca *triſperma.* Corolla *quinquefida. Polygamia dioica per mares & hermaphroditas. Squamulæ corollarum deficiunt.*
ε. *Ziziphus.* Stylis *duobus.* Baccæ *Nucleus biloculars.* Corolla *quinquefida.*

SPEC. 1) *Catharticus*, (purgierender W. Kreuz-Hirſchdorn, Schiesbeere, Färber-Rheinbeer Schlagbeer) ſpinis terminalibus, florib. quadrifidis dioicis, fol. ovatis. *Loc.* Sepibus. *Fl.* May. *Vis* Purgans folior. & baccar. *Uſ.* Ad ſepes altas virides; topiariis; ad aggeres; capr. ovib. equis pabul. cort. luteo purpuraſcente, baccæ immaturæ croceo, maturæ viridi tingunt colore coria & chartas luſorias, & viridis bacc. ſuccus ad pigmenta.

2) *Frangula*, (Pulverholz. Zapfenholz, Faul-Hundslaus-Baum.) inermis, florib. monogynis hermaphroditis, fol. integerrimis. *Loc.* Nemoroſis, humidiuſculis, montoſis. *Fl.* May. Jun. *Vis* Cortic. & baccar. purgans; *Uſ.* Ad aggeres, baccar. viridi, cortic. luteo, cum alumine rubro tinctor. carbones ad pulverem pyrium, flores apibus. fol. capr. ov. pecor. pabulum.

86) EUONYMUS, (Spilbaum) Linn. G. 271.
CAL. *Perianth.* monophyllum, quadripartitum, planum: *laciniis* ſubrotundis, concavis. COR

Cor. *Petala* 5. ovata, plana, patentia, calyce longiora.
Stam. *Filam.* 5. ſubulata, erecta, corollâ breviora, germini tanq. receptaculo impoſita. *Anth.* didymæ.
Pist. *Germen* acuminatum. *Stylus* brevis, ſimplex. *Stigma* obtuſum.
Per. *Capſula* ſucculenta, colorata, pentagona quinquangularis, quinquelocularis, quinquevalvis.
Sem. ſolitaria, ovata, obvoluta Arillo baccato.
Obs. *Fructificatio, in quibuſdam individuis vel ſpeciebus aufert quintam numeri partem.*
Quibuſdam Filamenta, præter acumina receptaculi, nulla.
Spec. *Europæus*, (gemeiner europ. S. Spindelbaum, Pfaffen-Hütlein-Käpgen-Röslein, Mitſchelinsholz, Pfefferreiſeholz, Zweckholz.) floribus plerisque quadrifid. oblongo ovatis. *Loc.* Sepibus. *Fl.* May. *Vis* Baccar. purgans, emeticum. *Uſ.* Ad ſepes humiliores, pulverem pyrium & pictoribus carbones, lignum flaveſcens variis inſtrumentis, tornatoribus; baccæ tinctoribus & ad pediculos.

17) RIBES, (Johannesbeer, Krausb.) Linn. G. 281.

Cal. *Perianthium* monophyllum, ſemiquinquefidum, ventricoſum: *laciniis* oblongis, obtuſis, concavis, coloratis, reflexis, perſiſtentibus.
Cor. *Petala* quinque, parva, obtuſa, erecta, calycis margini innata.
Stam. *Filam.* 5. ſubulata, erecta, calyci inſerta. *Antheræ* incumbentes, compreſſæ, margine dehiſcentes.
Pist. *Germen* ſubrotundum, inferum. *Stylus* bifidus. *Stigmata* obtuſa.
Per. *Bacca* globoſa, umbilicata, unilocularis: *receptac.* duobus, lateralibus, oppoſitis, longitudinalibus.
Sem. plurima, ſubrotunda, parum compreſſa.
Spec. 1) *Rubrum*, (rote Joh. Trauben-Beere.) *Racemis* glabris pendulis, floribus planiuſculis. *Loc.* Hortis, vineis. *Fl.* Apr. May. baccæ rubræ acidæ Jul. *Vis.* Refrigerans. *Uſ.* Culinaris varius, ad ſepes humiliores. *fl.* Apibus.
2) *Nigrum*, (ſchwarze J. Bocksbeere, Gichtbeere.) inerme racemis piloſis, floribus oblongis. *Loc.* Hortis, vineis. *Fl.* Apr. May. Baccæ ſubacidæ nigr. Jul. *Vis.* Anodyna, pellens, diuretica, puri-

purificans. *Uſ.* Ad ſepes, topiariis, Bob. capr. ovibus pabulum.

3) *Groſſularia*, (gemeine Stachelbeere,) ramis aculeatis, petiolorum ciliis piloſis, baccis hirſutis. *Loc.* Hortis, vineis. *Fl.* Mart. Apr. Baccæ maturæ dulces ſapidæ eſculentæ. *Uſ.* Ad ſepes, topiariis, capr. equis pabulum.

88) HEDERA, (Epheu) Linn. G. 283.

Cal. *Involucr.* umbellæ ſimplic. minimum, multidentatum. *Perianth.* minimum quinquedentatum germen cingens.

Cor. *Petala* 5. oblonga, patentia, apicibus incurvis.

Stam. *Filam.* quinque, ſubulata, erecta, longitudine corollæ, *Anth.* baſi bifidæ, incumbentes.

Pist. *Germen* turbinatum, receptaculo cinctum. *Stylus* ſimplex, breviſſimus. *Stigma* ſimplex.

Per. *Bacca* globoſa, unilocularis.

Sem. quinque magna, gibba, inde angulata.

Spec. *Helix* (gemeiner E. Mauerewig, Immergrün, Wintergrün, Baumwinde,) foliis ovatis lobatisque. *Loc.* Silvis, ſepibus. *Fl.* Sept. *Vis*, Vulneraria, adſtring. baccar. *Uſ.* Topiariis & ad ambulacra tecta, muros defendendos, radicis lignum ſutoribus ad cultellos lævigandos: ovibus pabulum.

89) VITIS, (Weinſtock, Traubenſtock.) Linn. G. 284.

Cal. *Perianth.* quinquedentatum, minimum.

Cor. *Petala* quinque rudia, parva, caduca.

Stam. *Filam.* quinque, ſubulata, erecto-patentia, caduca. *Antheræ* ſimplices.

Pist. *Germ.* ovat. *Styl.* nullus. *Stigma* capitato-obtuſ.

Per. *Bacca* ſubrotunda, magna, unilocularis.

Sem. quinque, oſſea, turbinato-cordata, baſi contracta, ſemibilocularia.

Spec. Vinifera, (gemeine W. Weinrebe,) foliis lobatis ſinuatis nudis, palmato angulatis. (Cirrhus oppoſitifolius racemifero floriferus.) *Loc.* Orbis totus temperatus. *Fl.* Jun. Jul. *Vis.* Lubricans ſublaxans paſſularum acido dulcium ſuaviſſimarum eſculentarum. *Uſ.* Paſſular. officinalis; ad vinum, ſpirit. acetum. 90)

90) ILLECEBRUM, (Nagelkraut, Knorpelblume.) Linn. G. 290.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: quinquangulare: *foliolis* coloratis, acumin. apicib. diſtantib. perſiſtentibus.
COR. nulla?
STAM *Filam.* 5. capillaria, intra calycem. *Anth.* ſimplices.
PIST. *Germen* ovato-acutum, in *Stylum* brevem bifidum deſinens. *Stigma* ſimpl. obtuſum.
PER. *Capſula* ſubrotunda, utrinque acuminata, quinquevalvis, unilocularis, calyce tecta.
SEM. unicum, ſubrotundum, utrinq. acutum. maximum.
SPEC. *Verticillatum*, (quirlförmiges N.) floribus verticillatis nudis. caulibus procumbentibus.
Loc. Humidis, paſcuis.

91) THESIUM, (Leinblat) Linn. G. 292.

CAL. *Perianthium* monophyllum, turbinatum, perſiſtens, ſemiquinquefidum: *laciniis* ſemilanceolatis, erectis, obtuſis.
COR. nulla: niſi calycem interne coloratum dicas.
STAM. *Filam.* 5. ſubulata, baſi laciniarum calycis inſerta, calyce breviora. *Antheræ* ſubrotundæ.
PIST. *Germen* inferum, calycis baſi innatum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* craſſiuſculum, obtuſum.
PER. nullum. *Calyx* in fundo continet ſemen, nec dehiſcit.
SEM. unicum, ſubrotundum, tectum.
SPEC. *Linophyllon*, (gemeines L.) paniculata, foliata, foliis lineari lanceolatis. *Loc.* Siccis montoſis. *Fl.* Albicans. May. Jun,

(92) VINCA, (Sinngrün,) Linn. G. 295.)

CAL. *Perianth.* 5. partitum, erectum, acutum, perſiſtens.
COR. *Petalum* 1. hypocrateriforme. *Tubus* calyce longior, inferne cylindraceus, ſuperne latior, lineis 5. inſculptus: ore pentagono. *Limbus* horizontalis quinquepartitus: laciniis apici tubi adnatis, extrorſum latioribus, oblique truncatis.
STAM. *Filam.* 5. breviſſima, inflexa, retroflexa. *Anth.* membranaceæ, obtuſæ, erectæ, incurvæ, margine utrinque fariniferæ.
PIST. *Germina* duo, ſubrotunda, quibus ad latera *corpuſcula* duo ſubrotunda adjacent. *Stylus* utriſque

unus communis, cylindraceus, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo *inferius* orbiculatum, planum; *ſuperius* capitatum, concavum.

Per. *Folliculi* duo, teretes, longi, acuminati, erecti, univalves, longitudinaliter dehiſcentes.

Sem. numeroſa, oblonga, cylindracea, ſulcata.

Spec. *Minor*, (kleines Sinn-Inn-Wintergrün.) caulibus procumbent. foliis lanceolato ovatis, floribus pedunculatis. *Loc.* Sepibus dumetis. *Fl.* Cærul. May. Jun. *Vis.* Pellens, adſtringens, vulneraria.

PENTANDRIA, *Ordo II.* DIGYNIA.

93) APOCYNUM, (Hundskohl,) Linn. G. 305.

Cal. *Perianth.* monophyllum, ſemiquinquefidum, erectum, acutum, minimum, perſiſtens.

Cor. *Petal.* 1. campanulat. ſubrotund. ſemiquinquefidum, *laciniis* revolutis. *Nectar.* corpuſculis 5. ovalibus, germen ambientibus.

Stam. *Filam.* 5. vix viſibilia. *Anth.* 5. oblongæ, erectæ, acutæ, baſi bifidæ, conniventes.

Pist. *Germina* duo, ovata. *Styli* vix ulli. *Stigmata* globoſa, germine fere majora.

Per. *Folliculi* 2. longi, acuminati, univalves, unilocular.

Sem. numeroſa, minima, pappo longo coronata. *Receptac.* ſubulatum, longiſſimum, aſperum, liberum.

Spec. *Cannabinum*, (Hanfförmiger G.) caule rectinſculo herbaceo, fol. oblongis paniculis terminalibus. *Loc.* Virginia Canada, & hortis Eur. *Fl.* Viridi-albicans Jul. *Uſ.* Americani caulibus & e lana ſeminum uti e cannabi & Lino trahunt fila, texunt pannos variaque veſtimenta; qualia in noſtris etiam regionibus ab hac planta jam ſunt præparata.

94) ASCLEPIAS (Aeſculapiſche Pfl. Aſclepiade.) Linn. G. 306.

Cal. *Perianth.* 5fidum, acutum, minimum, perſiſtens.

Cor. *Petal.* 1. planum, vel reflexum, 5partitum: *laciniis* ovato-acuminatis, leviter cum ſole flexis. *Nectaria* 5. cingentia genitalia, quorum ſingula ex ova-

ovato-oblique extrorſum aurita, è fundo corniculum acutum, verſus genitalia inflexum.

Corpuſculum truncat. genitalia tegit, ſquamis 5. ad latera, obvolutum, dehiſcens ad latera totidem rimis.

STAM. *Filam.* vix ulla. *Anth.* 5. corpuſculo truncato nectarii intra ſquamas inſertæ, acutæ.

PIST. *Germina* duo, ovata, acuminata. *Styli* vix ulli. *Stigmata* ſimplicia.

PER. *Folliculi* duo, magni, oblongi, acuminati, ventricoſi, uniloculares, univalves.

SEM. numeroſa, imbricata, pappo coronata. *Receptaculum membranaceum, liberum.*

SPEC. 1) *Syriaca*, (Seidenpflanze,) fol. ovalibus ſubtus tomentoſ. caule ſimpliciſſimo, umbellis nutantibus. *Loc.* Cultis, hortis Europæ, Syria. *Uſ.* Pappo ſ. lana ſeminum ſericei panni veſtimentaque varia præparata ſunt Berolini inſtitutione cel. Gledifch.

2) *Vincetoxicum*, (Schwalbenwurz,) fol. ovatis baſi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis, lacteſcens. *Loc.* Glareoſis, ſilvis. *Fl.* Alb. May. Jun. *Vis.* Rad. pellens, ſudorifera, diuretica, vomitor. ſuſpecta. Fol. vulnerar. *Uſ.* Lana ſeminum uti Aſclep. ſiriac. ad ſericam confert. *Uſ.* Capr. pab. & planta gelu tacta editur ab equis; Pappus pro fomite.

95) CHENOPODIUM (Gänſefus,) Linn. G. 309.

CAL. *Perianth.* pentaphyll. concavum, perſiſtens: *laciniis* ovatis, concavis, margine membranaceis,

COR. nulla.

STAM. *Filam.* 5. ſubulata, calycis foliis oppoſita, eorumque longitudine. *Anth.* ſubrotundæ, didymæ.

PIST. *Germen* orbiculatum. *Stylus* bipartitus, brevis. *Stigmata* obtuſa.

PER. nullum. *Calyx* clauſus, pentagonus, quinquangularis, compreſſus deciduus.

SEM. unicum, orbiculare, depreſſum.

OBS. *In quibuſdam ſpeciebus* Stylus trifidus *obſervatur.*

SPEC. 1) *Bonus Heinricus*, (guter Heinrich, wilder Spinat, Schmerbel, Lämmerohren,) foliis triangulari ſagittatis integerrimis, ſpicis compoſitis aphyllis. *Loc.* Saxoſis, ruderatis, ad rivulos.

vulos. *Fl.* May. Jun. *Vis.* Vulnerar. humectans refrigerans, anodyna. *Uſ.* Turionum more aſparagi; capr. ovib. pabulum.

2) *Album*, (weiſſer G. wilde Melde) fol. rhomboideo triangularibus eroſis poſtice integris ſummis oblongis, racemis erectis. *Loc.* Agris. *Fl.* Jun. *Uſ.* Ad olera inſtar Lapathi.

96) BETA (Mangold) Linn. G. 310.

CAL. *Perianth.* pentaphyll. concavum, perſiſtens: *laciniis* ovato-oblongis, obtuſis.

COR. nulla.

STAM. *Filam.* 5. ſubulata, calycis foliis oppoſita, eorumque longitudine. *Antheræ* ſubrotundæ.

PIST. *Germen* quodamodo infra receptaculum. *Styli* duo, breviſſimi, erecti. *Stigmata* acuta.

PER. *Capſula* intra fundum calycis, unilocularis, decidua.

SEM. unicum, reniforme, compreſſum, calyce involut.

SPEC. *Vulgaris* (gemeiner M.) caule erecto, fol. triangular. petiolatis, rubra vel lutea. *Loc.* Hortis Eur. *Fl.* Jun. *Vis.* Diluens, humectans, emolliens. *Uſ.* Ad olera.

97) ULMUS, (Ulmbaum,) Linn. G. 316.

CAL. *Perianth.* monophyllum, turbinat. rugoſum. *Limbus* 5fidus, erectus, interne coloratus, perſiſtens.

COR. nulla.

STAM. *Filam.* 5. ſubulata, calyce duplo longiora. *Antheræ* quadriſulcæ, erectæ, breves.

PIST. *Germ.* orbiculat. erectum. *Styli* duo, ſtaminibus breviores, reflexi, *Stigmata* pubeſcentia.

PER. Drupa ovalis, magna, exſucca compreſſo-membranacea.

SEM. unicum, ſubrotundum, leviter compreſſum.

SPEC. *Campeſtris*, (Feld U. Rüſter, Fliegen-Leim Ruſtbaum Stein-rauchlinde, Iſpenholz,) fol. duplicato ſerratis, baſi inæqualibus; fructu membranaceo. *Loc.* Silvis. *Fl.* Mart. Apr. *Vis.* Fol. adſtringens, vulneraria, anodyna. *Uſ.* Pecor. bob. capr. ovib. equis, ſuibus, pabul. folia, & ſemina avibus; Lignum ſero corrumpens ſubflavum, tenax ſculptoribus, ſcriniariis, ad carinas navium, ciſtas ſepulchrales magnatum, volvu-

los

los linteorum, cochleas prelonum, ad ciſtas pulchriores, ad axes, rotas molendinarias, ad ambulacra gratiſſima ob ſuavem comam.

98) GENTIANA, (Enzia) Linn. G. 322.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, acutum: *laciniis* oblongis, perſiſtentibus.

COR. *Petalum* 1. inferne tubulatum, imperforatum, ſuperne quinquefidum, planum, marceſcens, figurâ variâ.

STAM. *Filamenta* quinque, ſubulata, corollâ breviora. *Antheræ* ſimplices.

PIST. *Germen* oblongum, cylindraceum, longitudine ſtaminum. *Styli* nulli. *Stigmata* duo ovata.

PER. *Capſula* oblonga, teres, acuminata, apice leviter bifida, unilocularis, bivalvis.

SEM. numeroſa, parva. *Receptaculâ* duo, ſingula valvulæ longitudinaliter adnata.

OBS. Fructus figura *conſtans eſt.* Floris *autem* numerus, & figura *valde variat in diverſis ſpeciebus.*
Species *ſunt, quæ quintam partem numeri in flore exclud.*
Species *eſt, quæ tres partes numeri in flore addit.*
Species *alia corollæ collo patente;* alia *collo villis clauſo;* alia *laciniis corollæ ciliatis;* alia *limbo campanulato, erecto, plicato;* alia *limbo ſtellato; lacinulis laciniis interjectis;* alia *campanulata;* alia *infundibuliformi gaudet corolla. &c.*

SPEC. 1) *Lutea*, (gelber E. Bitterwurz,) corollis ſfidis, rotatis, verticillatis, calycibus ſpathaceis. *Loc.* Alpibus montibus. *Fl.* Jul. Aug. *Vis.* Balſamica, tonica, ſtomachica, antiverminoſa; amariſſima.

2) *Centaurium*, (Fieberkraut, Erdgalle Tauſendguldenkraut,) corollis ſfidis infundibulif. caule dichotomo fol. lineari lanceolatis. *Loc.* Apricis, ſilvis. *Fl.* Rubr. flavus Jun. Sept. *Vis.* Tonica balſam. ſtomachica, amariſſima, antifebrilis; bobus pabulum.

99) ERYNGIUM (Manstreu,) Linn. G. 324.

CAL. *Receptaculum commune* conicum, *paleis* floſculos ſeſſiles diſtinguentibus.
Involucrum receptaculi polyphyllum, planum, floſculos ſuperans.

Peri-

Perianth. proprium pentaphyllum, erectum, acutum, corollam ſuperans, germini inſidens.

Cor. *univerſalis* uniformis, ſubrotunda: Floſculi omnes fertiles. Propria pentapetala.

Petala quinque, oblonga, apicibus ad baſin inflexis, lineâ longitudinali conſtricta.

Stam. *Filamenta* quinque capillaria, recta, floſculos ſuperantia. *Antheræ* oblongæ.

Pist. *Germ.* hiſpidum, inferum. *Styli* duo, filiformes, recti, longitudine ſtaminum. *Stigmata* ſimplicia.

Per. *Fructus* ovatus, bifariam diviſibilis.

Sem. oblonga, teretia.

Obs. *in* aliis *ſpeciebus Semina è cruſta Pericarpii deponuntur*, *in* aliis *incluſa perſiſtunt.*

Spec. *Campeſtre*, (Feld M. Ellend, Raden-Breckendiſtel,) fol. amplexicaul. pinnato-laciniatis. *Loc.* Incultis. *Fl.* Jun. *Vis.* Diuretica, pellens, aperiens.

100) SANICULA, (Sanickel) Linn. G. 316.

Cal. *Umbella univerſalis* radiis pauciſſimis (4. ſæpe): *partialis* plurimis, confertis, ſubcapitatis.

Involucrum univerſale dimidiatum, extrorſum ſitum: *partiale* undique ambiens, floſculis brevius.

Perianthium vix notabile.

Cor. *univerſalis* uniformis: *propria* petalis quinque, compreſſis, inflexis, bifidis.

Stam. *Filamenta* quinque, ſimplicia, corollulis duplo longiora, erecta. *Antheræ* ſubrotundæ.

Pist. *Germen* hiſpidum, infra receptaculum proprium. *Styli* duo ſubulati, reflexi. *Stigmata* acuta.

Per. nullum. *Fructus* ovato-acutus, ſcaber, bipartibilis.

Sem. duo, hinc convexa, ſcabra, inde plana.

Spec. *Europæa*, (europäiſ. S.) fol. radical. ſimplicibus, floſculis omnibus ſeſſilibus. *Loc.* Silvis montoſis. *Fl.* Jun. Jul. *Vis.* Reſolvens, adſtringens, vulneraria.

101) ASTRANTIA, (Aſtranz) Linn. G. 327.

Cal. *Umbella univerſalis* radiis pauciſſimis (tribus ſæpe): *partialis* numeroſiſſimis.

Involucrum univerſale foliolis ad radios duplicatis: *partiale* foliolis circiter viginti lanceolatis, patentibus,

tibus, æqualibus, coloratis, umbellulâ longioribus. *Perianthium proprium* quinquedentatum, acutum, erectum, perſiſtens.

Cor. *univerſ.* uniformis: Floſculi radii abortivi. *Propria* petalis 5. erectis, inflexo bifidis.

Stam. *Filamenta* quinque, ſimplicia, longitudine corollulæ. *Antheræ* ſimplices.

Pist. *Germen* oblongum, inferum. *Styli* duo, erecti, filiformes. *Stigmata* ſimplicia, patentia.

Per. *Fructus* ovatus, obtuſus, coronatus, ſtriatus, bipartibilis.

Sem. 2. ovato-oblonga, pericarpii cruſta tecta, rugoſa.

Spec. *Maior*, (groſſe A. weiblicher Sanickel, ſchwarzer Meiſterwurz) fol. 5.lobis, trifidis lobis. *Loc.* Alpibus. *Fl.* Jul. Aug. *Vis.* Purgans radicis minor Helleboro.

102) BUPLEURUM (Haaſenöhrle) Linn.G.328.

Cal. *Umbella univerſ.* radiis quam decem paucioribus: *partialis* radiis vix decem, erecto-patens. *Involucrum univerſale* polyphillum: *partiale* pentaphyllum, maius: *foliolis* patentibus, ovatis, acutis. *Perianthium proprium* vix notabile.

Cor. *univerſ.* uniformis: floſculi omnes fertiles, *propria* petalis 5. involutis integris, breviſſimis.

Stam. *Filamenta* 5. ſimplicia. *Antheræ* ſubrotundæ.

Pist. *Germen* inferum. *Styli* duo, reflexi, parvi. *Stigmata* minima.

Per. nullum. *Fructus* ſubrotundus, compreſſus, ſtriatus, bipartibilis.

Sem. duo, ovato-oblonga, hinc convexa, ſtriata, inde plana.

Obs. Speciebus plerisque involucellata ſpecioſa corollulam ſæpe ſuperantia.

Spec. *Rotundifolium* (Durchwachs,) involucris univerſalibus nullis, foliis perfoliatis. *Loc.* Inter ſegetes, arvis. *Fl.* Jul. *Vis.* Subadſtringens, vulneraria.

103) TORDYLIUM, (Drehkraut, Zirmet,) Linn. G. 330.

Cal. *Umbella univerſalis* inæqualis, multiplex: *partialis* inæqualis, multiplex, breviſſima, plana.

In-

Involucrum universale foliolis tenuibus, indivisis, longitudine sæpius umbellæ: *partiale* dimidiatum, extrorsum umbellulâ longius. Perianth. proprium 5. dentatum.

Cor. *universalis* difformis, radiata: flosculi omnes fertiles, *propria disci* petalis 5. inflexo-cordatis, æqualibus: *propr. radii* consimilis, sed extimo petalo maximo, bipartito.

Stam. omnibus. *Filam.* 5. capillaria. *Anth.* simplices,

Pist. omnibus. *Germen* subrotund. inferum. *Styli* duo parvi. *Stigmata* obtusa.

Per. *Fructus* suborbiculatus, compressus, margine crenulatus, bipartibilis.

Sem. duo, subrotunda, fere plana, *margine* elevato, crenulato.

Spec. *Anthriscus.* (Bettelläuse, Hecken-Schaf-Körfel,) umbellis confertis, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis. *Loc.* Dumetis, arvis ruderatis. *Fl.* Jul. *Us.* Ovibus pab. fol.

103) CAUCALIS, (Klettenkärbel, Ackerklee,) Linn. G. 331.

Cal. *Umbella universalis* inæqualis, radiorum paucissimorum.

Partialis inæqualis, radiis copiosior, quorum quinque exteriores majores.

Involucrum universale foliolis numero radiorum, indivisis, lanceolatis margine membranaceis, ovatis, brevibus: *partiale* foliolis consimilibus, radiis longioribus, sæpius quinis. *Perianth.* proprium 5dentatum, exsertum.

Cor. *universalis* difformis, radiata: flosculi disci abortivi *propria disci* mas: parva, petalis 5. inflexo-cordatis, æqualibus: *prop. radii* hermaphrodita, petalis 5. inflexo-cordatis, inæqualibus, extimo maximo, bifido.

Stam. omnibus. *Filamenta* 5. capillaria. *Anth.* parvæ.

Pist. *radii Germen* oblongum, scabrum, inferum. *Styli* duo, subulati. *Stigmata* duo, patentia, obtusa.

Per. *Fructus* ovato-oblongus, striis longitudinalibus, setulis rigidis hispidus.

Sem. duo, oblonga, hinc convexa, subulatis acuminibus secundum strias armata, hinc plana.

Spec.

Spec. *Grandiflora* (Grosblumige Haftdolde,) involucris pentaphyllis, folio unico duplo maiore: *Loc.* Inter segetes arvis. *Fl.* Albus Aug.

105) DAUCUS, (Möhre, Vogelneft.) Lin. G. 333.

Cal. *Umbella univerſ.* multiplex, florens plana, fructifera concavo connivens: *partial.* multipl. conſimilis. *Involucrum univerſale* polyphyllum, longitudine umbellæ: *foliolis* linearibus, pinnatifidis: *partiale* ſimplicius; longitudine umbellulæ.
Perianthium proprium vix manifeſtum.
Cor. *univerſalis* inæqualis: radiata, floſculi diſci abortivi: *propria* petalis quinque inflexo-cordatis, exterioribus majoribus.
Stam. *Filam.* quinque, capillaria. *Antheræ* ſimplices.
Pist. *Germen* inferum, parvum. *Styli* duo, reflexi. *Stigmata* obtuſa.
Per. nullum. *Fructus* ovatus, ſæpe undique pilis rigidis hiſpidus, bipartibilis.
Sem. duo, ſubovata, hinc convexa, hiſpida, inde plana.
Spec. *Carota*, (wilde M. V. Mohrrüben.) ſeminibus hiſpidis, petiolis ſubtus nervoſis, rad. alba. *Loc.* Campis exaridis. *Paſtinaca* ſativa tenuifolia, radice lutea, (gelbe Rüben, Möhren,) varietas a D. carota; *Loc.* Agris, hortis. *Fl.* Utrorumque Jun. Jul. *Vis.* Seminis diluens, carminativa, diuretica pellens; ſuccus ad cancrum & ulcera. *Uſ.* Rad. nutriens loco panis; bob. capr. ovib. equis pabul. floſculi umbellæ rubro tinctoriæ: *ſativi* culinaris *uſ.* ad olera, acetaria.

106) CONIUM, (Schierling, Tollkraut,) Lin. G. 336.

Cal. *Umbella univerſalis* radiis pluribus patentibus: *partialis* conſimilis.
Involucrum univerſale polyphyllum, breviſſimum inæquale: *partiale* conſimile.
Perianthium proprium vix notabile.
Cor. *univerſalis* uniformis: *propria* petalis quinque, inflexo-cordatis, inæqualibus.
Stam. *Filam.* quinque, ſimplicia. *Anth.* ſubrotundæ.
Pist. *Germ.* inferum. *Styli* 2. reflexi. *Stigm.* obtuſa.
Per. nullum. *Fructus* ſubgloboſus, ſ. ſtriatus, ſtriis coreatus, bipartibilis.

SEM. duo, hinc convexa, fere hemisphærica, striata, inde plana.

SPEC. *Maculatum*, (gefleckter S. Tolkörfel.) seminibus striatis, cicuta major vulgaris. *Loc.* Cultis, agris, ruderatis, sepibus, ad aquas. *Fl.* Alb. Jun. *Vis.* Narcotica, stupefaciens; graveolens, venenata; ad Ill. Stoerk experimenta proficua imprimis in cancro, tumore.

107) ATHAMANTA, (Vogelneſt) Linn. G. 338.

CAL. *Umbella univers.* multipl. patens: *partialis* parcior. *Involucrum universale* polyphyllum, lineare, radiis paulo brevius: *partiale* lineare, radiis æqualibus. *Perianthium proprium* obsoletum.

COR. *universalis* uniformis: *propria* petalis quinque, inflexo-cordatis, parum inæqualibus.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, longitudine corollæ. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* 2. distantes. *Stigm.* obtusa.

PER. nullum. *Fructus* ovato-oblong. striatus, bipartibilis.

SEM. duo; ovata, hinc convexa, striata, inde plana.

SPEC. 1) *Cervaria*; (Hirschwurzel, grose Bergpetersilien, schwarzer Enzian,) foliolis pinnatis decussatis, inciso-angulatis, seminibus nudis. *Loc.* Montosis. *Fl.* Aug. *Vis.* Aromatica.

2) *Oreoselinum*, (kleine Bergpetersilie, Grundheil,) foliolis diuaricatis ovato acutis, acute serratis & incisis. *Loc.* Pratis montanis, collibus apricis. *Fl.* Aug. *Vis.* Aromatica.

108) PEUCEDANUM, (Harstrang) Linn. G. 339.

CAL. *Umbella universalis* multiplex, longissima, tenuis: *partial.* patens. *Involucrum universale* polyphyllum, lineare, parvum, reflexum; *partiale* minus. *Perianthium proprium* quinquedentatum, minimum.

COR. *universalis* uniformis: flosculi disci abortivi: *propria* petalis quinque, æqualibus, oblongis, incurvis, integris.

STAM. *Filamenta* 5. capillaria. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* oblongum, inferum. *Styli* duo parvi. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum. *Fructus* ovatus, alâ cinctus, utrinque striatus, bipartibilis.

SEM.

Sem. 2. ovato-oblonga, compreſſa, hinc convexiora; ſtriis 3. elevatis notata, margine membranâ latâ integrâ cincta, apice emarginata.

Obs. *Floſculi centrales ſæpe abortiunt.*

Spec. *Officinale* (gewöhnliche Sau-fenchel, Schwefelwurz,) fol. quinquies tripartitis filiformibus; linearib. *Loc.* Pratis pinguibus, montoſis. *Fl.* Jul. *Vis.* Radic. reſolvens, nervina, ſtomachica, diuretica: ſtimulans, vulneraria.

109) LASERPITIUM, (Laſerkraut) Linn. G. 344.

Cal. *Umbella univerſalis* maxima, radiorum 20. ad 40. *partialis* radiis plurimis, plana.
Involucrum univerſale polyphyllum, parvum: *partiale* polyphyllum, parvum.
Perianthium proprium quinquedentatum, obſoletum.

Cor. *univerſalis* uniformis: floſculi omnes fertiles; *propria* petalis quinque, inflexo-cordatis, ſubæqualibus patentibus.

Stam. *Filamenta* quinque, ſetoſa, longitudine corollæ. *Antheræ* ſimplices.

Pist. *Germen* ſubrotund. inferum. *Styli* duo, craſſiuſculi acuminati, diſtantes. *Stigmata* obtuſa, patentia.

Per. nullum. *Fructus* oblongus, octo membranis longitudinalibus angulatus, bipartibilis.

Sem. duo, maxima, oblonga, ſemi-cylindracea, hinc plana, inde margine & dorſo membranis (ſimul quatuor) inſtructa.

Spec. *Latifolium*, (breitblätriges L.) foliolis cordatis incifo-ſerratis. *Loc.* Nemoribus ſiccis. *Fl.* Jul. *Vis.* Reſolvens, diuretica, ſtimulans, ſtomachica, aromat. *Uſ.* Bob. capr. ovib. eqnis. pab.

110) HERACLEUM, (Porſt, Heilkraut,) Linn. G. 345.

Cal. *Umbella univerſ.* multipl. maxima. *partialis* plana. *Involucr. univerſ.* polyphyll. caducum. *partiale* extrorſum dimidiatum: *foliolis* tribus ad ſeptem lineari-lanceolatis, *exterioribus* longioribus.
Perianthium vix manifeſtum.

Cor. *univerſalis* difformis, radiata: floſculi fertiles plerumque omnes. *Propria diſci* æqualis, pentapetala: *petalis* inflexo-uncinatis emarginatis: *propr. radii*

dii inæqualis, pentapetala, *petalis* exterioribus majoribus, magisque bifidis, oblongis, uncinatis.
STAM. *Filamenta* ς. corollulis longiora. *Anth.* parvæ.
PIST. *Germen* subovatum, inferum. *Styli* duo approximati, breves. *Stigmata* simplicia.
PER. nullum. *Fructus* ellipticus, compressus, emarginatus, in medio utrinque striatus.
SEM. duo, ovata, compresso-foliacea.
OBS. Heraclei speciebus aliis *flosculi radiantes feminei fertiles sunt*; *disci mares abortientes, stigmatibus destituti.* Sphondylium *hermaphroditum est ubique, & involucrum interdum deficit omne.*

SPEC. *Sphondylium*, (teutsche unächte Bärenklauwurz, Heilkraut,) fol. pinnatifidis, hirsutum. *Loc.* Nemorosis pratis. *Fl.* Alb. rubellus May. *Vis.* Radic. suaveol. aperiens, incidens, laxans. *Us.* In Sibiria ad spiritum: bob. capr. ovib. equis, suibus, leporibus pabul.

111) LIGUSTICUM, (Liebstöckel) Lin. G. 346.

CAL. *Umbella univers.* multiplex: *partialis* multiplex. *Involucrum universale* membranaceum heptaphyllum, inæquale: *partiale* vix tetraphyllum, membranaceum. *Perianthium proprium* quinquedentatum obsoletum.
COR. *universalis* uniformis flosculi omnes fertiles; *propria* petalis quinque, æqualibus, planis, introrsum carinatis.
STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, corollâ breviora. *Antheræ* simplices.
PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo, approximati. *Stigmata* simplicia.
PER. nullum. *Fructus* oblongus, angulat. ς. sulcatus, bipartibilis.
SEM. duo, oblonga, glabra, hinc striis quinque elevatis notata, inde plana.

SPEC. *Levisticum*, (gemeine L.) fol. multiplicibus, foliolis superne incisis. *Loc.* Hortis Eur. *Fl.* Jun. *Vis.* Rad. carminat. pellens, stimulans, acris. *Us.* Folia suaveolentia vaccis pabul. quorum lac & caro suaveolet ab hoc pabulo.

112) ANGELICA (Brust-Engelwurz) Lin. G. 347.

CAL. *Umbella universalis* multiplex, subrotunda: *partialis* florens exacte globosa, *In-*

Involucrum universale tri-vel-pentaphyllum, parvum: *partiale* parvum, octophyllum.
Perianthium proprium 5dentatum, vix notabile.
Cor. *universalis* uniformis, flosculi omnes fertiles: *partialis* petalis quinque, lanceolatis, planiusculis, incurvis, caducis.
Stam. *Filamenta* quinque, simplicia, corollâ longiora. *Antheræ* simplices.
Pist. *Germen* inferum. *Styli* 2. reflexi. *Stigm.* obtusa.
Per. nullum. *Fructus* subrotundus, angulatus, solidus, bipartibilis.
Sem. duo, ovata, hinc plana, margine cincta, inde convexa, tribus lineis exarata.
Spec. *Silvestris*, (Wald E. wilde Wasser-Wiesen Angelic. kleine wilde Brustwurz) fol. æqualib. ovato lanceolatis serratis. *Loc.* Subhumidis silvaticis. *Fl.* Jul. Aug. *Vis.* Resolvens, sudorifera, carminativa, pellens, acris subaromatica. *Us.* Pecor. bob. capr. porcis pabul.

113) SIUM, (Wassermerk) Linn. G. 348.

Cal. *Umbella universalis* varia in diversis: *partialis* patens, plana.
Involucrum universale polyphyllum, reflexum, umbella brevius: *foliolis* lanceolatis: *partiale* polyphyllum, lineare, parvum.
Perianthium proprium vix notabile.
Cor. *universalis* uniformis: flosculi omnes fertiles *propria* petalis quinque, inflexo-cordatis, æqualibus.
Stam. *Filamenta* 5. simplicia. *Antheræ* simplices.
Pist. *Germen* minimum, inferum. *Styli* duo reflexi. *Stigmata* obtusa.
Per. nullum. *Fructus* ovato-subrotundus, striatus, parvus, bipartibilis.
Sem. 2. subrotunda, hinc convexa, striata, inde plana.
Spec. *Latifolium* (breitblätriger W. Wasserfroschseppich.) fol. pinnatis, umbellis terminalibus. *Loc.* Rivulis, fossis. *Fl.* Aug. *Vis.* Noxia radic. Aug. effossæ hominibus & pecoribus.

114) OENANTHE, (Rebendolde) Linn. G. 352.

Cal. *Umbella universalis* radiis paucioribus, *partialis* rad. pluribus brevissimis. *Involucrum universale* polyphill. simplex, umbella brevius, *partiale* polyphyll. parvum.

Perianthium proprium quinquedentatum, perſiſtens.
Cor. *univerſalis* difformis, floſculi radii abortivi: *propria* ſubæqualis, petalis 5. acuminatis, inflexo-cordatis, hermaphroditis.
Stam. *Filamenta* quinque, capillaria, corolla longiora ſimplicia. *Antheræ* ſubrotundæ.
Pist. *Germen* inferum. *Styli* duo, ſubulati, erecti, perſiſtentes. *Stigmata* obtuſa.
Per. nullum. *Fructus* ſubovatus, glaber, coronatus perianthio & piſtillis, bipartibilis.
Sem. duo, ovata, convexa, ſtriata, plana dentata.
Spec. *Crocata* (ſafrangelbe R.) foliis omnibus multifidis obtuſis ſubæqualibus. *Loc.* Paludoſis. *Fl.* Jul. Jun. *Vis* Rad. impletæ ſucco acido croceo, & folior: venenata hominibus. *Uſ.* Ovibus pabulum.

115) PHELLANDRIUM, (Pferde-Saamen,) Linn. G. 353.

Cal. *Umbella univerſalis* multiplex: *partialis* conſimilis. *Involucrum univerſale* nullum: *partiale* heptaphyllum: *foliolis* acutis, longitudine umbellulæ.
Perianthium proprium, quinquedentatum, germini inſidens, perſiſtens.
Cor. *univerſalis* fere uniformis: floſculi omnes fertiles: *propria* inæqualis, *petalis* quinque acuminatis, cordato-inflexis.
Stam. *Filamenta* quinque, capillaria, corollâ longiora. *Antheræ* ſubrotundæ.
Pist. *Germen* inferum. *Styli* duo, ſubulati, erecti, perſiſtentes. *Stigmata* obtuſa.
Per. nullum. *Fructus* ovatus, glaber, coronatus perianthio & piſtillis, bipartibilis.
Sem. duo, ovata, glabra.
Spec. *Aquaticum*, (Waſſer Pf. S. Wüzerling,) foliorum ramificationibus divaricatis. *Loc.* Foſſis. *Fl.* Jun.-Sept. *Uſ.* Capris, ovib. equis, ſuibus pabulum.

116) CICUTA (Wüterich,) Linn. G. 354.

Cal. *Umbella univerſalis* ſubrotunda, radiis plurimis, æqualibus: *partialis* ſubrotunda, radiis plurimis, æqualibus, ſetaceis.
Involucrum univerſale nullum: *partiale* polyphyllum *folio-*

foliolis ſetoſis, brevibus. *Perianthium proprium* vix notabile.

Cor. *univerſalis* uniformis: floſc. fertil. *propria* petalis quinque, ovatis, inflexis, fere æqualibus.

Stam. *Filamenta* quinque, capillaria, corollâ longiora. *Antheræ* ſimplices.

Pist. *Germen* inferum. *Styli* duo, filiformes, corollâ longiores, perſiſtentes. *Stigmata* capitata.

Per. nullum. *Fruct.* ſubovatus, ſtriato-ſulcat. bipartibilis.

Sem. duo, ſubovata, hinc convexa, ſtriata, inde plana.

Spec. *Viroſa*, aquatica, (giftiger W.) umbellis oppoſitifoliis, petiolis marginatis obtuſis. *Loc.* Paludibus ſterilib. *Fl.* Jul. Aug. *Vis.* Narcotica, repellens; acris, ſeptica. *Uſ.* Capr. ovib. equis pabul. bobus lethalis.

117) AETHUSA, (Gleiſſe) Linn. G. 355.

Cal. *Umbella univerſalis* patens, *radiis* interioribus gradatim brevioribus, intimis breviſſimis: *partialis* parva, patens.

Involucrum univerſale nullum: *partiale* dimidiatum, extus poſitum: *foliolis* tribus vel quinque longiſſimis, linearibus, pendulis.

Perianthium proprium vix notabile.

Cor. *uniuerſalis* fere uniformis: *partialis* petalis quinque, inflexo-cordatis, inæqualibus,

Stam. *Filamenta* 5. ſimplicia. *Antheræ* ſubrotundæ.

Pist. *Germ.* inferum. *Styli* 2. reflexi. *Stigmata* obtuſa.

Per. nullum. *Fructus* ex ovato ſubrotundus, ſtriatus, bipartibilis.

Sem. 2. ſubrotunda, ſtriata, inde ad tertiam partem plana.

Spec. *Cynapium*, (G. kleiner Schierling, Hundspeterlein,) cicuta minor, petroſelino ſimilis. *Loc.* Hortis inter olera: ſepes. *Fl.* Jun. Jul. *Vis.* Cum conio maculato eadem, ſed debilior. Animalibus non tam noxia quam hominibus.

118) CORIANDRUM, (Coriander) Linn. G. 356.

Cal. *Umbella univerſalis* radiis paucis: *partialis* radiis pluribus.

Involucrum univerſale vix monophyllum: *partiale* triphyllum, dimidiatum, linearc.

Perianthium proprium quinquedentatum, exſertum.

Cor. *universalis* difformis, radiata floſculi diſci abortivi: *propria diſci* hermaphrodita *petalis* quinque inflexo-cordatis, æqualibus: *propr. radii* hermaphrodita, *petalis* quinque inflexo-cordatis, inæqualibus, quorum *extimum* maximum, bipartitum, lateralia vero proxima lacinia maxima gaudent.
Stam. *Filam.* 5. ſimplicia. *Antheræ* ſubrotundæ.
Pist. *Germen* inferum. *Styli* duo, parvi, diſtantes. *Stigmata* radii capitata.
Per. nullum. *Fructus* ſphæricus, bipartibilis.
Sem. duo, hemiſphærica, concava.
Spec. *Sativum* maius, (E. Schwindelkörner) fructibus globoſis. *Loc.* Agris. *Fl.* Jun. *Vis.* Carminativa, lactifuga; *Uſ.* flor. apibus: ſemina ad talpas.

119) SCANDIX (Kerbel) Linn. G. 357.

Cal. *Umbella universalis* longa, *radiis* paucis: *partialis* copioſior.
Involucrum universale nullum: *partiale* pentaphyllum, longitudine umbellulæ.
Perianthium proprium vix notabile.
Cor. *universalis* difformis, radiata, *floſculi* abortivi in diſco: *propria* petalis 5. cordato-inflexis, *intimis* minoribus, *extimo* majori.
Stam. *Filam.* 5. capillaria. *Antheræ* ſubrotundæ.
Pist. *Germen* oblongum, inferum. *Styli* duo, ſubulati, longitudine minimi petali, erecti, perſiſtentes. *Stigmata* floſculis radiantibus obtuſa.
Per. nullum. *Fructus* oblongiſſimus, ſubul. bipartibilis.
Sem. duo, ſubulata, hinc convexa, ſulcata, inde plana.
Obs. Pectini veneris, ſemina *filiformia*, *baſi nucleum condentia*,
Cerefolio *Riv.* ſemina *ovato-ſubulata*, *ſtriata*. Involucrum *viride*, *perſiſtens*. Floſculi *omnes Hermaphroditi*.
Spec. 1) *Pecten veneris*, (nadel K.) ſeminibus lævibus, roſtro longiſſimo. *Loc.* Inter ſegetes. *Fl.* May.
2) *Cerefolium*, ſativum chærefolium, chærophyllum, (Garten K. Kerbel-Körfelkraut,) ſeminibus nitidis ovato-ſubulatis, umbellis ſeſſilibus lateralibus. *Loc.* Hortis; agris. *Fl.* May. *Vis.* Antiphlogiſtica, diuretica, aromatica, aperiens, diſcu-

discutiens, resolvens, pectoralis. *Us.* Ad olera, et iuscula, quæ fiunt sapidiora: bob. capr. ovib. pabul.

120) CHÆROPHYLLUM, (Kälberkropf, Kern,) Linn. G. 358.

Cal. *Umbella universalis* patens: *partialis* radiorum numero fere par.
Involucrum universale nullum: *partiale* sub pentaphyllum: *foliolis* lanceolatis, concavis, reflexis, longitudine fere umbellulæ.
Perianthium proprium vix notabile.
Cor. *universalis* fere uniformis: flosculi disci abort. *propria* petalis quinque: inflexo-cordatis, mucrone inflexo, planiusculis. *exterioribus* paulo majoribus.
Stam. *Filamenta* quinque, simplicia, longitudine umbellulæ. *Antheræ* subrotundæ.
Pist. *Germen* inferum. *Styli* 2. reflexi. *Stigm.* obtusa.
Per. nullum. *Fructus* ovato-oblongus, acuminatus, lævis, bipartibilis.
Sem. duo, oblonga, superne attenuata, hinc convexa, inde plana.
Obs. semina disci sæpe abortiunt.
Spec. *Silvestre*, (wilder K. Körbel, Scheere) caule striato geniculis tumidiusculis, flosc. omnib. fertilibus. *Loc.* Cultis pomariis, pratis. *Fl.* Apr. May. *Vis.* Subvenenata, amaricans, subfoetida. *Us.* Flores viridi & umbella luteo-tinctoria: flor. apibus.

121) PASTINACA, (Bastinac,) Linn. G. 362.

Cal. *Umbella unniversf.* multipl. plana: *partialis* multipl.
Involucrum universale nullum: *partiale* nullum.
Perianthium proprium vix notabile.
Cor. *universalis* uniformis, flosc. omnes fertiles: *propria* petalis 5. lanceolatis, involutis, integris.
Stam. *Filamenta* 5. capillaria. *Antheræ* subrotundæ.
Pist. *Germ.* inferum. *Styli* 2. reflexi. *Stigm.* obtusa.
Per. nullum. *Fructus* compresso-planus, ellipticus, bipartibilis.
Sem. 2. elliptica, margine cincta, utrinque fere plana.
Spec. *Sativa*, (zahme P) foliis simpliciter pinnatis. *Loc.* Ruderatis, pascuis hortis. *Fl.* Iul. *Vis.*

Diluens, nutriens, humectans, aromatica: semen carminativum. *Us.* Culinaris.

122) ANETHUM, (Dill) Linn. G. 364.

CAL. *Umbella univers.* multiplex: *partialis* multiplex. *Involucrum universale* nullum: *partiale* nullum. *Perianthium proprium* vix notabile.

COR. *universalis* uniformis: *propria* petalis quinque, lanceolatis, incurvis.

STAM. *Filamenta* 5. capillaria. *Antherae* subrotundae.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo approximati obsoleti. *Stigmata* obtusa.

PER. nullum. *Fructus* fere ovatus, compressus, striatus, bipartibilis.

SEM. duo, fere ovata marginata, hinc convexa, striata, inde plana.

OBS. Anethi *T. Semina margine membranaceo cincta sunt.* Fœniculi *T. Semina margine membranaceo destituta sunt.*

SPEC. 1) *Graveolens*, (gemeiner D. riechender D. Dillkraut,) hortense, fructibus compressis. *Loc.* Hortis. *Fl.* Jul. *Vis.* Discutiens, carminativa, foetida. *Us.* Herbae culinar. ad cucumer. acetaria.

2) *Foeniculum*, (Fenchel,) fructibus ovatis, vulgare germanicum. *Loc.* Hortis. *Fl.* Jul. *Vis.* Resolvens, pellens, aperiens, carminativa, aromatica. *Us.* Culinaris, & apibus.

123) CARUM, (Kümmel) Linn. G. 365.

CAL. *Umbella universalis* longa, *radiis* decem, saepius inaequalibus: *partialis* conferta.

Involucrum universale saepe monophyllum: *partiale* nullum. *Perianthium* vix manifestum.

COR. *universalis* uniformis flosc. disci abortivi: *propria* inaequalis, *petalis* quinque, inaequalibus, inflexo apice, cordatis.

STAM. *Filamenta* quinque capillaria, longitudine corollae. caduca *Antherae* subrotundae, minimae.

PIST. *Germ.* inferum. *Styli* 2. minimi. *Stigm.* simplicia.

PER. nullum. *Fructus* ovato-oblongus, striatus, bipartibilis.

SEM. duo, hinc convexa, ovato-oblonga, striata, inde plana.

SPEC. *Carvi* (gemeiner wilder Feld-Wiesen-Weg-

spei-

ſpeiſekümmel, Carve.) pratenſe officinarum, involucro monophyllo. *Loc.* in pratis. *Fl.* Apr.-Jun. *Vis.* Rad. reſolvens, aromatica, ſemen carminativum, acre. *Uſ.* In juſculis, pane, pulte, ſpirituque frumenti pro condimento adhibetur: bob. capr. ovib. equis, ſuibus pabul. & apibus.

124) PIMPINELLA (Pimpinelle) Linn. G. 366.

CAL. *Umbella univerſalis* radiis pluribus: *partialis* radiis adhuc pluribus.
Involucrum univerſale nullum: *partiale* nullum.
Perianthium proprium vix notabile.
COR. *univerſalis* ſub uniformis: floſc. omnes fertil. *propria* petalis 5. inflexo-cordatis, ſub-æqualibus.
STAM. *Filamenta* quinque, ſimplicia, corollula longiora. *Antheræ* ſubrotundæ.
PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo, breviſſimi. *Stigmata* ſub-globoſa.
PER. nullum. *Fructus* ovato-oblongus, bipartibilis.
SEM. duo, oblonga, verſus apicem anguſtiora, hinc convexa, ſtriata, inde plana.
SPEC. *Saxifraga*, (Stein-Peterlein, Pimpinelle, Bibernel,) foliis pinnatis, foliolis radicalibus, ſubrotundis, ſummis linearib. *Loc.* Paſcuis ſiccis, montoſis. *Fl.* Jul-Sept. *Vis.* Pellens, reſolvens, ſtomachica, carminativa, aromatica, herbæ & radic. acris. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis, ſuibus pabulum.

125) APIUM, (Peterlein, Eppich,) Linn. G. 367.

CAL. *Umbella univerſalis* radiis paucioribus: *partialis* radiis pluribus.
Involucrum univerſale parvum, unico vel pluribus foliolis: *partiale* conſimile.
Perianthium proprium vix notabile.
COR. *univerſalis* uniformis: floſc. fere omnes fertil. *propria* petalis ſubrotundis, inflexis, æqualibus.
STAM. *Filam.* quinque ſimplicia. *Anth.* ſubrotundæ.
PIST. *Germen* inferum. *Styli* 2. reflexi. *Stigm.* obtuſa.
PER. nullum. *Fructus* ovatus, ſtriatus, bipartibilis.
SEM. duo, ovata, hinc ſtriata, inde plana.
SPEC. 1) *Petroſelinum*, (Peterſilge, Peterling,) folio-

foliolis caulinis linearibus, involucellis minutis, hortenſe. *Loc.* Hortis Eur. *Vis.* Reſolvens, aperiens, pellens, acris rad. aromatica, nutriens, diuretica. *Uſ.* Culinaris, ad olera.

2) *Graveolens*, (ſtarkriechender P.) foliolis caulinis, cuneiformib. umbellis ſeſſilibus: (dulce celleri Italonum, Zellery,) *Loc.* Europ. paludes, & hortis dulce. *Fl.* Jun. Jul. *Vis.* Carminativa, pellens, ſudorifera, diuretica, aperiens, rad. nutriens. *Uſ.* Culinaris ad juſcula, olera, acetaria.

126) ÆGOPODIUM, (Gerſch, Jeſſel,) Lin. G. 368.

CAL. *Umbella univerſalis* multiplex, convexa: *partialis* conſimilis, plana.
Involucrum univerſale nullum: *partiale* nullum.
Perianthium proprium vix notabile.

COR. *univerſ.* uniformis: floſculi fertiles *propr.* petalis quinque, ovatis, concavis, inflexis apice, æqualibus.

STAM. *Filamenta* quinque ſimplicia corolla duplo longiora. *Antheræ* ſubrotundæ.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo ſimplices, erecti, longitudine corollulæ. *Stigmata* capitata.

PER. nullum. *Fructus* ovato-oblongus, ſtriatus, bipartibil.

SEM. duo, ovato-oblonga, hinc convexa, ſtriata, inde plana.

SPEC. *Podagraria*, (Geisfus, J. Hinfus, Strenzel, Zipperleins-Kraut, kleine wilde Angelic,) foliis caulinis ſummis ternatis, Angelica ſylveſtris minor. *Loc.* Ad ſepes, prata inque pomariis. *Fl.* May. Jun. *Uſ.* Foliorum junior: ad olera: Bob. capr. ovib. equis, ſuibus pabul.

PENTANDRIA III. TRIGYNIA.

127) VIBURNUM, (Mehl-Schlingbaum Schwelken,) Linn. G. 370.

CAL. *Perianthium* quinquedentatum, ſuperum, minimum, perſiſtens.

COR. monopetala campanulata, ſemiquinquefida: *laciniis* obtuſis, reflexis.

STAM. *Filamenta* quinque, ſubulata, corollæ longitudine. *Antheræ* ſubrotundæ.

PIST.

PIST. *Germen* ſubrotundum, inferum. *Stylus* nullus, cujus loco Glandula turbinata. *Stigmata* tria, obtuſa.
PER. *Bacca* ſubrotunda, unilocularis.
SEM. unicum, oſſeum, compreſſum, ſtriatum.

SPEC. 1) *Lantana*, (gemeiner M. S. Holderhetteln,) foliis cordatis ſerratis venoſis ſubtus tomentoſis. *Loc.* In ſepibus argilloſis. *Fl.* May. *Vis.* Refrigerans, adſtringens, tonica folior. & baccarum.

2) *Opulus*, (Waſſer-Hirſch-Holder Hollunder, roth Schieſsbeerholz, wilde Schneeballen, Caninchen-Beere,) foliis lobatis, petiolis glanduloſis, flore ſimplici, paluſtris. *Loc.* Pratis humidiuſculis, ſepibus. *Fl.* Fœtid May. Jun. *Uſ.* Ad aggeres & apibus flor. baccæ avibus pab.

3) Aquatica flore globoſo pleno (Schneeballen, Hirſchholder,) *Loc.* Hortis Eur. *Fl.* Alb. ornamentum hortorum May. Jun.

128) SAMBUCUS, (Hollunder,) Linn. G. 372.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, ſuperum, minimum, perſiſtens.
COR. *Monopetala* rotato-concavum, ſemiquinquefida, obtuſa, *laciniis* reflexis.
STAM. *Filamenta* quinque, ſubulata, longitudine corollæ. *Antheræ* ſubrotundæ.
PIST. *Germen* ovatum, obtuſum, inferum. *Stylus* nullus, cujus loco Glandula ventricoſa. *Stigmata* tria, obtuſa.
PER. *Bacca* ſubrotunda, unilocularis.
SEM. tria, hinc convexa, inde angulata.

SPEC. 1) *Ebulus*, (Attich,) humilis, cymis trifidis, ſtipulis foliaceis, caule herbaceo. *Loc.* Silvis. *Fl.* Jul. *Vis.* Anodina, pellens, diſcutiens, ſudorifera, diuretica, draſtica; acris. *Uſ.* Fol. ad mures; baccæ violaceo tinctoriæ: lignum dutum flavum tornatoribus loco buxi.

2) *Nigra*, (ſchwarzer Hollunder, Holder, Fliederbaum, Schibicken, Quebecken,) Cymis quinquepartitis, caule arboreo, ramoſo, flor. umbellatis. *Loc.* In ſepibus. *Fl.* Odoratus, Jun. *Vis.* Fol. baccarum eadem cum ſamb. ebulo cort. adſtring. flor. diaphoretica expellens, diſcutiens.

129) ALSINE, (Hünerdarm, Vogelkraut,) Linn. G. 380.

CAL. *Perianth.* pentaphyll. foliol. concavis, oblongis, acuminatis.
COR. *Petala* 5. æqualia, calyce longiora.
STAM. *Filam.* 5. capillaria. *Anth.* ſubrotundæ.
PIST. *Germen* ſubovat. *Styli* tres filiformes. *Stigmata* obtuſa.
PER. *Capſul.* ovata, unilocularis, calyce tecta.
SEM. plurima ſubrotunda.
SPEC. *Media*, (gemeine H. V.) petalis bipartitis, foliis ovato cordatis. *Loc.* Cultis, ad muros. *Fl.* Febr.-Apr. *Vis* Refrigerans, humectans, vulneraria. *Uſ.* Fol. ad olera: avibus pab. & flores apibus.

PENTANDRIA IV. TETRAGYNIA.

130) PARNASSIA, (Einblatt) Linn. G. 384.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: *laciniis* oblongis, acutis, patentibus, perſiſtentibus.
COR. *Petala* quinque, ſubrotunda, emarginata, ſtriata, concava, patentia.
Nectaria 5, *ſingulum* ſquama cordata, concava, ſtylis 13. per marginem gradatim altioribus inſtructa, quibus ſingulis globus inſidet.
STAM. *Filamenta* quinque, ſubulata, longitudine corollæ. *Antheræ* depreſſæ, incumbentes.
PIST. *Germen* ovatum, magnum. *Stylus* nullus cuius loco foramen. *Stigmata* quatuor, obtuſa, perſiſtentia, in fructu majora.
PER. *Capſula* tetragono-ovata, unilocularis, quadrivalvis. *Receptac.* quadruplex, valvulis adnatum.
SEM. plurima, oblonga.
OBS. Eſſentialis character *e Nectario facillime colligitur.*
SPEC. *Paluſtris*, (Sumpf E. Waſſer-Leberblume, weiſſe Herrenblume,) gramen Parnaſſi, ſimplici flore. *Loc.* Pratis ſubhumidis. *Fl.* Alb. Aug. Sept. *Uſ.* Flor. apibus, herba capris ovibus equis pabulum.

PEN-

PENTANDRIA V. PENTAGYNIA.

(mit fünf Staubwegen.)

132) LINUM, (Lein, Flachs,) Linn. G. 389.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, lanceolatum, erectum, parvum, perſiſtens.

COR. infundibuliformis. *Petala* 5. oblonga, ſuperne ſenſim latiora, obtuſa, magna.

STAM. *Filamenta* quinque, ſubulata, erecta, longitudine calycis. *Antheræ* ſimplices, ſagittatæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* 5. filiformes, erecti, longitudine ſtaminum. *Stigmata* ſimplicia, reflexa.

PER. *Capſula* globoſa, rude pentagona decemlocularis, quinquevalvis.

SEM. ſolitaria, ovato-planiuſcula, acuminata, glabra.

SPEC. 1) *Uſitatiſſimum*, (gewöhnl. F.) calycibus capſulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule ſubſolitario. *Loc.* Cultis, agris. *Fl.* Jun. *Vis.* Semin. relaxans, emolliens, leniens. *Uſ.* Ad linteamina, veſtimenta &c.

2) *Catharcticum*, (Purgierfl. L.) fol. oppoſitis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. *Loc.* Montoſis, paſcuis, pratis, ſilvis. *Fl.* May-Jul. *Vis.* Purgans, emetica, amara. *Uſ.* Capr. ovib. equis pabul.

133) DROSERA, (Sonnenthau,) Linn. G. 391.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, acutum, erectum, perſiſtens.

COR. infundibuliformis. *Petala* quinque, ſubovata, obtuſa, calyce paulo majora.

STAM. *Filamenta* quinque, ſubulata, longitudine calycis. *Antheræ* parvæ.

PIST. *Germen* ſubrotundum. *Styli* quinque, ſimplices, longitudine ſtaminum. *Stigmata* ſimplicia.

PER. *Capſula* ſubovata, unilocularis, apice 5. valvis.

SEM. plurima, minima, ſubovata.

SPEC. *Rotundifolia*, (rundblätriger S. Gideon,) ſcapis radicatis, foliis orbiculatis. *Loc.* Paludoſis. *Fl.* Ovibus noxius Jun. *Vis.* Corrodens, ſuſpecta.

PEN-

PENTANDRIA VI. POLYGYNIA.

134) MYOSURUS, (Mäuſeſchwänzgen) Linn. G. 394.

CAL. *Perianth.* pentaphyllum: *foliolis* ſemilanceolatis, obtuſis, reflexis, ſupra baſin annexis, colorat. deciduis.
COR. *Petala* quinque, calyce breviora, minutiſſima, baſi tubulata, oblique introrſum aperta.
STAM. *Filamenta* quinque, longitudine calycis. *Antheræ* oblongæ, erectæ.
PIST. *Germ.* numeroſa, receptaculo in formam conico-oblongam inſidentia. *Styli* nulli. *Stigm.* ſimplicia.
PER. nullum. *Receptaculum* longiſſimum, ſtyliforme, ſeminibus imbricatim diſpoſitis tectum.
SEM. numeroſa, oblonga, acuminata.
OBS. Numerus ſtaminum *in hocce genere valde variat.* Myoſuri *ſumma eſt affinitas cum* Ranunculo.
SPEC. Minimus, (klein M.) foliis integerrimis.
Loc. Apricis, collibus.

Claſſis IV.

HEXANDRIA, (Mit 6 Staubfäden.)

Ordo I.

MONOGYNIA, (Mit einem Staubwege.)

135) LEUCOJUM, (weiſſer Veil, Knotenblume,) Linn. G. 402.

CAL. *Spatha* oblonga, obtuſa, compreſſa, latere plano dehiſcens, marceſcens.
COR. campaniformi-patens. *Petala* 6. ovata, plana, baſi coalita, *apicibus* craſſiuſculis, ſtrictioribus.
STAM. *Filam.* ſex, ſetacea, breviſſima. *Antheræ* oblongæ, obtuſæ, quadrangulares, erectæ, diſtantes.
PIST. *Germen* ſubrotundum, inferum. *Stylus* clavatus, obtuſus. *Stigma* ſetaceum, erectum, acutum, ſtaminibus longius.
PER. *Capſula* turbinata, trilocularis, trivalvis.
SEM. plura, ſubrotunda.
SPEC. *Vernum*, (Frühlings w. V. Schneemerzenglöckle,)

glöckle,) ſpatha uniflora, ſtylo clavato, bulboſum vulgare. *Loc.* Umbroſis, pratis, ad rivulos. *Fl.* Apr. *Vis.* Radic. emetica, diſcutiens.

136) NARCISSUS, (Narciſſe.) Linn. G. 403.

CAL. *Spatha* oblonga, obtuſa, compreſſa, latere plano dehiſcens, marceſcens.

COR. *Nectarium* monophyllum, cylindraceo-infundibuliforme, limbo coloratum.
Petala ſex, ovata, acuminata, plana, tubo nectarii externe ſupra baſin inſerta.

STAM. *Filamenta* ſex, ſubulata, tubo nectarii affixa, nectario breviora. *Antheræ* oblongiuſculæ.

PIST. *Germen* ſubrotundum, obtuſe triquetrum, inferum. *Stylus* filiformis, ſtaminibus longior. *Stigma* trifidum, concavum, obtuſum.

PER. *Capſula* ſubrotunda, obtuſe trigona, trilocularis, trivalvis.

SEM. plura, globoſa, appendiculata.

SPEC. 1) *Poeticus* (poetiſche N.) ſpatha uniflora, nectario rotato breviſſimo ſcarioſo crenulato; medio purpureus multiplex. *Loc.* Hortis, vineis Europ. *Flores* Albi. ſuaveolentes May.

2) *Pſeudo* N. (unächte N.) ſpatha uniflora, nectario campanulato erecto criſpo æquante petala ovata, calyce luteo. *Loc.* Hortis & vineis. *Fl.* May.

3) *Bicolor*, (zweyfarbige N.) ſpatha uniflora, nectario companulato, margine patulo criſpo æquante petala: calyce flavo. *Loc.* Hortis vineis Eur. *Fl.* May.

4) *Tazetta*, ſpatha multiflora, nectario campanulato truncato breviore petalis, foliis planis medio luteus. *Loc.* Hortis Eur. *Fl.* Odoratus Jun. & tempore hyemali in hipocauſtis ſola aqua creſcunt.

5) *Ionquilla*, (Jonquille,) ſpatha multiflora, nectario hemiſphærico, breviore petalis, foliis crenato ſemiteretibus; luteus minor. *Loc.* Hortis Eur. *Fl.* Jun.

137) ALLIUM (Knoblauch.) Linn. G. 409.

CAL. *Spatha* communis, ſubrotunda, marceſcens.

COR. *Petala* ſex, oblonga.

STAM. *Filamenta* ſex, ſubulata, longitudine corollæ. *Antheræ* oblongæ, erectæ.

PIST. *Germen* ſuperum, breve, trigonum, angulis linea inſculptis. *Stylus* ſimplex. *Stigma* acutum.

PER. *Capſula* breviſſima, lata, triloba, trilocularis, trivalvis.

SEM. plura, ſubrotunda.

OBS. Stamina alterna, tria in quibusdam ſpeciebus lata, bifurcata *Antheræ* intermedia, 1-4, 10-12, 14, 16, 21, 23, 24.

SPEC 1) *Porrum* (zahmer Lauch,) caule planifolio umbellifero, ſtaminibus tricuſpidatis, radice tunicata. *Loc.* Hortis. *Fl.* Jun. Jul. *Uſ.* Culinaris, in condimentum.

2) *Vineale* (Weinbergs K. Hundelauch, rother K.) caule teretifolio bulbifero, ſtaminibus tricuſpidatis. *Loc.* Cultis, vineis. *Fl.* Jul. *Uſ.* Culinar. & ad talpas, mures.

3) *Cepa*, (Sommer-Zwiebel,) ſcapo nudo inferne ventricoſo longiore, foliis teretibus. *Loc.* Hortis Eur. *Fl.* Jul. *Uſ.* Culinar.

4) *Schoenopraſum* (Schnitt-Gras-Lauch,) ſcapo nudo folia adæquante, foliis teretibus ſubulato filiformibus. *Loc.* Hortis Eur. *Uſ.* Culin.

138) LILIUM (Egen, Lilie) Linn. G. 410.

CAL. nullus.

COR. hexapetala, campanulata, inferne anguſtata. *Petala* ſex, erecta, incumbentia, dorſo obtuſe carinata, ſenſim patentiora, latiora: *apicibus* obtuſis, craſſis, reclinatis.

Nectarium linea longitudinalis, tubuloſa, petalis ſingulis a baſin ad medium inſculpta.

STAM. *Filamenta* ſex, ſubulata, erecta, corolla breviora. *Antheræ* oblongæ, incumbentes.

PIST. *Germen* oblongum, cylindraceum, ſex ſulcis ſtriatum. *Stylus* cylindraceus, longitudine corollæ. *Stigma* craſſiuſculum, triangulare.

PER. *Capſula* oblonga, ſex ſulcata exarata, *apice* cavo, trigono, obtuſo: trilocularis, trivalvis: *valvulis* crinulo cancellatim intertexto connexis.

SEM. numeroſa, gemino ordine incumbentia, plana, extrorſum ſemi-orbiculata.

OBS.

Obs. Nectarium *in aliis barbatum eſt, in aliis imberbe.* Petala *in aliis totaliter revoluta, in aliis non item.*

Spec. 1) *Candidum*, (weiſſe L.) foliis ſparſis, corollis campanulatis, intus glabris. *Loc.* Hortis Eur. *Fl.* Alb. odoratus. Jul. *Vis.* Emolliens, anodyna, *Uſ.* Apibus.

2) *Bulbiferum* (Feuer L. I.) fol. ſparſ. coroll. campanul. intus ſcabris: purpureo croceum plenum. *Loc.* Hort. *Fl.* Jul. apibus.

3) *Martagon*, (türkiſcher Bund, rothe Berglilien, falſche Goldwurzel.) fol. verticillatis, florib. reflexis, coroll. revolutis. *Loc.* Montoſis, hortis. *Fl.* Jul. odoratus. apibus.

139) TULIPA (Tulpe) Linn. G. 415.

Cal. nullus.

Cor. campanulata. *Petala* ſex, ovato-oblonga, concava, erecta.

Stam. *Filamenta* ſex, ſubulata, breviſſima. *Antheræ* quadrangulæ, oblongæ, erectæ, diſtantes.

Pist. *Germen* magnum, oblongum, trigono-teres. *Stylus* nullus. *Stigma* trilobum, triangulare: *angulis* protuberantibus, bifidis, perſiſtens.

Per. *Capſula* triquetra, trilocularis, trivalvis: *valvulis* margine ciliatis, ovatis.

Sem. plurima, plana, gemino ordine incumbentia, ſemicircularia, floccis conformibus diſtincta.

Spec. *Gesneriana* Gesner. T.) flor. erecto, fol. ovato-lanceolatis. *Loc.* Hortis Eur. *Fl.* Variegatus Apr. May.

140) ORNITHOGALUM, (Vogelmilch) L. G. 418.

Cal. nullus.

Cor. *Petala* ſex, lanceolata, infra medium erecta, ſupra medium plano-patentia, perſiſtentia, colorem dimittentia.

Stam. *Filamenta* ſex, erecta, baſi dilatata, corolla breviora. *Antheræ* ſimplices.

Pist. *Germen* angulatum. *Stylus* ſubulatus, perſiſtens. *Stigma* obtuſum.

Per. *Capſula* ſubrotunda, angulata, trilocularis, trivalvis.

Sem. plura, ſubrotunda.

Obs. Filamenta *in aliis plana, erecta, alterna apice tri-*

fido, media lacinia antheram ſuſtinente; in aliis alterna ſimplicia.

Spec. 1) *Luteum*, (gelbe V. Acker-Feld-Zwiebel) ſcapo anguloſo diphyllo, pedunculis umbellatis ſimplic. *Loc.* Cultis, ſepibus, hortis. *Fl.* Mart. Apr. *Uſ.* In annonæ penuria, loco panis.

2) *Minimum*, (kleine V.) ſcapo angulato, diphyllo, pedunculis umbellatis ramoſis. *Loc.* Cultis oleraceis. *Fl.* Mart.

141) ASPHODELUS, (Affodill,) Linn. G. 421.

Cal. nullus.

Cor. monopetala, ſexpartita: *laciniis* lanceolatis, planis, patentibus.

Nectarium valvulis ſex, minimis, conniventibus in globum, baſi corollæ inſertis.

Stam. *Filamenta* ſex, ſubulata, valvulis nectarii inſerta, arcuata, *alterna* breviora. *Antheræ* oblongæ, incumbentes, aſſurgentes.

Pist. *Germen* ſubrotundum, intra nectarium. *Stylus* ſubulatus, ſitu ſtaminum. *Stigma* truncatum.

Per. *Capſula* globoſa, carnoſa, triloba, trilocularis.

Sem. plura triangularia, hinc gibba.

Obs. Filamenta *in aliis declinata, in aliis extrorſum arcuata ſunt.*

Spec. *Ramoſus*, (äſtiger A.) caule nudo, foliis enſiformibus carinatis lævibus. *Loc.* Silvis. *Fl.* Albus May.

142) ANTHERICUM (Zaunblume,) Lin. G. 422.

Cal. nullus.

Cor. hexapetala, patentiſſima, oblonga, obtuſa.

Stam. *Filamenta* ſex ſubulata, erecta. *Antheræ* parvæ, incumbentes, quadriſulcæ.

Pist. *Germen* obſolete trigonum. *Stylus* ſimplex, longitudine ſtaminum. *Stigma* obtuſum, trigonum.

Per. *Capſula* ovata, glabra, triſulca, trilocularis, trivalvis.

Sem. numeroſa, angulata.

Obs. Spec. variæ gaudent filamentis lanatis 7-12, in aliis petala non decidunt 12, 13.

Spec. *Ramoſum*, (äſtige Z. Spinnenkraut, weiſſer Wiederthon,) foliis planis, ſcapo ramoſo, corollis planis, piſtillo recto. *Loc.* In rupibus calcareis, ſilvis. *Fl.* Jun. Jul.

143) ASPARAGUS (Spargel) Linn. G. 424.

CAL. nullus. COR. *Petala* ſex, unguibus cohærentia, oblonga, in tubum erecta, interiora tria alterna, apice reflexa perſiſtentia.

STAM. *Filam.* ſex, filiformia, petalis inſerta, erecta, corolla breviora. *Antheræ* ſubrotundæ.

PIST. *Germen* turbinatum, trigonum. *Stylus* breviſſimus. *Stigma* punctum prominens.

PER. *Bacca* globoſa, puncto umbilicata, trilocularis.

SEM. bina, rotunda, introrſum angulata, glabra.

OBS. *Qui florem dicit monopetalum, ſalvo jure poſſit. Corollæ figura differens eſt in diverſis: aliis erecta, aliis plana, aliis revoluta; Flos pendulus piſtillo licet breviſſimo.*

SPEC. *Officinalis* (gewöhnlicher S.) caule herbaceo tereti erecto, foliis ſetaceis, ſtipulis paribus: ſativa (zahmer S.) ſylveſtris, (wilder) tenuiſſimo folio. *Loc.* cultis, vineis, hortis. *Fl.* May. Jun. *Vis.* Humectans, diuretica, aperiens. *Uſ.* Culinar. turionum eſculentorum: apibus flores.

144) CONVALLARIA (Mayblume,) Lin. G. 425.

CAL. nullus. COR. campanulata, monopetala, glabra. *Limbus* ſexfidus, obtuſus, patenti-reflexus.

STAM. *Filamenta* ſex, ſubulata, petalo inſerta, corolla breviora. *Antheræ* oblongæ, erectæ.

PIST. *Germen* globoſum. *Stylus* filiformis, ſtaminibus longior. *Stigma* obtuſum trigonum.

PER. *Bacca* globoſa, trilocularis, ante maturitatem maculata. SEM. ſolitaria, ſubrotunda.

OBS. Bacca *immatura maculata notam præbet omnibus communem.*

α *quum corolla globoſo-campanulata, patens ſit.* 1.

β. *quum corolla tubulato-campanulata ſit.* 2. 3. 4.

γ. *quum unica tertia pars numeri in partibus fructificationis a vulgatiſſimo exemta ſit.* 8.

δ. *quum corolla ſexpartita patens, acutiſſima ſit.* 5. 6. 7.

SPEC. 1) *Maialis*, Lilium convallium, (M. May-Zaucken,) ſcapo nudo, corollis campanulatis. *Loc.* Silvis, hortis. *Fl.* Albus ſuaveolens, May. Jun. *Vis.* Narcotica, antiſpasmodica, errhina: fragrans. *Uſ.* Capris ovibus pabul.

2) *Polygonatum* ſigillum ſalomonis, (weis Schmink-Wurzel, Salomonsſiegel,) foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus

bus subunifloris. *Loc.* Silvis. *Fl.* May. *Vis.* Vulneraria, cosmetica: folior. errhina. *Uſ.* Rad. in annonæ penuria loco panis: turiones loco aſparagorum & flores apibus, herba capr. ovibus pabul.

3) *Biflora*, (zweyblätriger M. kleine M.) foliis cordatis. *Loc.* Pratis, ſilvis, montibus. *Fl.* May. Jun. *Uſ.* Apibus.

145) HYACINTHUS (Hyacinthe,) Lin. G. 427.

CAL. nullus.

COR. campanulata, monopetala. *Limbus* ſexfidus, reflexus.

Nectarium pori tres, melliferi, ad apicem germinis.

STAM. *Filamenta* ſex, ſubulata, breviora. *Antheræ* conniventes.

PIST. rotundo-trigonum, triſulcum. *Stylus* ſimplex, corolla brevior. *Stigma* obtuſum.

PER. *Capſula* ſubrotunda, triquetra, trilocularis, trivalv.

SEM. bina (ſæpius) ſubrotunda.

OBS. *Genus hocce naturale in plura non naturalia diſtribuerunt.*

α. Hyacinthus *T. quum tubus corollæ ſit tubul. oblongus.*

β Muſcari *T. quum corolla ſit fere globoſa.* 8-11.

γ Alii *corolla ſexpartita gaudent.* 1. 2. 3.

SPEC. 1) *Non ſcriptus*, (blauer H.) corollis campanulatis ſexpartitis, apice revolutis. *Loc.* Hortis Eur. Italiæ nemoribus. *Fl.* Cærul. odoratus May.

2) *Botryoides*, (Trauben H.) corollis globoſis uniformibus, foliis canaliculato-cylindricis ſtrictis. *Loc.* Montoſis, hortis. *Fl* May. Jun.

146) ACORUS (Calmus) Linn. G. 434.

CAL. Spadix cylindrac. ſimpliciſſimus, floſculis tectus, ſpatha nulla. *Perianth.* nullum: (niſi calycem dicas.

COR. *Petala* ſex, obtuſa, concava, laxa, ſuperne craſſiora, & fere truncata.

STAM. *Filam.* ſex, craſſiuſcula, corolla paulo longiora. *Anth.* craſſiuſculæ, didymæ, terminales, adnatæ.

PIST. *Germen* gibbum, oblongiuſculum, longitudine ſtaminum. *Stylus* nullus. *Stigma* punctum prominens.

PER. *Capſula* brevis, triangula, utrinque attenuata obtuſa, trilocularis.

SEM. ovato-oblonga, plura.

SPEC.

Spec. *Calamus*, (gemeiner E.) calamus aromaticus officinarum, radice tenuiore. *Loc.* Paludosis, fossis. *Vis.* Calefaciens, pellens, stomachica: aromatica, acris. *Us.* Radic. supplementum aromatum ex India.

147) JUNCUS (Binsen, Simmsen,) Lin. G. 437.

Cal. *Gluma* bivalvis.
Perianthium hexaphyllum: *foliolis* oblongis, acuminatis, persistentibus.
Cor. nulla: (nisi *Perianthium*, coloratum recens, corollam dicas.)
Stam. *Filam.* sex, capillaria, brevissima. *Anth.* oblongæ, erectæ, longitudine perianthii.
Pist. *Germ.* triquetrum, acuminatum. *Stylus* brevis, filiformis. *Stigmata* 3. longa, filiformia, villosa, inflexa.
Per. *Capsula* tecta, triquetra, unilocularis, trivalvis.
Sem. nonnulla, subrotunda.

Spec. 1) *Conglomeratus*, (glat rundköpfiger B.) culmo nudo stricto, capitulo laterali, lævis panicula non sparsa. *Loc.* Silvis. *Fl.* Jun. Jul. *Us.* corbibus nassis aptus & medulla ad ellychnia candelarum.

2) *Campestris*, (Feld B,) foliis planis subpilosis, spicis sessilibus pedunculatisque. *Loc.* Pascuis siccioribus, & paludosis montanis. *Fl.* Aug. *Us.* Ovibus pabulum.

148) BERBERIS (Sauerdorn, Erbsele) Lin. G. 442.

Cal. *Perianthium* hexaphyllum, patulum; *foliolis* ovatis, basi angustiore, concavis, alternis minoribus, coloratis, deciduis.
Cor. *Petala* sex, subrotunda, concava, erecto-patentia, calyce vix majora.
Nectarium corpuscula duo, subrotunda, colorata, basi singuli petali adnata.
Stam. *Filamenta* sex, erecta, compressa, obtusa. *Antheræ* duæ, filamentorum apici utrinque adnatæ.
Pist. *Germen* cylindraceum, longitudine staminum. *Stylus* nullus. *Stigma* orbiculatum, germine latius: margine acuto cinctum.
Per. *Bacca* cylindracea, obtusa, puncto umbilicata, unilocularis.
Sem. duo, oblonga, cylindracea, obtusa.

Spec. *Vulgaris*, (gem. S. Wein-Nägele-Schierling, Reiſelbeer, Eſſigdorn,) pedunculis racemoſis, ſpinis triplicibus. *Loc.* Silvis, ſepibus. *Fl.* Flavus irritabilis May. Jun. *Vis.* Baccar. refrigerans, antiputredinoſa, tonica: cortic purgans, adſtring. *Uſ.* Ad ſepes tonſiles: baccar. ad acetaria: & ſuccus cum alumine in aceto ſoluto, ad pigmentum rubrum; radix et cortex flavo tingens, inprimis coria: lignum flavum ſcrinariis tornatoribus, herba bobus capr. ovibus pabul. ſuccus baccar. loco pomor. citri ad potum Puntſum uſurpatur.

HEXANDRIA. Ord. III. TRIGYNIA.

149) RUMEX, (Ampfer) Linn. G. 451.

Cal. *Perianthium* triphyllum: *foliolis* obtuſis, reflexis, perſiſtentibus.

Cor. *Petala* tria, ovata, calyce majora, eique ſimilia, conniventia, perſiſtentia.

Stam. *Filamenta* ſex, capillaria, breviſſima. *Antheræ* erectæ, didymæ.

Pist. *Germen* turbinato-triquetrum. *Styli* tres, capillares, reflexi, inter rimas petalorum conniventium exſerti, *Stigmata* magna, laciniata.

Per. nullum. *Corolla* conniv. triquetra, includens ſemen.

Sem. unicum, triquetrum.

Spec. 1) *Acutus*, (A. ſpiziger Grindwurz, Hungerkr.) florib. hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, fol. cordato oblongis obtuſiuſculis crenulatis. *Loc.* Humidis, rivulis, viis. *Fl.* Jun. Aug. *Vis.* adſtringens. *Uſ.* Radicis flavo & viridi tinctorius.

2) *Acetoſa*, (Saurampfer, Säurling,) florib. dioicis, fol. oblongis ſagittatis. *Loc.* Paſcuis, pratis, hortis. *Fl.* Alb. Jun. Jul. *Vis.* Refrigerans, tonica; acido-auſtera. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis, ſuibus pabul. folia ad juſcula, olera: radix rubro-tinctoria.

3) *Acetoſella*, (kleiner Feld-Schaf-A.) florib. dioicis, fol. lanceolato-haſtatis. *Loc.* Pratis, arvis arenoſis. *Fl.* Alb. Jun. Jul. *Uſ.* Capr. ovib. equis, ſuibus pabulum.

TRI-

150) TRIGLOCHIN, (Krötengras,) Linn. G. 453.

CAL. *Perianthium* triphyllum: *foliolis* ſubrotundis, obtuſis, concavis, deciduis.
COR. *Petala* tria, ovata, concava. obtuſa, calyci ſimilia.
STAM. *Filamenta* ſex, vix notabilia. *Antheræ* totidem, corolla breviores.
PIST. *Germen* magnum. *Styli* nulli. *Stigmata* tria, vel duplo-plura, reflexa, plumoſa.
PER. *Capſula* ovato-oblonga, obtuſa; *loculi* tot quot ſtigmata, *valvulis* a baſi dehiſcentibus acutis.
SEM. ſolitaria, oblonga.

SPEC. *Paluſtre*, (Sumpf-K. Dreyzack, klein Binſengras, Salz-Binſe-Gras-Kraut,) capſulis trilocularibus ſublinearibus, fructu tenui. *Loc.* Inundatis uliginoſis. *Fl.* Aug. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis, ſuib. pabulum.

151) COLCHICUM, (Zeitloſe) Linn. G. 457.

CAL. nullus: (niſi Spathas vagas conſideres.)
COR. ſexpartita. *Tubus* angulatus, radicatus. *Limbi* laciniis lanceolato-ovatis, concavis, erectis.
STAM. *Filamenta* ſex, ſubulata, corolla breviora. *Antheræ* oblongæ, quadrivalves, incumbentes.
PIST. *Germen* intra radicem, ſepultum. *Styli* tres, filiformes, longitudine ſtaminum. *Stigmata* reflexa, canaliculata.
PER. *Capſula* triloba, introrſum ſutura connexa, obtuſa, trilocularis, ſuturis dehiſcentibus introrſum.
SEM. plura, ſubgloboſa, rugoſa.

SPEC. *Autumnale*, (Herbſt Z. Spinn-Lichtblume, Matſafran, nackende Hure,) foliis planis lanceolatis erectis. *Loc.* Succulentis, pratis, *Fl.* Subruber Aug. Sept. *Vis.* Narcotica, dementans, draſtica; acris: ad Ill. Stoerck experim. antihydropicum præcipuum. *Uſ.* Foliorum ſubrubro-tinctorius & ad pediculos pecorum.

HEXANDRIA Ord. V. POLYGYNIA.

152) ALISMA, (Froſchlöffel) Linn. G. 460.

CAL. *Perianthium* triphyllum: *foliolis* ovatis, concavis, perſiſtentibus.

Cor. *Petala* tria, ſubrotunda, magna, plana, patentiſſima.
Stam. *Filamenta* ſex, ſubulata, corolla breviora. *Antheræ* ſubrotundæ.
Pist. *Germina* plura quam quinque. *Styli* ſimplices. *Stigmata* obtuſa.
Per. *Capſulae*, compreſſæ.
Sem. ſolitaria, parva.
Spec. *Plantago aquatica*, (Waſſer-Wegerich, groſſer Froſchlöffel,) foliis ovatis acutis, fructibus obtuſe trigonis. *Loc.* Ripis, lacubius. *Fl.* Jul-Sept. *Uſ.* Capr. equis pabulum.

Claſſis VII.

HEPTANDRIA, (Mit 7 Staubfäden)

Ord. I. MONOGYNIA.

153) AESCULUS, (Roscaſtanie Keſten,) Linn. G. 462.

Cal. *Perianthium* monophyllum, tubuloſum, parvum, quinquedentatum.
Cor. *Petala* quinque, ſubrotunda, *margine* plicato undulata, plana, patentia, *unguibus* anguſtis, calyci inſertis, inæqualiter colorata.
Stam. *Filamenta* ſeptem, ſubulata, longitudine corollæ, declinata. *Antheræ* aſſurgentes.
Pist. *Germen* ſubrotundum, deſinens in *Stylum* ſubulatum. *Stigma* acuminatum.
Per. *Capſula* coriacea, ſubrotunda, trilocularis, trivalvis.
Sem. bina, ſubgloboſa.
Obs. Semen *communiter in capſula unicum occurrit: obſervatis autem embryonibus, numerum naturalem binarium eſſe conſtat.*
Spec. Hippo-caſtanum, (gemeine R. K.) floribus heptandris, folio multifido. *Loc.* Cultis, hortis Europ. ex Aſia. *Fl.* Alb. Jul. *Vis.* Fructus antiſeptica; ſuccedaneum cortic. Cinchonæ. *Uſ.* Herbæ pecor. pabul. & apib. flores.

Claſſis

Classis VIII.

OCTANDRIA (Mit acht Staubfäden.)

Ord. I. MONOGYNIA.

154) TROPÆOLUM, (Indianiſcher Kreſſe) Linn. G. 466.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, erecto-patulum, acutum, coloratum, deciduum: *laciniis* duabus inferioribus anguſtioribus; poſtice cornutum Nectario ſubulato, recto, longiore.

COR. *Petala* quinque, ſubrotunda, calycis diviſuris inſerta, quorum *duo ſuperiora* ſeſſilia, *reliqua inferiora* unguibus oblongis ciliatis inſerta.

STAM. *Filamenta* octo, ſubulata, brevia, declinata, inæqualia, *Antheræ* erectæ, oblongæ, quadriloculares, aſſurgentes.

PIST. *Germen* ſubrotundum, trilobum, ſtriatum. *Stylus* ſimplex, erectus, longitudine ſtaminum. *Stigma* trifidum, acutum.

PER. *Baccæ* tres, hinc convexæ, ſulcato ſtriatæ, inde angulatæ.

SEM. tria, hinc gibba, angulata, ſubrotunda, ſulcato-ſtriata.

SPEC. 1) *Minus*, (kleine K. Capucinerle,) foliis integris, petalis acuminato-ſetaceis; peltatis orbiculatis. *Loc.* Peru & hortis Eur. *Fl.* Flavus, Jun-Aug. apibus.

2) *Maius* (gröſſere K.) foliis ſubquinquelobis, petalis obtuſis, peltatis orbiculatis. *Loc.* Hortis Eur. *Fl.* Flav. Jul. *Vis.* Vulneraria, antiſcorbutica. *Uſ.* Culinaris ad acetaria: apib. flor. pabul.

155) EPILOBIUM, (Weiderich) Linn. G. 471.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum ſuperum: *foliolis* oblongis, acuminatis, coloratis, deciduis.

COR. *Petala* quatuor, ſubrotunda, extrorſum latiora, emarginata, patentia.

STAM. *Filamenta* octo, ſubulata, *alterna* breviora. *Antheræ* ovales, compreſſæ, obtuſæ.

PIST. *Germen* cylindraceum, longiſſimum, inferum. *Stylus* filiformis. *Stigma* quadrifidum, craſſum, obtuſum, revolutum.

PER.

PER. *Capſula* longiſſima, cylindracea, ſtriata, quadrilocularis, quadrivalvis.

SEM. numeroſa: oblonga, pappo coronata. *Receptaculum* longiſſimum, tetragonum, liberum, flexile, coloratum.

OBS. *in aliis* ſtamina & piſtillum *erecta*, *in aliis* declinata *ad latus*, *inferius*.

SPEC. 1) Hirſutum, (groſſer rauher zottiger W. Unholdenkraut) foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis decurrenti-amplexicaulibus: Lyſimachia purpurea. *Loc.* Humidiuſculis. *Fl.* Jul. Aug. *Uſ.* Pappus ſeminum loco bombycis: bob. capr. ovib. equis pabulum.

2) *Paluſtre* (Sumpf W. Unholdenkr. Torf W.) foliis oppoſitis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto. *Loc.* Humidiuſculis *Fl.* Aug. *Uſ.* Capr. ovib. equis pabulum.

156) VACCINIUM, (Heidelbeere) Linn. G. 483.

CAL. *Perianthium* minimum, ſuperum, perſiſtens.

COR. campanulata, monopetala, quadrifida: *laciniis* revolutis.

STAM. *Filamenta* octo, ſimplicia. *Antheræ* bicornes, dorſo ariſtis duabus patentibus inſtructæ, apice dehiſcentes.

PIST. *Germen* inferum. *Stylus* ſimplex, ſtaminibus longior. *Stigma* obtuſum.

PER. *Bacca* globoſa, umbilicata, quadrilocularis.

SEM. pauca, parva.

OBS. Numerus *ſæpe addit unicam quartam partem in omni parte fructificationis.* 1. 2. 6. 7. 8. *& ſæpe* 9.

Calyx *in pluribus quadrifidus, integerrimus in Myrtillo.*

SPEC. *Myrtillus*, (gemeine ſchwarze H. Beſinge, Gondel-Preuſel-Beere,) pedunculis unifloris, fol. ſerrat. ovatis deciduis, caule angulato. *Loc.* Silvis. *Fl.* May. Jun. *Vis.* Subrefrigerans, ſubadſtringens, acidula, baccarum. *Uſ.* Culinaris ad juſcula: baccarum cæruleo tinctorius inprimis ad coria.

157) ERICA, (Heide) Linn. G. 484.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* ovatis, erectis, coloratis perſiſtentibus.

COR.

Cor. *Petalum* unicum campanulat. quadrifidum, ſæpe ventricoſum.

Stam. *Filamenta* octo, capillaria, receptaculo affixa. *Antheræ* apice biſidæ.

Pist. Germen ſubrotundum. *Stylus* filiformis, rectus, ſtaminibus longior. *Stigma* coronulatum, tetragonum, quadrifidum.

Per. *Capſula* ſubrotunda, calyce minor, tecta, quadrilocularis, quadrivalvis.

Sem. numeroſa, minima.

Obs. *Dantur ſpecies calyce duplici.*

Spec. *Vulgaris*, (gemeine H.) antheris bicornibus incluſis, corollis inæqualibus campanulatis mediocribus, foliis oppoſitis ſagittatis. *Loc.* Sterilibus, ſilvis. *Fl.* Jul. Aug. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis pabul. & apibus; ad tegendas domos, ad ſtramina, generationem turfæ: ad cereviſiæ præparationem loco humuli in Anglia & Scotis ad molliſſimos lectos.

158) DAPHNE, (Daphne) Linn. G. 485.

Cal. nullus.

Cor. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindraceus, imperforatus, limbo longior. *Limbus* quadrifidus: *laciniis* ovatis, acutis, planis, patentibus.

Stam. *Filamenta* octo, brevia, tubo inſerta: *alterna* inferiora. *Antheræ* ſubrotundæ, erectæ, biloculares.

Pist. *Germen* ovatum. *Stylus* breviſſimus. *Stigma* capitatum, depreſſo-planum.

Per. *Bacca* ſubrotunda, unilocularis.

Sem. unicum, ſubrotundum, carnoſum.

Spec. *Mezereum*, (Kellerhals, Schall-Kraut, Seidel-Süs-Wolfs-Baſt, Bergpfeffer, Zeiland, Brennwurz,) floribus ſeſſilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Loc.* Silvis. *Fl.* Purpureus Febr. Mart. *Vis.* Corrodens, ſtimulans, vomitoria, acris. *Uſ.* Capr. ovib. pabul. ad pigmentum rubrum, baccæ lupis & vulpibus lethales.

OCTANDRIA. Ord. III. TRIGYNIA.

159) POLYGONUM, (Wegetritt, Knöterich,) Linn. G. 495.

Cal. *Perianth.* turbinatum, interne coloratum, 5-partitum, laciniis ovat. obtuſis, perſiſtentibus.

Cor.

Cor. nulla nisi calycem velis.
Stam. *Filamenta* octo, subulata, breviſſima. *Antheræ* subrotundæ, incumbentes.
Pist. *Germen* triquetrum. *Styli* sæpe tres, filiformes, breviſſimi. *Stigmata* simplicia.
Per. nullum. Calix semen involvens.
Sem. unicum, triquetrum, acutum.
Obs. stamina in nonnullis 6. 9. aliis 7. 12. aliis 5. 4. 6. 8. 10. 11. pistillum in quibusdam bifidum, 4. 5. 6. 9. 10. 12. 13.

Spec. 1) *Bistorta*, (Natter-Krebswurz,) caule simpliciſſimo, monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Loc.* Montosis, pratis. *Fl.* May. *Vis.* Adstringens, stiptica radic. *Usſ.* Bob. capr. ovib. pabul. suibus herba & cum vitriolo atro tinctorius; apibus flores.

2) *Perſicaria*, (Flökraut, Pferſichkraut, Vöttich,) florib. hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis. *Loc.* Cultis, hortis, rivulis. *Fl.* Subruber & albus Jun-Sept. *Usſ.* Herbæ luteo tinctorius.

3) *Fagopyrum*, (gemeiner Buchweizen, Heidekorn.) foliis cordato sagittatis, caule erectiuſculo inermi, seminum angulis æqualibus. *Loc.* Montosis, arenosis, agris Eur. *Fl.* Subruber, Jul. *Vis.* Refrigerans, nutriens. *Usſ.* Culinaris, farinacei seminis cereale: pecoribus pabul. & apibus.

OCTANDRIA
Ord. IV. TETRAGYNIA.

160) PARIS (Einbeer) Linn. G. 500.

Cal. *Perianthium* tetraphyllum, perſiſtens: *foliolis* lanceolatis, acutis, corollæ magnitudine, patentibus.
Cor. *Petala* quatuor, patentia, subulata, calyci similia, perſiſtentia.
Stam. *Filamenta* octo, subulata, infra antheras brevia. *Antheræ* longæ, erectæ, medio filamentorum utrinque adnatæ.
Pist. *Germen* rotundo-tetragonum. *Styli* quatuor, patentes, staminibus breviores. *Stigmata* simplicia.
Per. *Bacca* globoso-tetragona, quadrilocularis, calyci insidens.
Sem. plura, gemino ordine incumbentia.

Spec.

Spec. *Quadrifolia*, (E. Wolfsbeer) foliis quaternis; ſolanum quadrifolium bacciferum. *Loc.* Nemoribus. *Fl.* Apr. May. *Vis.* Narcotica, foliorum vulneraria. *Uſ.* Capr. ovib. pabulum.

161) ADOXA (Biſamkraut,) Linn. G. 501.

Cal. *Perianthium* bifidum, planum, perſiſtens, infra germen.

Cor. monopetala, plana, quadrifida: *laciniis* ovatis, acutis, calyce longioribus.

Stam. *Filamenta* octo, ſubulata, longitudine calycis. *Antheræ* ſubrotundæ.

Pist. *Germen* infra receptaculum corollæ. *Styli* quatuor, ſimplices, erecti, longitudine ſtaminum, perſiſtentes. *Stigmata* ſimplicia.

Per. *Bacca* globoſa, inter calycem & corollam, calyce cum bacca inferne coalito, umbilicata, quadrilocularis.

Sem. ſolitaria, compreſſa.

Obs. *Talis eſt fructificatio* terminalis; laterales *omnes addunt unicam quintam partem numeri.*

Spec. *Moſchatellina*, (Biſamhahnenfus) ranunculus nemoroſus Moſchatellina dictus. *Loc.* Hortis nemoribus, ſepibus. *Fl.* Apr. *Uſ.* Capr. pabul.

Claſſis IX.

ENNEANDRIA (Mit 9 Staubfäden)

Ord. II. TRIGYNIA.

162) RHEUM (Rhabarber) Linn. G. 506.

Cal. nullus.

Cor. monopetala, baſi anguſtata, impervia, limbo ſexfida; *laciniis* obtuſis, *alternis* minoribus, marceſcens.

Stam. *Filamenta* novem capillaria, corollæ inſerta, ejusdemque longitudine. *Antheræ* didymæ, oblongæ, obtuſæ,

Pist. *Germen* breve, triquetrum. *Styli* vix ulli. *Stigmata* tria, reflexa, plumoſa.

Per. nullum.

Sem. unicum, magnum, triquetrum, acutum, *marginibus* membranaceis.

Spec.

Spec. *Palmatum*, (handförmige R.) foliis palmetis acuminatis; *Loc.* Cultis, hortis Eur. in china ad muros. *Fl.* Jul. *Vis.* Purgans, adſtringens, antacida; amara.

ENNEANDRIA

Ordo III.

HEXAGYNIA (Mit 6 Staubwegen)

163) BUTOMUS, (Waſſerviole) Linn. G. 507.

Cal. *Involucrum* ſimplex triphyllum, breve.
Cor. *Petala* ſex, ſubrotunda, concava, marceſcentia, *alternis* exterioribus, minoribus acutioribus.
Stam. *Filamenta* novem, ſubulata, quorum ſex exteriora. *Antheræ* bilamellatæ.
Pist. *Germina* ſex, oblonga, acuminata, in *Stylos* deſinentia. *Stigmata* ſimplicia.
Per. *Capſulæ* ſex, oblongæ, ſenſim attenuatæ, erectæ, univalves, introrſum dehiſcentes.
Sem. plurima, oblongo-cylindracea, utrinque obtuſa.
Spec. *Umbellatus* (Doldenförmige W. Waſſerliſch,) ſedo affinis, Juncoides umbellata paluſtris. *Loc.* Aquoſis. *Fl.* Jun. Jul.

Claſſis X.

DECANDRIA, (Mit 10 Staubfäden)

Ord. I. MONOGYNIA.

164) DICTAMNUS. (Diptonn,) Linn. G. 522.

Cal. *Perianthium* pentaphyllum, minimum, deciduum: *foliolis* oblongis acuminatis.
Cor. *Petala* quinque, ovato-lanceolata, acuminata, unguiculata, inæqualia, quorum duo ſurſum flexa, duo oblique ad latera poſita unicum de flexum.
Stam. *Filamenta* decem, ſubulata, longitudine corollæ, inter duo, petala lateralia declinata, inæqualia. Glandulæ punctiformes filamentis adſperſæ. *Antheræ* tetraragonæ, aſſurgentes.
Pist. *Germen* quinquangulare receptaculo elevatum. *Stylus* ſimplex, brevis, declinatus, incurvus. *Stigma* acutum, aſſurgens.

Per.

PER. *Capſulæ* quinque, margine introrſum coalitæ, compreſſæ, acuminatæ, apicibus diſtantibus, bivalves.

SEM bina, ovata, glaberrima, intra *Arillum* communem, bivalvem exciſum.

SPEC. *Albus*, (weiſſer D. Specht-Æſcherwurzel,) vulgo Fraxinella; *Loc.* Collib.Eur. *Fl.* Jun. apib.

165) RUTA, (Raute) Linn. G. 523.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, breve, perſiſtens.

COR. *Petala* 5. patentia, ſubovata, *unguibus* anguſtis.

STAM. *Filamenta* 10. ſubulata, patentia, longitudine corollæ, baſi latiuſcula. *Antheræ* erectæ, breviſſimæ.

PIST. *Germen* gibbum, cruce inſculptum, punctis 10. melliferis ad baſin notatum elevatum receptac. poris 10. melliferis pertuſo. *Stylus* erectus, ſubulatus. *Stigma* ſimplex.

PER. *Capſula* gibba, quinqueloba, ſemi-5fida 5locularis, 5fariam inter apices dehiſcens.

SEM. plurima, ſcabra, reniformi-angulata.

SPEC. *Graveolens*, foliis decompoſitis, petalis laceris, floribus lateralibus quadrifidis: hortenſis latifolia. *Loc.* Sterilibus, hortis. *Fl.* Jun. *Vis.* Reſolvens, alexipharmaca, pellens, carminativa, ſudorifera, anthelmintica; acris.

166) MONOTROPA, (Monotropa-Ohnblat,) Linn. G. 536.

CAL. nullus: niſi *petala* quinque exteriora pro calyce colorato habeas.

COR. *Petala* decem, oblonga, parallelo-erecta, apicibus ſerrata, decidua, quorum *alterna exteriora* baſi ſunt gibba, introrſum concava mellifera.

STAM. *Filamenta* ſimplicia decem, ſubulata, erecta. *Antheræ* ſimplices.

PIST. *Germen* ſubrotundum, acuminatum. *Stylus* cylindraceus longitudine ſtaminum. *Stigma* obtuſo-capitatum.

PER. *Capſula* ovata, pentagona, obtuſa, 5valvis.

SEM. numeroſa, paleacea.

OBS. *Talis eſt flos terminalis; ſi vero flores laterales adſint, excludunt unicam quintam partem numeri, in omni fructificationis parte.*

Spec. *Hypopithys*, (Fichten Spargel-M. Baumwurzelſauger, falſche Schmeerwurzel.) florib. lateralibus octandris, terminali decandro. *Loc.* Silvis, paraſitica radicum pinus ſilveſtris, abietis. *Fl.* Luteus ſuaveolens Jul.

167) ARBUTUS, (Erdbeerbaum.) Linn. G. 552.

Cal. *Perianthium* quinquepartitum, obtuſum, minimum, perſiſtens.
Cor. monopetala, ovata, baſi planiuſcula, *ore* quinquefido: *laciniis* obtuſis, revolutis, parvis.
Stam. *Filamenta* decem, ſubulato-ventricoſa, baſi tenuiſſima, margini baſeos corollæ affixa, corolla dimidio breviora. *Antheræ* leviter bifidæ, nutantes.
Pist. *Germen* ſubgloboſum, receptaculo decem punctis notato inſidens. *Stylus* cylindraceus, longitudine corollæ. *Stigma* craſſiuſculum, obtuſum.
Per. *Bacca* ſubrotunda quinquelocularis.
Sem. parva, oſſea.
Obs. *Ad* Vaccinium *proxime accedit, a quo fructu ſupero diſtinguitur.*

Spec. *Unedo*, (gemeiner E.) caule arboreo, foliis glabris ſerratis, baccis polyſpermis. *Vis.* Adſtringens baccarum. *Loc.* Montoſis, ſilvis. *Fl.* Jun. *Uſ.* Planta coriaria, cano-nigroque-tinctoria; folia tabacum condiunt: lignum album ad inſtrumenta varia.

168) PYROLA (Wintergrün) Lin. G. 554.

Cal. *Perianthium* ſpartitum, minimum, perſiſtens.
Cor. *Petala* quinque ſubrotunda, concava, patentia.
Stam. *Filamenta* decem, ſubulata, corolla breviora. *Antheræ* nutantes, magnæ ſurſum bicornes.
Pist. *Germen* ſubrotundum, angulatum. *Stylus* filiformis, ſtaminibus longior, perſiſtens. *Stigma* craſſiuſculum.
Per. *Capſula* ſubrotunda, depreſſa, pentagona, quinquelocularis, angulis dehiſcens.
Sem. numeroſa, paleacea.
Obs. Stamina & Stylus *in aliis* 2. 3. 4. 5. *erecta, in aliis* 1. *ad latus declinata, in aliis* 6. *patentia.*
Stigmatis *figura in diverſis ſpeciebus diverſa eſt.*

Spec. *Rotundifolia*, (rundblätriges W. Holz-Wald-Man-

Mangold,) ſtaminibus adſcendentibus piſtillo declinato, foliis integerrimis, ſubrotundis, ſcapo racemoſo. *Loc.* Montoſis, dumetis. *Fl.* May. Jun. *Vis.* Corroborans, adſtringens. *Uſ.* Scapæ ad ſcopas.

DECANDRIA Ord. II. DIGYNIA.

169) CHRYSOSPLENIUM, (Goldmilz) Linn. G. 558.

CAL. *Perianthium* quadripartitum, patens, coloratum, perſiſtens: *laciniis* ovatis, oppoſitis anguſtioribus.
COR. nulla: niſi *calycem* coloratum dicas.
STAM. *Filam.* 8-10. ſubulata, erecta, breviſſima, in receptaculo angulato poſita. *Antheræ* ſimplices.
PIST. *Germen* inferum, deſinens in *Stylos* duos, ſubulatos, longitudine ſtaminum. *Stigmata* obtuſa.
PER. *Capſula* biroſtris, bipartita, unilocularis, bivalvis, calyce viridi cincta.
SEM. plurima, minima.
OBS. *Flos terminalis ſſidus eſt reliqui ſeriones quadrifidi.*
SPEC. *Alterniſolium*, (gulden Steinbrech Milzkraut) foliis alternis, amplioribus auriculatis. Saxifraga aurea. *Loc.* Montoſis, nemoroſis, aquoſis. *Fl.* Mart. May. *Vis.* Vulneraria, aperiens.

170) SAXIFRAGA, (Steinbrech) Linn. G. 559.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, breve, acutum, perſiſtens.
COR. *Petala* quinque, patentia, baſi anguſta.
STAM. *Filam.* decem, ſubulata. *Antheræ* ſubrotundæ.
PIST. *Germen* ſubrotundo-acuminatum, deſinens in *Stylos* duos, breves. *Stigmata* obtuſa.
PER. *Capſula* ſubovata, biroſtris, unilocularis, inter apices dehiſcens.
SEM. numeroſa, minuta.
OBS. Saxifragiæ *Tournef. Capſula & Germen receptaculo floris cinctum ſeu inferum.*
Gei *Tournef. Capſula & Germen receptaculo floris inſidens.*
SPEC. *Granulata*, (weiſſer gemeiner Körnericher St.) foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoſo, radice granulata. *Loc.* Apricis. *Fl.* Albus May. *Vis.* Diuretica, ſedinfida. *Uſ.* Capr. pab.

171) SCLERANTHUS, (Knauel) Linn. G. 562.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, ſemiquinquefidum, acutum, perſiſtens, collo coarctatum.
COR. nulla.
STAM. *Filamenta* decem, ſubulata, erecta, minima, calyci inſerta. *Antheræ* ſubrotundæ.
PIST. *Germen* ſubrotundum. *Styli* duo, erecti, capillares, longitudine ſtaminum. *Stigmata* ſimplicia.
PER. *Capſula* ovata, tenuiſſima, in fundo calycis, collo clauſo. SEM. duo, hinc convexa, inde plana.
SPEC. 1) *Annuus*, (jähriger wilder K. kleiner Wegtrit) calycibus fructus patulis, Polygonum gramineo folio maius erectum. *Loc.* Arvis arenoſis. *Fl.* Sept. *Vis* Adſtringens foliorum.
2) *Perennis*, (beſtändiger K. falſch Johannis-Blut,) calycibus fructus clauſis. Knavel incanum flore maiore perenni. *Loc.* Campis apricis arenoſis. *Fl.* Aug. *Uſ.* Coccum tinctorium polonicum præbet radicibus.

172) GYPSOPHYLA, (Gypskraut,) Linn. G. 563.

CAL. *Perianth.* campanulatum, angulatum, 5partitum, *foliolis* ovatis, perſiſtentibus.
COR. *Petala* 5. ovata, obtuſa, patentia, ſubſeſſilia.
STAM. *Filam.* 10. ſubulata, patentia. *Anth.* ſubrotundæ.
PIST *Germen* ſubgloboſum. *Styli* 2. filiformes, dehiſcentes. *Stigmata* ſimplicia.
PER. *Capſula* globoſa, unilocularis 5. valvis.
SEM. plurima, ſubrotunda.
OBS. G. paniculata *dioica* eſt.
SPEC. *Muralis*, (Mauer G.) foliis linearibus planis, calycibus aphyllis, caule dichotomo, petalis crenatis. *Loc.* ad vias, muros, ſilvis. *Fl.* Purpureus Sept.

173) SAPONARIA, (Seifenkraut,) Linn. G. 564.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubuloſum, quinquedentatum, perſiſtens.
COR. *Petala* quinque: *ungues* anguſti, angulati, longitudine calycis. *Limbus* planus: laminis extrorſum latioribus, obtuſis.
STAM. *Filam.* 10. ſubulata, longitudine tubi corollæ, *alter-*

alterna unguibus petalorum inſerta, *quinque* ſeriora. *Antheræ* oblongæ, obtuſæ, incumbentes.

Pist. *Germen* teretiuſculum. *Styli* duo, recti, paralleli, longitudine ſtaminum. *Stigmata* acuta.

Per. *Capſula* longitudine calycis, tecta, unilocularis, cylindrica.

Sem. plurima, parva. *Receptaculum* liberum.

Spec. *Officinalis*, (gewöhnliches S.) calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Loc.* Humidis, ad muros, & flore pleno hortis. *Fl.* Alb. odoratus Jul. *Vis.* Pellens, ſudorifera, diuretica, anthelmintica; amara, ſaponacea. *Uſ.* Pollinis antherarum purpureo tinctorius.

174) DIANTHUS, (Nelcke,) Linn. G. 565.

Cal. *Perianthium* cylindraceum, tubuloſum, ſtriatum, perſiſtens, *ore* quinquedentatum, cinctum baſi ſquamulis quatuor quarum duæ inferiores oppoſitæ.

Cor. *Petala* quinque: *ungues* longitudine calycis, anguſti, receptaculo inſerti. *Limbus* planus: laminis extrorſum latioribus, obtuſis, crenatis.

Stam. *Filamenta* decem, ſubulata, longitudine calycis *apicibus* patulis. *Antheræ* ovali-oblongæ, compreſſæ, incumbentes.

Pist. *Germen* ovale. *Styli* duo ſubulati, ſtaminibus longiores. *Stigmata* recurva, acuminata.

Per. *Capſula* cylindracea, tecta, unilocularis, quadrifariam apice dehiſcens.

Sem. plurima, compreſſa, ſubrotunda. *Receptaculum* liberum, tetragonum, pericarpio dimidio brevius.

Obs. *In aliis* Styli *longitudinem ſtaminum vix excedunt, in aliis vero longiſſimi ſunt, ſed adeo revoluti, ut floris inflexio neceſſaria non ſit.*

Spec. 1) *Carthuſianorum*, (wilde Cartheuſer-Feld-Stein-Donner N.) florib. ſubaggregatis, ſquamis calycinis ovatis ariſtatis tubum ſubæquantibus, foliis linearibus trinerviis. *Loc.* Sterilibus apricis montoſis, hortis. *Fl.* Ruber Jun. Jul. *Uſ.* Apibus flores.

2) *Caryophyllus*, (Garten N.) florib. ſolitariis, ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis, corollis crenatis: hortenſis flore maiore, pleno. *Loc.* Cultis, hortis. *Fl.* Ruber, & variegatus ſuaveolens,

lens, Jul. *Vis.* Cordialis, ſudorifera, alexipharmaca; fragrans. *Uſ.* Apibus.

3) *Plumarius*, (Feder N.) florib. ſolitariis, ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis, corollis multifidis fauce pubeſcentibus. Loc. Nemoroſis, montoſis, paſcuis, hortis. *Fl.* Jul. Aug. *Uſ.* apibus flores.

DECANDRIA Ord. III. TRIGYNIA.

175) CUCUBALUS, (Taubenkropf,) Lin. G. 566.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubuloſum, quinquedentatum, perſiſtens.

COR. *Petala* quinque *ungues* longitudine calycis. *Limbus* planus: *Laminis* ſæpe bifidis. *Nectarium* nullum corollam coronans.

STAM. *Filam.* 10. ſubulata, *alterna* ſteriora, *alterna* unguibus petali inſerta. *Antheræ* oblongæ.

PIST. *Germen* oblongiuſculum. *Styli* tres, ſtaminibus longiores, ſubulati. *Stigmata* pubeſcentia, oblonga, contra ſolem flexa.

PER. *Capſula* tecta, acuminata, trilocularis, apice ſfariam dehiſcens.

SEM. plnrima, ſubrotunda.

OBS. *Diſtinguitur a Silene corolla absque corona nectarea.*

SPEC. *Behen* (gemeiner Behen, T. wildes Seifenkraut, Lyd-Gliedweich, Schaumrösle,) calycibus ſubgloboſis glabris reticulato-venoſis, capſulis trilocularibus, membranaceis corollis ſubnudis. *Loc.* Pratis ſiccis. *Fl.* Alb. Jul. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis pabul. & apib. flores.

176) SILENE, (Silene) Linn. G. 567.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubuloſum, quinquedentatum, perſiſtens.

COR. *Petala* quinque; *ungues* anguſti, longitudine calycis, marginati. *Limbus* planus, obtuſus, ſæpe bifidus. *Nectarium* componitur e duobus denticulis, in collo cujusvis petali, coronam faucis conſtituens.

STAM. *Filamenta* decem, ſubulata, *alterna* unguibus petalorum inſerta feriora. *Antheræ* oblongæ.

PIST. *Germen* cylindraceum. *Styli* tres, ſimplices, ſtaminibus longiores. *Stigmata* contra ſolem flexa.

PER.

PER. Capsula cylindrica, tecta, trilocularis, apice quinquefariam dehiscens.
SEM. plurima, reniformia.
OBS. diversa a *Cucubalo* corollæ corona nectarea.
SPEC. *Nutans*, (überhängende S. Leimkraut, wilder Wiederstos, weisse Klebnelcke,) petalis bifidis, florib. lateralibus secundis, cernuis, panicula nutante. *Loc.* Montosis, silvis, pratis aridis. *Fl.* Alb. May. Jun. *Us.* Capr. ovib. equis, porcis pabul. & apibus flores.

177) STELLARIA, (Sternpflanze,) Lin.G.568.

CAL. *Perianth.* pentaphyllum: foliol. ovato-lanceolatis, concavis, acutis, patentibus, persistentibus.
COR. *Petala* 5 bipartita, plana, oblonga, marcescentia.
STAM. *Filam.* 10. filiformia, corolla breviora: *alterna* breviora. *Antheræ* subrotundæ.
PIST. *Germen* subrotundum. *Styli* 3. capillares, patentes. *Stigmata* obtusa.
PER. Capsula ovata, tecta, unilocularis, sexvalvis.
SEM. plurima, subrotunda, compressa.
SPEC. 1) *Nemorum* (Haynsternpflanze, grosser Vogelmeyer, Waldmeyerich) foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramosis. *Loc.* Nemoribus. *Fl.* Aug. *Us.* Apibus flor.
2) *Graminea*, (grasige St. Meyerich, Hünerdarm,) foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis. *Loc.* sepibus & collibus. *Fl.* Alb. May. *Us.* Pecoribus pabulum.

178) ARENARIA, (Sandkraut,) Linn. G. 569.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* oblongis, acuminatis, patentibus, persistentibus.
COR. *Petala* quinque, ovatæ.
STAM. *Filamenta* decem, subulata, *alterna* interiora. *Antheræ* subrotundæ.
PIST. *Germen* ovatum. *Styli* tres, erecto-reflexi. *Stigmata* crassiuscula.
PER. *Capsula* ovata, tecta, unilocularis, apice quinquefariam dehiscens.
SEM. plurima, reniformia.
SPEC. *Trinervia*, (dreynerviges S.) foliis ovatis acutis petiolatis nervosis. *Loc.* Sylvis. *Fl.* Jun.

DECANDRIA

Ord. IV. PENTAGYNIA.

179) SEDUM, (Fettehenne,) Linn. G. 579.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, acutum, erectum, perſiſtens.

COR. *Petala* 5. lanceolata, acuminata, plana, patentia. *Nectaria* 5. *ſingulum* ſquamula minima emarginata, ſingulo germini ad baſin extrorſum inſerta.

STAM. *Filamenta* decem, ſubulata, longitudine corollæ. *Antheræ* ſubrotundæ.

PIST. *Germina* quinque, oblonga, deſinentia in *Stylos* tenuiores. *Stigmata* obtuſa.

PER. *Capſulae* 5. patentes, acuminatæ, compreſſæ, verſus baſin emarginatæ, longitudinaliter ſutura-introrſum dehiſcentes.

SEM. plurima, minima.

SPEC. 1) *Telephium* (gemeine F. Wolfs-Donner-Wund-Knaben-Zungen-Kraut) foliis planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto. *Loc.* Montoſis, ſiccis. *Fl.* Alb. purpureus Aug. *Vis.* Refrigerans, glutinoſa, adſtringens. *Uſ.* Bob. capr. ovib. porcis pabul. & apib. flores.

2) *Rupeſtre*, (Felſen F. gelber-Mauerpfeffer-Kazen-Träuble,) foliis ſubulatis quinquefariam confertis, baſi ſolutis, floribus cymoſis. *Loc.* Ad radices montium, ad littora, & muros vinearum. *Fl.* Jun. *Uſ.* Ad olera in Belgia.

3) *Album*, (weiſſe kleine Hauswurz,) foliis oblongis obtuſis teretiuſculis ſeſſilibus patentibus, cyma, ramoſa. *Loc.* Petris, ad muros. *Fl.* Jun. *Vis.* Refrigerans, adſtringens, ſuccus anodynus. *Uſ.* Capris pabulum.

180) OXALIS, (Sauerklee,) Linn. G. 582.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, acutum, breviſſimum, perſiſtens.

COR. quinquepartita, unguibus, cohærens, erecta, obtuſa, emarginata.

STAM. *Filamenta* decem, capillaria, erecta, *exteriora* breviora. *Antheræ* ſubrotundæ, ſulcatæ.

PIST.

PIST. *Germen* quinquangulare. *Styli* quinque, filiformes, longitudine ſtaminum. *Stigmata* obtuſa.
PER. *Capſula* pentagona, quinquelocularis, angulis dehiſcens longitudinaliter.
SEM. ſubrotunda, profilientia.
OBS. Capſula *in aliis brevis, ſeminibus ſolitariis, in aliis longa ſeminibus plurimis,*

SPEC. *Acetoſella,* (gemeiner weiſſer S. Buch-Gauch-Ampfer, Mälerkraut,) ſcapo unifloro, foliis ternatis radice ſquamoſo-articulata. *Loc.* Silvis, montibus. *Fl.* Subcærul. Apr. May. *Vis.* Refrigerans, attenuans, acida. *Uſ.* Culinaris ad juſcula. Apibus flor. & ad acetaria herba: ſal eſſentiale oxalid. in ſpiritu acri ſolutum, ad dealbandum in lanificiis, ad maculas varias. Folia etiam conniventia humid. indicant tempeſtatem.

181) AGROSTEMA, (Raden,) Linn. G. 583.

CAL. *Perianthium* monophyllum, coriaceum tubuloſum ſdentatum perſiſtens.
COR. *Petala* quinque, *ungues* longitudine tubi calycis, *Limbus* laminis patentibus obtuſis.
STAM. *Filam.* 10. ſubulata, *alterna* feriora, ſingulo ungui petalorum inſerta. *Antheræ* ſimplices.
PIST. *Germen* ovatum. *Styli* quinque, filiformes, erecti, longitudine ſtaminum. *Stigmata* ſimplicia,
PER. *Capſula* oblongo-ovata, tecta, unilocularis, ſvalvis.
SEM. plurima, reniformia, punctata. *Receptacula* libera, tot quot ſemina, interiora gradatim longiora.

SPEC. *Githago,* (Korn R - Nägelein - Röslein, wilde Marienroſen, ſchwarzer Ackerkümmel.) hirſuta, corolla non coronata, calycibus corollam æquantibus petalis integris nudis. *Loc.* Agris, inter ſegetes. *Fl.* Jul.

182) LYCHNIS, (Lichtröslein, Wiederſtos,) Linn. G. 584.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubuloſum, membranaceum quinquedentatum, perſiſtens.
COR. *Petala* quinque: *ungues* longitudine calycis, plani, marginati; *Limbus* laminis ſæpe fiſſis planis.
STAM. *Filam.* 10. calyce longiora, *alterna* feriora, ſin-

gulo ungui petalorum affixa. *Anth.* incumbentes.
PIST. *Germen* ſubovatum. *Styli* 5. ſubulati, ſtaminibus longiores. *Stigmata* reflexa contra ſolem, pubeſcentia.
PER. *Capſula* ad ovatam figuram accedens, tecta, 5valvis.
SEM. plurima, rotundiuſcula.

SPEC. 1) *Flos Cuculi*, (Gukugsblume, Fleiſch-Gauch-Pech-Blume, Wiederſtos,) petalis quadrifidis, fructu ſubrotundo, caryophyllus pratenſis, flore laciniato ſimplici. *Loc.* Pratis humidiuſculis, montanis. *Fl.* Roſeo-purpureus May.

2) *Dioica*, (weiſſer und rother Wiederſtos. L. mit ganz getrenten Geſchlechtern,) floribus dioicis, cucubalus caule compoſito, calycibus oblongo-ovatis. *Loc.* Humidis, pratis ſucculentis. *Fl.* Purpureus & alb. May. Jun.

183) CERASTIUM, (Hornkraut,) Linn. G. 585.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* ovato-lanceolatis, acutis, patentibus, perſiſtentibus.
COR. *Petala* quinque, bifida, obtuſa, erecto-patentia, longitudine calycis.
STAM. *Filamenta* decem, filiformia, corolla breviora, *alterna* breviora. *Antherae* ſubrotundæ.
PIST. *Germen* ovatum. *Styli* quinque, capillares, erecti, longitudine ſtaminum. *Stigmata* obtuſa.
PER. *Capſula* ovato-cylindracea, ſ. globoſa, obtuſa, unilocularis, dehiſcens apice quinquedentato.
SEM. plurima, ſubrotunda.
OBS. *Diviſio ſpecierum ex capſula oblonga & globoſa petenda.*

SPEC. 1) *Viſcoſum*, (klebrichtes H. rauher Hünerdarm, Felddarm-Ackervogelkraut,) erectum, villoſo-viſcoſum, corolla calyci æqualis. *Loc.* Pratis macilentis, ad muros. *Fl.* Jun.

2) *Arvenſe*, (Acker H. falſcher weiſſer Steinbrech,) foliis lineari-lanceolatis obtuſis glabris, corollis calyce maioribus. *Loc.* Pratis. *Fl.* Apr. *Uſ.* Apibus flores.

184) SPERGULA, (Sparck) Linn. G. 586.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* ovatis, obtuſis, concavis, patentibus, perſiſtentibus.
COR. *Petala* quinque, ovata, concava, patentia, calyce majora, indiviſa.

STAM.

STAM. *Filamenta* decem, ſubulata, corolla breviora. *Antheræ* ſubrotundæ.
PIST. *Germen* ovatum. *Styli* quinque, erecto-reflexi, filiformes. *Stigmata* craſſiuſcula.
PER. *Capſula* ovata, tecta, unilocularis, quinquevalvis.
SEM. plurima, depreſſo-globoſa, *margine* emarginato cincta.
OBS. *Petalis integris ceraſtio diſtinguitur ſ. pentandra ſtamina tantum 5. habet.*

SPEC. *Arvenſis*, (Acker S. teutſcher-weiſſer-groſſer-wilder Spergel, Knöterich, Mariengras,) foliis verticillatis, floribus decandris, fructu pendulo. *Loc.* Agris, arvis. *Fl.* Apr. *Uſ.* Pecoribus pabul. & avib.

DECANDRIA

Ord. V. DECAGYNIA, (Mit 10 Staubw.)

185) PHYTOLACCA, (Kermesbeer) Lin. G. 588.

CAL. nullus: niſi corollam calycem coloratum dicas.
COR. *Petala* quinque, ſubrotunda, concava, patentia, apice inflexa, perſiſtentia.
STAM. *Filamenta* decem, ſubulata, longitudine corollæ. *Antheræ* ſubrotundæ, laterales.
PIST. *Germen* orbiculatum, depreſſum, torulis externe diviſum, deſinens in *Stylos* 8-10. breviſſimos, patenti-reflexos. *Stigmata* ſimplicia. perſiſtentia.
PER. *Bacca* orbiculata, depreſſa, ſulcis 10. longitudinalibus excavata, piſtillis umbilicata, decem loculis inſtructa,
SEM. ſolitaria, reniformia, glabra.

SPEC. *Decandra*, (Virginiſcher K. amerikaniſcher Nachtſchatten,) florib. decandris decagynis: ſolanum racemoſum americanum. *Loc.* Hortis Eur. *Fl.* Subviridis Jul. *Vis.* Corrodens folior. jam perfectorum. *Uſ.* Folior. junior. ad olera: Rad. rubro & baccæ roſeo-tinctoriæ.

Claſſis

Classis XI.

DODECANDRIA (Mit 12 Staubfäden)

Ord. I. MONOGYNIA.

Stamina a 11-19. inclusive.

186) ASARUM (Haselwurz,) Linn. G. 589.

Cal. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, semitrifidum, coriaceum, coloratum, persistens: *laciniis* erectis, apice inflexis.

Cor. nulla.

Stam. *Filamenta* duodecim, subulata, calyce dimidio breviora. *Antheræ* oblongæ, filamentorum parieti medio adnatæ.

Pist. *Germen* intra substantiam calycis reconditum. *Stylus* cylindraceus, longitudine staminum. *Stigma* stellatum, sexpartitum, *laciniis* reflexis.

Per. *Capsula* coriacea, intra substantiam calycis, sub sexlocularis.

Sem. plura, ovata.

Spec. *Europæum*, (gemeine Europ. H.) foliis reniformibus, obtusis binis. *Loc.* Nemorosis, infra Muscos & folia. *Fl.* Nauseosus Febr-May. *Vis.* Vomitoria, purgans, errhina, diuretica, diaphoretica, amaro-acris.

187)) PORTULACA (Portulac) Linn. G. 603.

Cal. *Perianthium* bifidum, parvum germini insidens, apice compressum, persistens.

Cor. *Petala* quinque, plana, erecta, obtusa, emarginata, calyce majora.

Stam. *Filamenta* multa, capillaria, corolla dimidio breviora. *Antheræ* simplices.

Pist. *Germen* subrotundum. *Stylus* simplex, brevis. *Stigmata* 5. oblonga, longitudine styli.

Per. *Capsula* tecta, ovata, unilocularis, receptaculum liberum, Sem. plurima, parva.

Spec. *Oleracea*, (Kohl P. kleines wildes Burzelkraut,) foliis cuneiformibus verticillatis, florib. sessilibus. *Loc.* Cultis, hortis, vineis. *Vis.* Diluens, refrigerans, corroborans: aquosa. *Us.* Foliorum ad acetaria.

188) LY-

188) LYTHRUM (Blutkraut,) Lin. G. 604.

CAL. *Perianthium* monophyllum, cylindraceum, ſtriatum: denticulis duodecim alternis minoribus.

COR. *Petala* ſex, oblonga, obtuſiuſcula, patentia, unguibus inciſuris calycis inſerta.

STAM. *Filamenta* 12. filiformia, longitudine calycis, *ſuperiora* inferioribus breviora, *Antheræ* ſimplices, aſſurgentes.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* ſubulatus, longitudine ſtaminum, declinatus. *Stigma* orbiculatum, aſſurgens.

PER. *Capſula* oblonga, acuminata, tecta, bilocularis.

SEM. numeroſa, parva.

OBS. *In quibusdam ſpeciebus unica ſexta pars numeri e flore eximitur*; 2, 7,

SPEC. *Salicaria* (braunrother Weiderich, blauer Fuchsſchwanz, Parthicke,) foliis oppoſitis cordato-lanceolatis, florib. ſpicatis dodecandris. *Loc.* Ripis *Fl.* Purpur. Jul. *Vis.* vulnerar. adſtringens. *Uſ.* Bob. Capr. ovib. equis pabul. & apib. & ad coria præparanda.

DODECANDRIA.

Ord. II. DIGYNIA.

189) AGRIMONIA, (Odermenning,) Lin. G. 607.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, acutum, parvum, germini inſidens, perſiſtens, altero calyce obvallatum.

COR. *Petala* quinque, plana, emarginata, *unguibus* anguſtis, calyci inſertis.

STAM. *Filamenta* capillaria, corolla breviora, calyci inſerta. *Antheræ* parvæ, didymæ, compreſſæ.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo, ſimplices, longitudine ſtaminum. *Stigmata* obtuſa.

PER. nullum. *Calyx* collo coarctatus, induratus.

SEM. duo, ſubrotunda.

OBS. *Stamina valde numero incerta, aliis duodecim, rarius decem, aliis ſeptem.*

Agrimoniæ T. calyx exterior adnatus interiori. Semina duo, ſtamina duodecim ad viginti; fructus ſetis obvallatus. Agrimonoidis T. calyx exterior liber ab interiori, ſemen unicum, ſtamina ſeptem circiter.

SPEC.

Spec. *Eupatorium*, (gewöhnlicher O. Bruchkraut) fol. caulinis pinnatis, impari petiolato, fructibus hiſpidis. *Loc.* Pratis apricis. *Fl.* Jun.-Sept. *Vis.* Diuretica, adſtringens roborans, vulneraria, pellens. *Uſ.* Capr. ovib. pabul. & ad coria præparanda.

DODECANDRIA.

Ord. III. TRIGYNIA.

190) RESEDA, (Harnkraut,) Linn. G. 608.

Cal. *Perianthium* monophyllum, partitum: *laciniis* anguſtis, acutis, erectis, perſiſtentibus, quarum *duæ* magis dehiſcunt, in uſum petali melliferi.

Cor. *Petala* nonnulla, inæqualia, ſemper *aliqua* ſemitrifida, *ſupremo* ad baſin gibbo, mellifero, longitudine calycis. *Nectarium*: Glandula plana, erecta, e receptaculo producta, a latere ſuperiore inter ſtamina & ſupremum petalum locata, connivens cum baſi petalorum ab eodem latere dilatata.

Stam. *Filamenta* 11. ſ. 15. brevia. *Antheræ* erectæ, obtuſæ, longitudine corollæ.

Pist. *Germen* gibbum, in *Stylos* nonnullos breviſſimos deſinens. *Stigmata* ſimplicia.

Per. *Capſula* gibba, angulata, ſtylis acuminata, inter ſtylos hian, unilocularis.

Sem. plurima, reniformia, angulis capſulæ annata.

Obs. *Vix datur ullum genus, determinando charactere, difficilius. Ludit enim numero & figura in diverſis ſpeciebus.* Eſſentialis character *conſiſtit in petalis trifidis, unico ad baſin mellifero & capſula non clauſa, ſed hiante ſemper.* Luteola 1. Perianthium *quadripartitum.* Petala *tria, ſupremum melliferum ſemiſexfidum; lateralia oppoſita trifida; adduntur luſu vel natura ſæpe duo infima minima integra.* Styli *tres.* Stamina *plurima.* Alba 8. Perianthium *ſexpartitum.* Petala 6. *ſubæqualia omnia ſemitrifida.* Styli 4. Capſula *quadrangularis.* Stamina *undecim ſemper.* Aliæ ſpec. Perianthium *quinquepartitum.* Petala *quinque, diſſimilia, trifida.* Styli *tres* Stamina plurima.

Spec. 1) *Luteola* (Färbergras, Streich-Hexen-Kraut, Wau,) foliis lanceolatis integris, calycibus quadrifidis: Luteola ſalicis folio. *Loc.* Montoſis, ſaxoſis, paſcuis, ad vias, rivulos. *Fl.* May. Jun. *Uſ.* Luteo tinctorius. 2)

2) *Lutea*, (gelbes H. Wau,) fol. omnib. trifidis, inferiorib. pinnatis, crispis. *Loc.* Montosis. *Fl.* May. Jun.

3) *Odorata*, (wohlriechendes H.) foliis integris trilobisque, calycibus florem æquantibus. *Loc.* Hortis Europ. *Fl.* Viridis odoratus. Jul.

191) EUPHORBIA, (Euphorbien,) Linn. G. 609.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ventricosum, sub coloratum, *ore* quadridentatum (quinquedentatum paucioribus) persistens.

COR. *Petala* 4. (5. paucis) turbinata, gibba, crassa, truncata, situ inæqualia, cum dentibus calycis alterne, unguibus margini calycis imposita, perfistentia.

STAM. *Filamenta* plura (12. vel supra) filiformia, articulata, receptaculo inserta, corolla longiora, diverso tempore erumpentia. *Antheræ* didymæ, subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum, triquetrum, pedicellatum. Styli 3. bifidi. *Stigmata* obtusa.

PER. *Capsula* subrotunda, trirocca, trilocularis, elastice dissiliens.

SEM. solitaria, subrotunda.

SPEC. 1) *Peplus*, (runde E.) umbella trifida, dichotoma, involucellis ovatis, fol. integerrimis obovatis petiolatis, partialib. dichotomis diphyllis. *Loc.* Cultis, oleraceis, hortis. *Fl.* May-Dec.

2) *Exigua acuta*, (kleine E.) umbella trifida, dichotoma, involucellis lanceolatis, fol. linearib. alternis acutis, partialib. dichotomis diphyllis. *Loc.* Hortis, arvis, pascuis. *Fl.* Jun. - Sept.

3) *Esula*, (Wolfs-Teufels-Esels-Milch,) umbella multifida, bisida, involucellis subcordatis, petalis subbicornibus, ramis sterilib. fol. uniformibus. *Loc.* Sterilibus, Silvis, pascuis. *Fl.* May. *Vis.* Radic. & succi albi lactescentis acris, corrodens, purgans.

DODECANDRIA.

Ord. V. POLYANDRIA.

192) SEMPERVIVUM, (Hauslaub) Lin. G. 612.

CAL. *Perianthium* 6. ad duodecim-partitum, concavum, acutum, persistens.

COR.

Cor. *Petala* 6. ad 12. oblonga, lanceolata, acuta concava, calyce paulo majora.

Stam. *Filamenta* 6. ad 12. ſubulato-tenuia. *Antheræ* ſubrotundæ.

Pist. *Germina* 6. ad 12. in orbem poſita, erecta, deſinentia in *Stylos* totidem, patentes *Stigmata* acuta.

Per. *Capſulae* 6. ad 12. oblongæ, compreſſæ, breves, in orbem poſitæ, extrorſum acuminatæ, introrſum dehiſcentes.

Sem. plura, ſubrotunda, parva.

Obs. Numerus *ſæpius luxurians major evadit, præſertim in partibus femininis. Sedo affine, ſed Petalis pluribus quam 5. diverſum.*

Spec. *Tectorum*, (Dach H. Hauswurz, Donderbar,) foliis ciliatis, propaginibus patentibus; fol. radicalib. carnoſis ciliatis, caulinis membranaceis, corymbo racemoſo reflexo. *Loc.* Tectis collibus, muris. *Fl.* Jul. Aug. *Vis.* Refrigerans, adſtringens; acido auſtera, aquoſa. *Uſ.* Capris ovib. pabulum.

Claſſis XII.

ICOSANDRIA. (Mit vielen dem Kelche in einem Ringe einverleibten Staubf.)

Character Claſſicus & Notæ quibus a Polyandria differt, ſunt:

1. *Calyx* monophyllus, concavus.
2. *Corolla* unguibus parieti calycis affixa.
3. *Stamina* plura quam novemdecim, calycis parieti vel corollæ inſerta.

Dicitur Icoſandria, quod Staminum numerus in hac familia circa vigeſimum numerum circiter conſiſtat, in maxima generum parte; pro Charactere tamen non aſſumendus eſt numerus, cum omnes poliandri ſtaminibus parieti interno calycis inſerto (non vero receptaculo) huc amandandi ſunt.

Ord. I. MONOGYNIA.

193) PHILADELPHUS (welſcher Iasmin,) Linn. G. 614.

Cal. *Perianthium* monophyllum, quadripartitum, acuminatum. perſiſtens.

Cor.

Cor. *Petala* 4. ſubrotunda, plana, magna, patentia.
Stam. *Filamenta* viginti, ſubulata, longitudine calycis. *Antheræ* erectæ, quadriſulcæ.
Pist. *Germen* inferum. *Stylus* filiformis, quadripartitus. *Stigmata* ſimplicia.
Per. *Capſula* ovalis, utrinque acuminata, calyce per medium cincta, quadrilocularis, quadrivalvis.
Sem. numeroſa, oblonga, exigua.

Spec. *Coronarius*, (welſcher Kronen-Jasmin) foliis ſubdentatis, flos albus primarius, ſfidus calyce, corolla, piſtillo, capſula. *Loc.* Veronæ & hortis Eur. *Fl.* Suaveolens Jul.

194) PRUNUS, (Pflaumen) Linn. G. 620.

Cal. *Perianth.* monophyllum, campanulatum, ſfidum, deciduum: *laciniis* obtuſis, concavis.
Cor. *Petala* quinque, ſubrotunda, concava, magna, patentia, unguibus calyci inſerta.
Stam. *Filam.* 20. ad 30. ſubulata, longitudine fere corollæ, calyci inſerta. *Antheræ* didymæ, breves,
Pist. *Germen* ſubrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* orbiculatum.
Per. *Drupa* ſubrotunda.
Sem. *Nux* ſubrotunda, compreſſa.

Spec. 1) *Padus* (ſchwarze Vogel-Trauben-Kirſche, Alt-Stinck-Hunds-Elſebeer-Baum,) floribus racemoſis, foliis deciduis baſi ſubtus biglandulosis: Ceraſus racemoſa ſilveſtris fructu non edili. *Loc.* Incultis, ſepibus. *Fl.* Apr. May. *Uſ.* Ad aggeres paludum: ad inſertionem aliorum fructuum edilium generoſorum; baccæ ingratæ Suecis Norwegis cum ſale aut vino eſculentæ avibus inprimis pabulum: ſurculi ob flexilitatem ad manubria flagellorum, rami ad manubria fiſtularum tabacinarum & lignum leve flexile ad manubr. bombardarum.

2) *Armeniaca*, (Apricoſen, Amarellen,) florib. ſeſſilibus, foliis ovato-cordatis, nucleo dulci. *Loc.* Hortis Eur. *Fl.* Mart. Apr. *Uſ.* Fructus ſuavis eſculentus; e nucleis cum ſpiritu vini potus præparatur, ſtomachicus ſic dictus Ratafia.

3) *Ceraſus*, (Kirſchen,) umbellis ſubſeſſilibus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis glabris. *Loc.*

Hortis. *Fl.* May. Jun. *Vis.* Refrigerans, acidiuſcula. *Uſ.* Culinaris fructus ſapidi, varii coloris, ſaporis, & magnitudinis pro diverſo ſolo: flores apib. pabulum.

4) *Avium* (gemeine ſchwarze Vogelkirſchen, wilder ſüſſer Waldkirſchenbaum,) umbell. ſeſſilib. fol. ovato-lanceolatis, conduplicatis, ſubtus pubeſcentibus: ceraſus ſylveſtr. fructu nigro & rubro ſubdulci. *Loc.* Silvis. *Fl* May. *Vis.* Nervina, ſubnodyna, antiſpasmodica, refrigerans fructus ſapidi eſculenti. *Uſ.* Culinar. fructus, flor. apibus.

5) *Domeſtica*, (gemeine Pfl. Zwetſchen, Quetſchen.) Pedunculis ſubſolitariis, fol. lanceolato-ovatis, convolutis, ramis muticis: Pruna præcox (frühe Pflaumen, Pr. myrobalana, (Myrabellen) *Loc.* Cultis, hortis. *Fl.* Jun. Jul. *Uſ.* Culinar. fructus varii coloris, magitudinis & ſaporis.

6) *Spinoſa*, (Schlehen, Schwarzdorn,) pedunculis ſolitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis ſpinoſis. *Loc.* Collibus apricis, ſepibus. *Fl.* Apr. May. *Vis.* Cortic. adſtringens, laxans, fruct. refrigerans. *Uſ.* Frutex ad ſepes valde ſpinoſus ſed repens: capr. ovib. equis pabul. & apib flores: baccis vinum fit ſapidum, fragrans: lignum durum tenax dentibus pectinum pratorum variisque inſtrumentis mathemat. tornatorib. ſcriniariis utile.

ICOSANDRIA. Ord. II. DIGYNIA.

195) CRATÆGUS (Hagedorn,) Linn. G. 622.

CAL. *Perianthium* monophyllum, concavo-patens, quinquedentatum, perſiſtens.

COR. *Petala* quinque ſubrotunda, concava, ſeſſilia, calyci inſerta.

STAM. *Filamenta* viginti, ſubulata, calyci inſerta. *Antheræ* ſubrotundæ.

PIST. *Germen* inferum. *Styli* duo, filiformes, erecti, *Stigmata* capitata.

PER. *Bacca* carnoſa, ſubrotunda, umbilicata.

SEM. bina, oblongiuſcula, diſtincta, cartilaginea.

SPEC. 1) *Torminalis*, (Meelbeere, Elſe-Arls-Darmbeere, Elrizen,) fol. cordatis ſeptangulis, lobis infimis

infimis divaricatis ſilveſtris non ſpinoſa. *Loc.* Sepibus Europæ. *Fl.* May. *Uſ.* Baccæ eſculentæ, flatulentæ in annonæ penuria loco panis, ad cereviſiam & ſpiritus: lignum tenax fabris lignariis ad axes, rotas, ſcipiones, tornatoribus ſcriniariis.

2) *Oxyacantha*, (gemeiner Hagdorn, Weis-Meel-Dorn, Möllerbrod,) fol. obtuſis ſubtrifidis ſerratis; ſylveſtris, ſpinoſa. *Loc.* Sepibus. *Fl.* May. *Uſ.* Ad ſepes denſas, bobus, capr. ovib. equis pabulum & apib. flores: baccæ pauperib. ovib. & gallinis pabul. lignum tenax, durum, ad rotas molendinarias, pyxides, menſas, temones, manubria fiſtularum tabacinarum.

ICOSANDRIA Ord. III. TRIGYNIA.

196) SORBUS (Sperberbaum) Linn. G. 623.

CAL. *Perianthium* monophyllum, concavo-patens, quinquedentatum, perſiſtens.
COR. *Petala* 5. ſubrotunda, concava, calyci inſerta.
STAM. *Filamenta* viginti, ſubulata, calyci inſerta. *Antheræ* ſubrotundæ.
PIST. *Germen* infra receptaculum. *Styli* tres, filiformes, erecti. *Stigmata* capitata.
PER. *Bacca* mollis, globoſa, umbilicata.
SEM. tria, oblongiuſcula, diſtincta, cartilaginea.

SPEC. *Domeſtica*, (zahmer Speyerling, zahmer Vogelbeerbaum, Sorbäpfel, Eſcherizen,) foliis pinnatis ſubtus villoſis. *Loc.* Montoſis. *Fl.* Jun. *Vis.* Fructus ſapidi adſtringens.

ICOSANDRIA. Ord. IV. PENTAGYNIA.

197) MESPILUS, (Miſpel,) Linn. G. 625.

CAL. *Perianthium* monophyllum, concavo-patens, quinquedentatum, perſiſtens.
COR. *Petala* 5. ſubrotunda, concava, calyci inſerta.
STAM. *Filamenta* viginti, ſubulata, calyci inſerta. *Antheræ* ſimplices.
PIST. *Germen* inferum. *Styli* quinque, ſimplices, erecti. *Stigmata* capitata.

Per. *Bacca* globoſa, umbilicata, calyce connivente clauſa, ſed umbilico fere perforata.

Sem. quinque, oſſea, gibba.

Obs. *Ex dictis patet valde affinia eſſe genera*: Cratægum, Sorbum & Meſpilum, *ut aut ſolo numero ſeminarum, aut vix ulla ſufficienti nota diſtingui poſſint.* Folia *Sorbis* pinnata, *cratægis* angulata, *Meſpilis* integra communiter ſunt.

Spec. *Germanica*, (gemeine M.) inermis, fol. lanceolatis ſubtus tomentoſis, floribus ſeſſilib. ſolitariis. *Loc.* Hortis Europæ. *Vis.* Fructus ſapidi, eſculenti, aciduli refrigerans, tonica.

198) PYRUS, (Birn und Æpfel) Linn. G. 626.

Cal. *Perianthium* monophyllum, concavum, ſemiquinquefidum, perſiſtens: *laciniis* patentibus.

Cor. *Petala* quinque, ſubrotunda, concava, magna, calyci inſerta.

Stam. *Filamenta* viginti, ſubulata, corolla breviora, calyci inſerta. *Antheræ* ſimplices.

Pist. *Germen* infra receptaculum. *Styli* quinque, filiformes, longitudine ſtaminum. *Stigmata* ſimplicia.

Per. *Pomum* ſubrotundum, umbilicatum, carnoſum, loculis membranaceis, quinqueloculare.

Sem. nonnulla, oblonga, obtuſa, baſi acuminata, hinc convexa, inde plana.

Obs. *Mirum omnes a ſeculis genus notiſſimum in tria diſpeſcuiſſe, dum genera e ſpeciebus, ſpecies e varietatibus conſtituerunt.*

Spec. 1) *Communis*, (wilder B. Holzbirnb. Knötelbaum,) fol. ſerratis, pedunculis corymboſis, pomis baſi productis, ſilveſtris. (P. Bergamotta Gallis, Moſchatellina rubra, hortenſis.) *Loc.* Silvis, & varii ſapidiores hortis. *Fl.* May. Jun. *Uſ.* Spinoſus ſilveſter mater omnium ſativarum; Præſtat plantata inſitioni & inoculationi inſtituendæ ſuavioribus varietatibus: lignum compactum ad inſtrumenta varia œconomica & opificum, tornatoribus ſcriniariis; cortex radicis ſilveſtr. coriis parandis: apibus flores; uſus fructus ſylveſtr. adſtringentis & Pyr. hortenſis uti & P. Mali, ac Cydonia varius in cibariis, vinum e ſucco fermentato, ſpiritusque ardens conficitur.

2) *Ma-*

2) *Malus* Silveſtris, (wilder Holzapfelbaum) fol. ſerratis, umbellis ſeſſilib. pomis baſi concavis. *Loc.* Silvis, & Malus ſativus eſculentus varii coloris ſaporisque hortis. *Fl.* May. Jun. *Vis.* Refrigerans, tonica, acidula fructus. *Uſ.* Fruct. P. hortenſ. eſculenti culinaris, folia bob. capr. ovib. equis, porcis pabul. & apib. flores: cortex ſilv. luteo tinctorius, & fructus adſtringens acidus ad acetum: lignum durum ad rotas molendinarias, variaque inſtrumenta œconomica.

3) *Cydonia*, (Quittenbaum,) fol. integerrimis, floribus ſolitariis. *Loc.* Hortis. *Fl.* May. *Vis.* Inſpiſſans, adſtring. refrigerans, acida. *Uſ.* Fructus culinaris.

199) SPIRÆA, (Spierpflanze) Linn. G. 630.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ſemiquinquefidum, baſi planum, *laciniis* acutis perſiſtens.

COR. *Petala* 5. plana, calyci inſerta, oblongo-rotundata.

STAM. *Filamenta* 20. filiformia, corolla breviora, calyci inſerta. *Antheræ* ſubrotundæ.

PIST. *Germina* 5. *Styli* totidem, filiformes, longitudine ſtaminum. *Stigmata* capitata.

PER. *Capſulæ* quinque, oblongæ, acuminatæ, compreſſæ, bivalves.

SEM. pauca, acuminata, parva.

SPEC. 1) *Aruncus*, (Geisbart, Berggeiswedel, Wald-Bocksbart,) fol. ſupradecompoſitis, ſpicis paniculatis, floribus diocis, oblongis: fructificatione dioica a reliquis differt. *Loc.* Montoſis, ſilvis. *Fl.* Jul. *Uſ.* Ad ſepes, herba coriis parandis & flores apibus.

2) *Filipendula*, (rother Steinbrech, Wildgarben) fol. pinnatis, foliolis uniformib. ſerratis, caule herbaceo, florib. cymoſis: capſulis plurim. in orbem digeſtis. *Loc.* Paſcuis. *Fl.* Jun. *Vis.* Adſtring. vulneraria, ſtiptica. *Uſ.* Radic. farinoſæ in annona loco panis, bob. capr. ovibus & ſuib. pabul. herba coriis parand. & flor. apibus.

3) *Ulmaria* (Johannis-Geis-Wieſen-Wedel, Geis-Bart-Fus.) fol. pinnatis, impari majore lobato, florib. cymoſis: capſulis plurimis concortis inſtar Helicteris. *Loc.* Pratis uliginoſis, umbroſis ſil-

vis. *Fl.* Odorat. Jun. Jul. *Vis.* Adſtring. ſudorifera, fragrans. *Uſ.* Capr. ovib. ſuib. pabul, & coriis parandis, flores apibus.

ICOSANDRIA

Ord. V. POLYGYNIA.

200) ROSA, (Roſe) Linn. G. 631.

Cal. *Perianthium* monophyllum; Tubo ventricoſo, collo coarctato; Limbo patente, 5. partito globoſum. *Laciniis* longis, lanceolato-anguſtis; (quarum in quibusdam *duæ alternæ* utrinque appendiculatæ; *duæ aliæ alternæ* utrinque nudæ; quinta hinc tantum appendiculata.)

Cor. *Petala* quinque, obcordata, longitudine calycis, collo calycis inſerta.

Stam. *Filamenta* plurima, capillaria, breviſſima, calycis collo inſerta. *Antheræ* trigonæ.

Pist. *Germina* numeroſa, in fundo calycis. *Styli* totidem, villoſi, breviſſimi, collo calycis arcte compreſſi, lateri germinis inſerti. *Stigmata* obtuſa.

Per. *Bacca* carnoſa, turbinata, colorata, mollis, unilocularis, laciniis rudibus coronata, collo coarctata, e calycis tubo facta.

Sem. numeroſa, oblonga, hirta, undique calyci adnata.

Obs. Pericarpii calyx *baccam mentitur.*

Spec. 1) *Centifolia*, (hundertblätrige R.) germinibus ovatis, pedunculisque, hiſpidis caule hiſpido aculeato, petiolis inermibus: R. rubra plena ſpinoſiſſima. *Loc.* Hortis Eur. *Fl.* Odorat. Jun.-Aug. *Vis.* Corroborans, adſtring. *Uſ.* E petalis aqua ſuaveolens conficitur ad cibarios & medicos uſus.

2) *Canina*, (wilde Feld-Heck-R. Hagebutten,) germinibus ovat. pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Loc.* Sepibus. *Fl.* Incarnatus Jun. *Vis.* Roborans, adſtringens. *Uſ.* Ad Sepes, multis plantis annuis præſidium; baccis cynosbati (Hagbuzen, Hahnbutten,) ſiccatis iuſcula ſapida nutrientia, & panis conficiuntur.

3) *Alba*, (weiſſe Garten-R.) germinibus ovatis glabris, pedunculis hiſpidis, caule petiolisque acu-

aculeatis. *Loc.* Sepibus, flore pleno hortis. *Fl.* Alb. Jun. Jul. *Vis.* Analeptica, fragrans; eadem uti & uſus cum ſuperior. ſpeciebus.

201) RUBUS, (Hindbeere) Linn. G. 632.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ſpartitum: *laciniis* lanceolato-oblongis, patentibus, perſiſtentibus.
COR. *Petala* quinque, ſubrotunda, longitudine calycis, erecto-patentia, calyci inſerta.
STAM. *Filamenta* numeroſa, corolla breviora, calyci inſerta. *Antheræ* ſubrotundæ, compreſſæ.
PIST. *Germina* numeroſa. *Styli* parvi, capillares, e latere germinis orti. *Stigmata* ſimplicia, perſiſtentia.
PER. *Bacca* compoſita: *acinis* ſubrotundis, in capitulum convexum, infra concav. collectis, ſingulis unilocul.
SEM. ſolitaria, oblonga. *Receptaculum* pericarpiorum conicum.
OBS. Acini *Baccarum coaliti ſunt, in baccam compoſitam, nec ſine laceratione diſtinguibiles.*

SPEC 1) *Idæus*, gemeine ♄) fol. quinato-pinnatis, ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Loc.* Silvis & hortis fructu majore flavo rubro. *Vis.* Refrigerans, analeptica, adſtring. *Uſ.* Ad ſepes, ambulacra umbroſa; baccæ eſculentæ ſapidiſſimæ conditæ ad cibarium uſum, & ad vina grata: flor. apib. & bobus, capris, ovib. ſuib. pabulum herba.

2) *Fruticoſus*, (Brom-kraz-beer,) fol. quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis; fructu nigro. *Loc.* Sepibus, ſilvis. *Fl.* Alb. Jun. Jul. & baccæ acidulæ, eſculentæ Sept. *Uſ.* Ad ſepes, flor. apibus & baccæ coriis parandis.

202) FRAGARIA (Erdbeer) Linn. G. 633.

CAL. *Perianthium* monophyllum, planum, ſemidecemfidum: *laciniis alternis* exterioribus, anguſtioribus.
COR. *Petala* 5. ſubrotunda, patentia, calyci inſerta.
STAM. *Filamenta* viginti, ſubulata, corolla breviora, calyci inſerta. *Antheræ* lunulares.
PIST. *Germina* numeroſa, minima, in capitulum collecta. *Styli* ſimplices, lateri germinis inſerti. *Stigmata* ſimplicia.
PER. nullum. *Bacca fit Receptaculum commune ſeminum* rotundo-ovatum, baſi truncatum, pulpoſum, molle, magnum, coloratum, deciduum.
SEM.

Sem. numerosa, minima, acuminata, per superficiem receptaculi sparsa.

Obs. *Receptaculum commune bacca vulgo dicitur.*

Spec. *Vesca*, vulgaris, (esbare, gemeine wilde E.) flagellis reptans, fructu albo; sativa hortensis differt bacca a calyce non sponte secedente & ejusdem scrobiculis pro singulis seminibus. *Loc.* Silvis, pratis, hortis. *Fl.* Alb. Apr. Maj. *Vis.* Humectans, refrigerans, diuretica, baccar: adstring. radicis. *Us.* Baccæ crudæ cum saccharo lacte vel vino in deliciis sunt: folia bob. capr. ovibus, pabulum & flores apibus.

203) POTENTILLA, (Potentille) Linn. G. 634.

Cal. *Perianthium* monophyllum, planiusculum, semidecemfidum, *laciniis alternis* minoribus, reflexis.

Cor. *Petala* quinque, subrotunda, patentia, unguibus calyci inserta.

Stam. *Filamenta* viginti, subulata, corolla breviora, calyci inserta. *Antheræ* sublongo-lunulatæ.

Pist. *Germina* numerosa, minima, in capitulum collecta. *Styli* filiformes, longitudine staminum, lateri germinis inserti. *Stigmata* obtusa.

Per. nullum. *Receptaculum commune seminum* subrotundum, minimum, persistens, seminibus tectum, calyce inclusum. Sem. numerosa, acuminata.

Obs. *Deme unicam quintam partem numeri in omnibus partibus fructificationis, & habebis Tormentillam.* e. gr.

Spec. 1) *Anserina* (Gänserich, Grünsing,) foliis pinnatis, serratis, caule repente, pedunculis unifloris. *Loc.* Pascuis, ad vias. *Fl.* Flav. Maj.-Sept. *Us.* Radix esculenta loco panis, in annonæ penuria; bob. capr. ovib. equ. suibus pabulum & anatibus, coriis parandis herba.

2) *Reptans*, (Fünffingerkraut,) foliis digitatis, caule repente, pedunc. unifl. Pentaphyllum majus repens. *Loc.* Apricis argillosis. *Fl.* Flav. Jun. *Vis.* Vulneraria adstringens. *Us.* Bob. capr. ovibus, equis, suibus pabulum.

204) TORMENTILLA, (Blutwurz,) Linn. G. 635.

Cal. *Perianthium* monophyllum, planum, semioctofidum: *laciniis alternis* minoribus, acutioribus.

Cor.

Cor. *Petala* quatuor, obverſe cordata, plana, patentia, unguibus calyci inſerta.
Stam. *Filamenta* ſedecim, ſubulata, corolla dimidio breviora, calyci inſerta. *Antheræ* ſimplices.
Pist. *Germina* octo, parva, in capitulum conniventia. *Styli* filiformes, longitudine ſtaminum, lateri germinis inſerti. *Stigmata* obtuſa.
Per. nullum. (*Receptaculum ſeminum* minimum, ſeminibus onuſtum, calyce incluſum.
Sem. octo, oblonga, obtuſe acuminata.
Obs. *Tormentilla ſolo numero differt: a Potentilla hinc poſſent ambo genera combinari.*
Spec. *Erecta*, (gemeine-rechte-B. Ruhr-Heil-Wurz) caule erectiusculo, foliis ſeſſilibus. *Loc.* Paſcuis ſiccis, ſilvis. *Fl.* Maj. *Vis.* Adſtring. diuretica. *Uſ.* Bob. capris, ovibus, pabul. & rad. ſuibus ſaginatio, Lapponibus maſticata ad pigmentum corii rubrum.

205) GEUM (Merzwurz) Linn. G. 636.

Cal. *Perianthium* monophyllum, ſemidecemfidum, erectiuſculum: *laciniis alternis* minimis, acutis.
Cor. *Petala* quinque, rotundata: *unguibus* longitudine calycis anguſtis, calyci inſertis.
Stam. *Filamenta* numeroſa, ſubulata, longitudine calycis, cui inſerta. *Antheræ* breves, latiuſculæ, obtuſæ.
Pist. *Germina* numeroſa, in capitulum collecta. *Styli* lateri germinis inſerti, piloſi, longi. *Stigmata* ſimplicia.
Per. nullum. *Receptaculum commune ſeminum* oblongum, hirſutum, calyci reflexo impoſitum.
Sem. numeroſa, compreſſa, hiſpida, *Stylo* longo, geniculato inſtructa.
Spec. 1) *Urbanum*, (Gewürznelkenartige M. Benedictwurz,) florib. erectis, fructu globoſo villoſo, ariſtis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Loc.* Umbroſis, ſepibus. *Fl.* Jun. *Vis.* Adſtringens, pellens ſudorifera. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis ſuibus pabulum; radix vino & cereviſiæ addita eandem coryophylli odore inquinat, aceſcentiam avertit, coriis parandis.
2) *Rivale*, (Waſſer M. Bened. Wieſen Garaffel,) floribus nutantibus, fructu oblongo, ariſtis plumoſis. *Loc.* Pratis ſubhumidis, ſilvis. *Fl.* Maj. *Vis.* Adſtring. *Uſ.* Bob. capr. ov. equis, ſuib. pab.

Classis XIII.

POLYANDRIA. (Mit vielen dem Fruchtboden einverleibten Staubfäden,)

Ord. I. MONOGYNIA.

206) ACTÆA (Schwarzkraut) Linn. G. 644.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* subrotundis, obtusis, concavis, caducis.

COR. *Petala* quatuor, utrinque acuminata, calyce majora, caduca.

STAM. *Filamenta* plurima, (30. sæpius,) capillaria, superne latiora. *Antheræ* subrotundæ, didymæ, erectæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* nullus. *Stigma* crassiusculum, oblique depressum.

PER. *Bacca* ovali-globosa, glabra, unisulca, unilocularis.

SEM. plurima, semicircularia, introrsum truncata, gemino ordine incumbentia.

SPEC. *Spicata*, (ähriges S. gemein Christophskraut) racemo ovato, fructibusque baccatis, caule inermi, Aconitum bacciferum. *Loc.* Montosis, nemorosis. *Fl.* May. *Us.* Capris, ovib. pabul. baccæ ad pigmentum nigrum: bufones adlicit planta.

207) CHELIDONIUM, (Schölkraut) L. G. 647.

CAL. *Perianth.* diphyll. subrotundum *foliolis* subovatis, concavis, obtusis, caducis.

COR. *Petala* quatuor, subrotunda plana, patentia, magna, basi angustiora.

STAM. *Filamenta* plurima, (triginta) plana, superne latiora, corolla breviora. *Antheræ* oblongæ, compressæ, obtusæ, erectæ, didymæ.

PIST. *Germen* cylindraceum, longitudine staminum. *Stylus* nullus. *Stigma* capitatum, bifidum.

PER. *Siliqua* cylindracea, unilocularis, bivalvis.

SEM. plurima, ovata, aucta, nitida. *Receptaculum* lineare, inter valvulas, futuræ instar circumambiens, non dehiscens.

OBS. *Pericarpio siliquoso a Papavere diversum.*

SPEC. *Maius*, (Gras S. Schwalbenkraut,) pedunculis umbellatis, multifloris. *Loc.* Ruderatis, ad mu-

muros. *Fl.* May. Jun. *Vis.* Acris, corrodens ſucci e caule & radice rubra.

208) PAPAVER, (Mohn) Linn. G. 648.

CAL. *Perianthium* diphyll. ovatum, emarginatum; *foliolis* ſubovatis, concavis, obtuſis, caducis.

COR. *Petala* 4. ſubrotunda, plana, patentia, magna, baſi anguſtiora, *alterna* minora.

STAM. *Filam.* numeroſa, capillaria, corolla longe breviora. *Anth.* oblongæ, compreſſæ, erectæ, obtuſæ.

PIST. *Germen* ſubrotundum, magnum. *Stylus* nullus. *Stigma* peltatum, planum, radiatum.

PER. *Capſula* coronata, ſtigmate plano, magno, unilocularis, ſemimultilocularis, apice ſub corona foraminibus plurimis dehiſcens.

SEM. numeroſa, minima, *Receptacula* plicæ longitudinales, numero radiorum ſtigmatis parieti pericarpii adnatæ.

OBS. *Pericarpium diverſum eſt varia figura & globoſa & oblonga, nec non radiis ſtigmatis. Primaria diviſio ſpecierum a Pericarpio lævi & hiſpido deſumenda eſt.*

SPEC. 1) *Rhoeas*, (Klap-Klatſch-Korn-Roſen, Feldmohn, Schnallen,) capſulis glabris globoſis, caule piloſo, multifloro, foliis pinnatifidis, inciſis, fructu ovato. P. erraticum pleno flore. *Loc.* Agris. Hortis. *Fl.* Ruber Jun. Jul, *Vis.* Narcotica. *Uſ.* Flor. apibus.

2) *Somniferum*, (ſchlafmachender M. Oelmagen) calycibus, capſulisque glabris, foliis amplexicaulibus inciſis: hortenſe, ſemine nigro & albo; criſtatum floribus & ſemine album, vel floribus rubris ſemine nigro, flore pleno album. *Loc.* Cultis, hortis. *Fl.* Jun. Jul. *Vis.* Narcotica, anodyna, antiſpasmodica. *Uſ.* Culinar. olei e ſeminibus apib. flores.

209) NYMPHÆA, (Seeroſe) Linn. G. 653.

CAL. *Perianthium* inferum, tetraphyllum magnum, ſupra coloratum, perſiſtens.

COR. *Petala* numeroſa (quindecim ſæpe) calyce minora, germinis lateri inſidentia, ſerie plusquam ſimplici.

STAM. *Filamenta* numeroſa (ſeptuaginta ſæpe) plana, incurva, brevia. *Antheræ* oblongæ, filamentorum margini adnatæ.

PIST.

PIST. *Germen* ovatum, magnum. *Stylus* nullus. *Stigma* orbiculatum, planum, peltato, ſeſſile, radiis notatum, margine crenatum, perſiſtens.

PER. *Bacca* ovata, carnoſa, rudis, collo auguſtata, apice coronata, multilocularis (decem ad quindecim-loculis) pulpa plena, rubra.

SEM. plurima, ſubrotunda.

OBS. Calyx & Corolla *quoad numerum & figuram incerta ſunt, hinc.* Nymphæa *Boerh. calyce pentaphyllo, foliolis ſubrotundis, petalis minimis.*

Leuconymphæa *Boerh. calyce tetraphyllo, foliolis ovatis, corollam vix ſuperantibus.*

Nelumbo *Tournef. Pericarpium turbinatum truncatum, loculis monoſpermis, propriis foraminibus per diſcum ſtigmatis dehiſcentibus.*

SPEC. 1) *Lutea*, (gelbe S. See-Kannen-Plumpen,) foliis cordatis integerrimis, calyce petalis majore pentaphyllo. *Loc.* Ad littora. *Fl.* Jun. Jul. *Uſ.* Capr. pabul. ſuibus ſaginatio folia & radic. coriis parand. flores: ad tineas, gryllos domeſticos, fumo vel eſca.

2) *Alba*, (weiſſe S. Waſſer-Tulipan,) foliis cordat. integerrimis, calyce quadrifido. *Loc.* Aquoſis dulcib. *Fl.* Alb. Jul. *Vis.* Refrigerans, anodyna. *Uſ.* Capr. ſuibus pabul. coriis parandis flor.

210) TILIA, (Linde) Linn. G. 660.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, concavum, coloratum, magnitudine fere corollæ, deciduum.

COR. *Petala* quinque, oblonga, obtuſa, apice crenata.

STAM. *Filamenta* plurima (triginta & ſupra), ſubulata, longitudine corollæ. *Antheræ* ſimplices.

PIST. *Germen* ſubrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* pentagono-obtuſum.

PER. *Capſula* coriacea, globoſa, quinquelocularis, quinquevalvis, baſi dehiſcens.

SEM. ſolitaria, ſubrotunda.

OBS. Semen *unicum communiter adoleſcit, reliqua ad latus pellit, ut unilocularis videatur capſula incautis.*

SPEC. *Europæa*, (europ. L.) florib. nectario deſtitutis, femina folio majore. *Loc.* Cultis, pratis. *Fl.* Odoratus. Jun. Jul. *Vis.* Anodyna, antiſpasmod. refrigerans. *Uſ.* Folia bob. capr. ovibus equis

equis pabulum ad ambulacra umbrosa & sepes: cortex aqua maceratus funibus nassisque conficiendis; carbones pictoribus ad præludia figurarum, & in pulvere pyrio; lignum molle, leve, glabrum sculptoribus simulacrorum, sutoribus ad calcanea lignea, mensas, variasque res œconomicas, scriniariis: ob levitatem porositatem ad capisteria s. ventilabra ineptum.

211) CISTUS, (Cistenröslein,) Linn. G. 673.

CAL. *Perianth.* pentaphyll. persistens: *foliolis* subrotundis, concavis, quorum 2. *alterna* inferiora, minora.
COR. *Petala* 5. subrotunda, plana, patentia, maxima.
STAM. *Filamenta* numerosa, capillaria, corolla breviora. *Antheræ* subrotundæ, parvæ.
PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigma* planum, orbiculatum.
PER. *Capsula* subrotunda, obtecta calyce.
SEM. numerosa, subrotunda, parva.
OBS. *Character essentialis consistit in calycis foliolis duobus alternis minoribus.*
Helianthemum T. *capsula uniloculari, trivalui distincta fuit.*
Cistus *Tournef. capsula 5. vel decemloculari gaudet.*
SPEC. *Helianthemum*, (der Sonnenblume gleichendes C. Heiden-Isop-Schmuck, Sonnengünsel,) suffruticosus procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis, revolutis subpilosis. *Loc.* Apricis, pascuis siccis, viis montanis. *Fl.* Luteus May. Jun. *Vis.* Foliorum adstring. vulneraria. *Us.* Apibus flores.

POLYANDRIA
Ord. II. DIGYNIA.

212) PÆONIA, (Pfingstrose,) Linn. G. 678.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, parvum, persistens: *foliolis* subrotundis, concavis, reflexis, inæqualibus magnitudine & situ.
COR. *Petala* quinque, subrotunda, concava, basi angustiora, patentia, maxima.
STAM. *Filamenta* numerosa (300. circiter) capillaria, brevia,

brevia. *Antheræ* oblongæ, quadrangulæ, erectæ, quadriloculares, magnæ.

Pist. *Germ.* 2. ovata, erecta, tomentosa. *Styli* nulli. *Stigmata* compressa, oblonga, obtusa, colorata.

Per. *Capsulæ* totidem, ovato-oblongæ, reflexo-patentes, tomentosæ, uniloculares, univalves, longitudinaliter introrsum dehiscentes.

Sem. plura, ovalia, nitida, colorata, futuræ dehiscenti affixa.

Obs. Numerus germinis *naturalissimus videtur binarius, maxime tamen variat in speciebus: adquinarium numerum vix ascendit.*

Spec. *Officinalis*, (P. R. Gichtrose) foliis oblongis; femina fol. difformiter lobatis; mas fol. lobatis ex ovato lanceolatis. *Loc.* Hortis Europ. *Fl.* May. *Vis* Narcotica, antispasmodica, anodyna, pellens; foetida.

POLYANDRIA.
Ord. III. TRIGYNIA.

213) DELPHINIUM, (Ritterspor) Lin. G. 681.

Cal. nullus.

Cor. *Petala* 5. inæqualia, in orbem posita: quorum *α. supremum*, antice reliquis obtusus, emarginatum, postice extensum, in cornu tubulatum, rectum, longum, obtusum, desinens.

β. γ. δ. ε. reliqua ovato-lanceolata, patentia, fere æqualia.

Nectarium bifidum antice intra orbem petalorum positum a parte superiori, postice protensum. tubo petali α involutum.

Stam. *Filamenta* plurima (quindecim vel trigenta), subulata, minima, versus petalum α inclinata. *Antheræ* erectæ, parvæ.

Pist. *Germina* 3. vel 1. ovata, in *Stylos* longitudine staminum desinentia. *Stigmata* simplicia, reflexa,

Per. *Capsulae* totidem. ovato-subulatæ, rectæ, univalves, introrsum dehiscentes.

Sem. plurima, angulata, rugosa.

Spec. *Consolida*, (Feld R.) nectariis monophyllis, caule subdiviso: consolida regalis arvensis. *Loc.* Cultis, agris. flore pleno hortis. *Fl.* Cærul. &

ear-

carneus, Jun. Jul. *Uſ.* Flor apib. ſuccus, alumine mixtus ad pigmentum cæruleum & piſtoribus ſacharinis.

214) ACONITUM (Sturmhut) Linn. G. 682.

CAL. nullus.

COR. *Petala* 5. inæqualia, per paria oppoſita.
α *ſupremum* galeato-tubulatum, inverſum, dorſo ſurſum ſpectans, obtuſum, apice ad baſin reflexo, acuminato, cui apici baſis annectens oppoſita eſt.
β. γ. *lateralia duo*, lata, ſubrotunda, oppoſita, conniventia.
δ. ε. *infima duo*, oblonga, deorſum ſpectantia.
Nectaria duo, ſub petalo α. recondita, fiſtuloſa, nutantia, ore obliquo cauda, recurva, pedunculis ſubulatis, longis inſidentia. 1. ſquamulæ 6. breviſſimæ coloratæ in orbem cum nectariis.

STAM. *Filam.* plurima, ſubulata, minima, baſi latiora, verſus petalum α. inclinata. *Antheræ* erectæ, parvæ.

PIST. *Germina* 3. (5.), oblonga. definentia in *Stylos*, longitudine ſtaminum. *Stigmata* ſimplicia, reflexa.

PER. *Capſulae* totidem, ovato-ſubulatæ, rectæ, univalves, introrſum definentes.

SEM. plurima, angulata, rugoſa.

SPEC. 1) *Lycoctonum*, (gelber S. gelb Eiſenhütte, Wolfsgift.) foliis palmatis, multifidis, villoſis, peltatis, petalo ſupremo cylindraceo. *Loc.* Montoſis. *Fl.* Luteus Jun. Jul. *Uſ.* Decoctum muſcas, cimices pediculos pecorum necat, & radix lupos.
2) *Napellus*, (blauer St. Narrenkappe, Wolfskr.) foliorum laciniis linearibus ſuperne latioribus linea exaratis. *Loc.* Cultis humidiuſculis, hortis. *Fl.* Cærul. Jul. *Vis.* Corrodens, draſtica, vomitoria, pellens, ſudorifera; acris, toxica: ad Ill. Stoerk exper. proficua in dolore iſchiadico, ſcirrho, arthritide, tophis venereis, gonorrhoea, &c. OBS. omnia necat pecora.
Uſ. Ad Lupos carne mixtum, Ruſſis. pecorib. etiam lethale.

POLI-

POLYANDRIA,
Ord. IV. PENTAGYNIA.

215) AQUILEGIA, (Agley,) Linn. G. 684.

Cal. nullus.

Cor. *Petala* 5. lanceolato-ovata, plana, patentia, æqualia. *Nectaria* 5. æqualia, cum petalis alterna: *ſingulum* corniculatum, ſuperne ſenſim latius, ore obliquo extrorſum, aſcendente, introrſum receptaculo annexo; inferne productum in tubum, longum, attenuatum, pendulum, apice obtuſo.

Stam. *Filamenta* plurima (30 ad 40.) ſubulata, exteriora breviora. *Antheræ* oblongæ, erectæ, altitudine nectariorum.

Pist. *Germina* 5. ovato-oblonga, deſinentia in *Stylos* ſubulatos, ſtaminibus longiores. *Stigmata* erecta, ſimplicia.

Paleæ 10. rugoſæ, breves, germina diſting. involvunt.

Per. *Capſulæ* 5. cylindraceæ, parallelæ, erectæ, acuminatæ, univalves, ab apicibus introrſum dehiſcentes.

Sem. plurima, ovata, carinata, ſuturæ dehiſcenti annexa.

Spec. *Vulgaris* (gem. A.) nectariis incurvis: hortenſis multiplex flore magno pleno inverſo, variegato. *Loc.* Cultis, nemoroſis, montoſis, hortis. *Fl.* Cærul. May. Jun. *Uſ.* Capr. ovib. pabulum & flores apibus.

216) NIGELLA, (Schwarzkümmel) Linn. G. 685.

Cal. nullus. (*Cave folia ne floralia in quibuſdam pro perianthio ſumas.*)

Cor. *Petala* quinque, ovata, plana, obtuſa, patentia, baſi contractiora.

Nectaria 8. in orbem poſita, breviſſima: *ſingulum* bilabiatum: *Labio exteriore* majore, inferiore, bifido, plano, convexo, punctis duobus notato.

L. interiore breviore, anguſtiore, ex ovato in lineam deſinente.

Stam. *Filamenta* numeroſa, ſubulata, petalis breviora. *Antheræ* compreſſæ, obtuſæ, erectæ.

Pist. *Germina* nonnulla (5. vel 10.), oblonga, convexa, compreſſa, erecta, deſinentia in *Stylos* ſubulatos, angulatos, longiſſimos, ſed revolutos, perſiſtentes. *Stigmata* longitudinalia, adnata.

Per.

ER. *Capſulæ* totidem, oblongæ, compreſſæ, acuminatæ, futura introrſum connexæ, ſuperne introrſum dehiſcentes.
EM. plurima, angulata, ſcabra.
SPEC. *Sativa*, (zahmer S. ſchwarzer Kümmich, Coriander, Spargenſaamen,) piſtillis quinis, capſulis muſicatis, ſubrotundis, foliis ſubpiloſis: Melanchium ſativum. *Loc.* Hortis Europæ. *Fl.* Albo-cærul. Jul. *Vis.* Seminis aperiens, pellens, errhina acris.

POLYANDRIA
Ord. VI. POLYGYNIA.

17) ANEMONE, (Anemone, Kuchenſchelle,) Linn. G. 694.

AL. nullus.
OR. *Petala* duorum, triumve ordinum. In ſingula ſerie tria, oblongiuſcula.
TAM. *Filamenta* numeroſa, capillaria, corolla dimidio breviora. *Antheræ* didymæ, erectæ.
IST. *Germina* numeroſa, in capitulum collecta. *Styli* acuminati. *Stigmata* obtuſa.
ER. nullum. *Receptaculum* globoſum, vel oblongum, excavato-punctatum.
EM. plurima, acuminata, ſtylum retinentia.
BS. *Diviſionem recentiorum a ſeminibus abſolute negat Natura.*
SPEC. 1) *Pulſatilla*, (gemeine groſſe K. Oſterblume.) pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis, involucro foliaceo multifido ſeminibus, caudatis piloſis. *Loc.* Apricis, collibus exaridis, ſilvis. *Fl.* Jun. *Vis.* Corrodens, acris, ad cel. Stoerck experim. in variis malis venereis, & oculorum proficua. *Uſ.* Apib. flor. corollæ ſuccus viridem exhibet tincturam pro ſcriptura.
2) *Pratenſis*, (Wieſen K. Windblume.) pedunculo involucr. petalis apice reflexis, fol. bipinnatis. *Loc.* Aridis, pratis. *Fl.* Jun. apibus.
3) *Hortenſis*, (Garten A.) fol. digitatis, geranii rotundo folio, purpuraſcens. *Loc.* Hortis. *Fl.* Jun. apibus.

4) Nemoroſa, (wilde weiſſe Wald A. Windblume,) ſeminibus acutis, foliolis inciſis, caule unifloro. *Loc.* Nemoroſis, aſperis. *Fl.* Mart. Apr. *Vis.* Corrodens, acris. Obs. Bobus mictum cruentum & ovibus diarhoeam excitat.

218) CLEMATIS (Waldrebe,) Linn. G. 696.

Cal. nullus.
Cor. *Petala* quatuor, oblonga, laxa.
Stam. *Filamenta* plurima, ſubulata, corolla breviora. *Antheræ* lateri filamentorum adnatæ.
Pist. *Germina* plurima, ſubrotunda, compreſſa, deſinentia in *Stylos* ſubulatos, ſtaminibus longiores. *Stigmata* ſimplicia.
Per. nullum. *Receptaculum* capitatum, parvum.
Sem. plurima, ſubrotunda, compreſſa, ſtylo (figura varia) inſtructa.
Obs. Clematitis. *Petala lanceolata. Semina ſeta villoſa longiſſima.* 12.
Flammula *Piſtilla octo. Semina orbiculata pluma longiſſima.* 10. 11.
Spec. 1) *Vitalba* (gemeine W. Lienen,) fol. pinnatis, foliol. cordatis ſcandentibus. *Loc.* Montoſis, ſepibus. *Fl.* Jul.
2) *Flammula*, (Brennwurzel, brennende W.) foliis inferiorib. pinnatis ſcandentib. laciniatis, ſummis ſimplicib. integerrimis lanceolatis. *Loc.* Sepibus. *Fl.* Jul. *Vis.* Acris, corrodens.

219) THALICTRUM, (Wieſenraute,) L.G. 697.

Cal. nullus: (niſi corollam velis.)
Cor. *Petala* 4. ſubrotunda, obtuſa, concava, caduca.
Stam. *Filamenta* plurima, ſuperne latiora, compreſſa, corolla longiora. *Antheræ* oblongæ, erectæ.
Pist. *Styli* plurimi, breviſſimi. *Germina* plura pedicellata ſæpius, ſubrotunda. *Styli* nulli. *Stigmata* craſſiuſcula.
Per. nullum.
Sem. plura, ſulcata, ovata, mutica.
Spec. *Flavum*, (blasgelbe W. Unſtetkraut, falſche Rhabarber,) caule folioſa ſulcato, paniculæ multiplici erecta. *Loc.* Montoſis, ſubhumidis. *Fl.* Flavus Jun. *Uſ.* Foliorum pecoribus, pabul. & luteo tinctor. flor. apibus.

220) ADO-

220) ADONIS, (Adonis,) Linn. G. 698.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* obtusis, concavis, coloratiusculis, deciduis.
COR. *Petala* 5. ad 15. oblonga, obtusa, nitida.
STAM. *Filamenta* plurima, breviſſima, ſubulata. *Antheræ* oblongæ, inflexæ.
PIST. *Germina* numeroſa, in capitulum collecta. *Styli* nulli *Stigmata* acuta, reflexa.
PER. nullum. *Receptaculum* oblongum, ſpicatum.
SEM. numeroſa, irregularia, angulata, baſi gibba, apice reflexa, prominula, mutica.
SPEC. 1) *Æſtivalis*, (wilder Feld Sommer A. Feld-Acker- Marien-Rösle;) florib. pentapetalis, fructibus ovatis. *Loc.* Inter Segetes. *Fl.* Subruber. May. Jun. *Uſ.* Flor. apibus.
2) *Autumnalis*, (Herbſt A. Feuerröslein,) florib. octopetalis fructib. ſubcylindricis. *Loc.* Agris. *Fl.* Atro-rubens. May.

221) RANUNCULUS, (Hanenfus,) Lin. G. 699.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* ovatis, concavis, coloratiuſculis, deciduis.
COR. *Petala* quinque, obtuſa, nitida, *unguibus* parvis. *Nectarium* eſt fovea in ſingulo petalo ſupra unguem.
STAM. *Filamenta* plurima, corolla dimidio breviora. *Antheræ* erectæ, oblongæ, obtuſæ, didymæ.
PIST. *Germina* numeroſa, in capitulum collecta. *Styli* nulli. *Stigmata* reflexa, minima.
PER. nullum. *Receptaculum* pedunculis minutiſſimis femina adnectit.
SEM. plurima, irregularia, figura incerta, apice reflexo.
OBS. Eſſentia *conſiſtit in Nectario. Syſtem: Natur: Reliquæ inconſtantes ſemper ſunt partes fructificationis, hinc Nectario incognito, tanta confuſio generis.*
Nectarium *hoc in aliis* porus *nudus, in aliis margine cylindraceo cinctus, in aliis ſquamula emarginata clauſus.*
Ficaria 9. 8. *calyx triphyllus, petala plura.*
Aliis *ſemina ſubrotunda, aliis depreſſa, echinata, pauciora: hederaceus.*
37. Stamina modo 5. falcatus 36. ſemina cauda enſiformi & calyx baſi appendiculatus: ſceleratus 15. receptaculum ſubulatum, & fructus ſpicatus.
SPEC. 1) *Ficaria*, chelidonium minus. (Schar-

bockskraut, Gold-Schmalz-Sternblume, klein Schölkraut, wild Löffelkraut) fol. cordatis angulatis petiolatis, *Loc.* Ruderatis, umbrosis, sepibus pratis. *Fl.* Mart.-May. *Us.* Capr. ovibus pabul. & apibus flor. folia ad olera.

2) *Sceleratus*, (brennender Wasser-H.) foliis inferioribus palmatis summis digitatis, fructibus oblongis. *Loc.* Humidis, pratis pascuis. *Fl.* Jan. Apr. *Vis.* Corrodens, acris; noxia.

3) *Repens*, (kriechender H.) calycibus patulis, pedunculis sulcatis, sarmentis repentibus, foliis compositis. *Loc.* Cultis, hortis, pratis, ad muros. *Fl.* Flav. May. *Us.* Capr. equis pabul. folia in annonæ penuria ad olera.

4) *Acris*, (scharfer brennender H. Schmalzblume,) calycib. patulis, pedunculis teretib. fol. tripartito-multifidis, summis linearibus: hortensis, flore flavo pleno. *Loc.* Montosis pratis. *Fl.* May. Us. Capr. ovib. pabul. & apibus.

222) TROLLIUS, (Engelblume, Trolblume,) Linn. G. 700.

Cal. nullus.

Cor. Petala 14. circiter, subovata, decidua in seriebus exterioribus tribus terna; in intima serie quina. *Nectaria* 9. linearia plana, incurva, basi introrsum perforata.

Stam. *Filamenta* numerosa, setacea, corolla, breviora. *Antheræ* erectæ.

Pist. *Germina* numerosa, sessilia, columnaria; *Styli* nulli. *Stigmata* mucronata, Staminibus breviora.

Per. *Capsulæ* numerosæ, in capitulum collectæ, ovatæ, acumine recurvo. Sem. solitaria.

Spec. *Europæus*, (Europ. E. gefüllte Bergranunkel,) corollis conniventibus nectariis longitudine staminum. *Loc.* Cultis, pratis. *Fl.* Flav. Jun. *Us.* Apibus flores pabulum.

223) HELLEBORUS, (Nieswurz,) Linn. G. 702.

Cal. nullus: (nisi corollam in quibusdam persistentem habeas.)

Cor. *Petala* quinque, subrotunda, obtusa, magna. *Nectaria* plura, breviſſima, in orbem posita, monophylla, tubulata, inferne angustiora, ore bilabiato, erecto, emarginato, interiore breviore.

Stam.

STAM. *Filamenta* numerosa, subulata. *Antheræ* compressæ, inferne angustiores, erectæ.
PIST. *Germina* subsena, compressa. Styli subulati *Stigmata* crassiusscula.
PER. *Capsulæ* compressæ, bicarinatæ, *carina inferiore* breviore, *superiore* convexa, dehiscente.
SEM. plura, rotunda, suturæ affixa.
OBS. *hyemalis petala dimittit, reliquæ petala retinent viridia facta.*

SPEC. 1) *Hyemalis*, (Christwurz,) flore folio insidente. *Loc.* Hortis Eur. *Fl.* Luteus Dec.
2) *Niger*, (Schwarze N.) scapo subunifloro subnudo, fol. pedatis. *Loc.* Hortis Eur. *Fl.* Roseus. Sept-Dec. *Vis.* Drastica, emetica, pellens, acris.
3) *Foetidus*, (stinckend. N.) caule multifloro folioso, fol. pedatis. *Loc.* Montosis. *Fl.* May-Aug. *Vis.* Purgans, emetica, antiverminosa.

224) CALTHA (Dotterblume, Schmalzblume,) Linn. G. 703.

CAL. nullus.
COR. *Petala* quinque ovata, plana, patentia, decidua, magna.
STAM. *Filamenta* numerosa, filiformia, corolla breviora. *Antheræ* compressæ, obtusæ, erectæ.
PIST. *Germina* 5. ad 10. oblonga, compressa, erecta, *Styli* nulli. *Stigmata* simplicia.
PER. *Capsulae* totidem, breves, acuminatæ, patentes, bicarinatæ, sutura superiore dehiscentes.
SEM. plurima, subrotunda, aucta, suturæ superiori affixa.

SPEC. *Palustris*, (Sumpf D. S. Kuh-Bach-Moos-Blumen, gelbe Wiesenblume,) flore simplici & pleno. *Loc.* Humidiusculis, pratis. *Fl.* Flav. Apr. May. *Us.* Capr. ovib. pabul. & apibus: flores nondum explicati. more Capparidum præparati, succedaneum sunt capparidum: corollæ succus alumine coctus ad atramentum luteum.

Classis IV.

DIDYNAMIA, (zwey paar ungleich lange Staubfäden.)

CAL. *Perianthium* monophyllum, erectum, tubulatum,

tum, quinquefidum, ſegmentis inæqualibus, perſiſtens.

Cor. monopetala, erecta, cujus *baſis* tubulata mel continet, & nectarii vices ſubit.
Limbus autem communiter ringens, *Labio ſuperiori* recto, *L. inferiori* patente, trifido, *medio* latiore.

Stam. *Filamenta* quatuor linearia, corollæ tubo inſerta, verſus dorſum ejus inclinata, quorum *duo* intermedia & proxima breviora; omnia parallela, longitudinem corollæ raro ſuperantia. *Antheræ* a labio ſuperiore corollæ ſæpius tectæ, & per paria conniventes.

Pist. *Germen* ſæpius ſupra receptaculum. *Stylus* unicus, filiformis, eodem modo quo filamenta inflexus, intra ea ſæpius poſitus, longitudine parum ſuperans, ſummitate leviter incurvatus, *Stigma* communiter bifidum.

Pericarp. *vel* nullum, (*Gymnoſpermum,*) *vel* præſens, (Angioſpermum,) ſæpius biloculare.

Sem. *vel* (ſi pericarpium nullum) quatuor, in ſinu calycis tanquam capſula recondita, *vel* (ſi pericarpium aliquod) plura, affixa receptaculo, in medio pericarpii poſito.

Obs. *Flores hujus familiæ maximam partem erecti fere, ſed parum a caule ad angulum acutum inclinati, quo corolla facilius tegat antheras, nec a pluvia combibatur, ſed pollen cadat ſuper Stigma.*

Eſſentialis Character conſiſtit in ſtaminibus quatuor, quorum duo *propiora breviora, conniventia, cum Piſtilli ſtylo unico, intra corollam inæqualem recepta.*

Ord. I. GYMNOSPERMIA, (Mit nackenden Saamen.)

225) AJUGA (Günſel,) Linn. G. 705.

Cal. *Perianthium* monophyllum, breve, ſemiquinquefidum, fere æquale, perſiſtens.

Cor. monopetala, ringens. *Tubus* cylindraceus, incurvus. *Labium ſuperius* minimum, erectum, bifidum, obtuſum. *L. inferius* magnum, patens, trifidum, obtuſum, *lacinia media* maxima, obcordata, *lateralibus* parvis.

Stam. *Filam.* quatuor, ſubulata, erecta, labio ſuperiore longiora, quorum *duo* breviora. *Antheræ* didymæ.

Pist. *Germen* quadripartitum. *Stylus* filiformis, ſitu

&

& longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, tenuia, quorum *inferius* brevius eſt.

PER. nullum. *Calyx* connivens, in ſinu ſemina fovens.

SEM. quatuor, oblongiuſcula.

SPEC. 1) *Pyramidalis*, (gülden G.) tetragono pyramidalis, villoſa, fol. radicalibus maximis. *Loc.* Montoſis, pratis, viis. *Fl.* Cærul. May. *Vis.* Subadſtring. vulnerar.

2) *Reptans*, (ſchleichender G. Heilkraut,) ſtolonibus reptantibus, fol. obverſe - ovatis crenatis, caule ſimpliciſſimo. *Loc.* Pratis, rivulis. *Fl.* cærul. & alb. Mart. - May. *Vis.* Adſtring. anodyna; amara. *Uſ.* Capr. ovib. pabulum.

226) TEUCRIUM, (Gamander,) Linn. G. 706.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ſemiquinquefidum, acutum, fere æquale, baſi hinc gibbum, perſiſtens.

COR. monopetala, ringens. *Tubus* cylindraceus, brevis, in faucem incurvatam deſinens.

Labium ſuperius erectum, acutum, ultra baſin profunde bipartitum, diſtantibus ad latera *laciniis.*

Lab. inferius patens, trifidum, *laciniis lateralibus* figura labii ſuperioris, erectiuſculis, *media* maxima, ſubrotundata.

STAM. *Filamenta* quatuor, ſubulata, labio ſuperiori corollæ longiora, interque ejus diviſuram, adſcendentia, prominentia. *Antheræ* parvæ.

PIST. *Germen* quadripartitum. *Stylus* filiformis, ſitu & magnitudine ſtaminum. *Stigmata* duo tenuia.

PER. nullum. *Calyx* immutatus, in fundo ſemina fovens.

SEM. quatuor, ſubrotunda.

OBS. *Corollæ Labium ſuperius ultra baſin diviſum & dehiſcens, refert corollam labio ſuperiore deſtitutam.*

Chamædrys T. *Flores ex foliorum alis, calyx tubulatus.*

SPEC. 1) *Scordium*, (Lachen, Knoblauch,) fol. oblongis ſeſſilibus dentato - ſerratis, florib. geminis. lateralibus pedunculatis, caule diffuſo. *Loc.* Paludoſis. *Fl.* Jul. *Vis.* Balſamica, tonica, pellens, acris, aromatica. *Uſ.* Capr. ovib. pabul. graveolens lac alliaceo inficit odore.

2) *Chamædris*, (Bathengel. Edel - Gamanderle,) fol. cuneiformi-ovatis inciſis crenatis petiolatis, floribus ſubverticillatis ternis petiolatis. *Loc.* Montoſis. *Fl.* Purpur. Jun. Jul. *Vis.* Eadem cum Teucr. Scord.

227) SATUREJA, (Saturey.) Linn. G. 707.

CAL. *Perianthium* monophyllum tubulatum, ſtriatum, erectum, perſiſtens: *ore* quinquedentato, fere æquali, erecto.

COR. monopetala, ringens. *Tubus* cylindraceus, calyce brevior. *Faux* ſimplex. *Labium ſuperius* erectum, obtuſum, acute emarginatum, longitudine labii inferioris: *Lab. inferius* tripartitum, patens: *laciniis* obtuſis, æqualibus: *media* paulo majori.

STAM. *Filamenta* quatuor, ſetacea, diſtantia, longitudine vix labii ſuperioris, quorum *duo* inferiora paulo breviora. *Antheræ* conniventes.

PIST. *Germen* quadrifidum. *Stylus* ſetaceus, longitudine corollæ. *Stigmata* duo, ſetacea.

PER. nullum. *Calyx* connivens, in fundo ſemina fovens.

SEM. quatuor, ſubrotunda.

SPEC. *Hortenſis*, ſativa, (Garten S. Garten Iſop, Bohnenkraut,) pedunculis biſloris: thymus erectus annuus, fol. lanceolato-linearibus. *Loc.* Eur. hortis. *Fl.* Jul. *Vis.* Herbæ odoratæ reſolvens, excitans, pellens, aromatica.

228) HYSSOPUS, (Iſop) Linn. G. 709.

CAL. *Perianthium* monophyllum, cylindraceum, oblongum, ſtriatum, acute quinquedentatum, perſiſtens.

COR. monopetala, ringens. *Tubus* cylindraceus, tenuis, longitudine calycis. *Faux* inclinata. *Labium ſuperius* rectum, planum, breve ſubrotundum, emarginatum: *L. inferius* trifidum, *lacinulis lateralibus* brevioribus, obtuſis, *intermedia* crenata, obcordata, acuta, lobis diſtantibus.

STAM. *Filamenta* quatuor, erecta, corolla longiora, diſtantia, quorum ſuperiora *duo breviora*, *duo* vero *longiora* labio inferiori propiora. *Antheræ* ſimplices.

PIST. *Germen* quadripartitum. *Stylus* ſiliformis, ſub labio ſuperiori, ejusque longitudine. *Stigma* bifidum.

PER. nullum. *Calyx* ſemina in ſinu continens.

SEM. quatuor, fere ovata.

SPEC. *Officinalis*, (gewöhnl. I. Iſpen,) ſpicis ſecundis. *Loc.* Eur. hortis. *Fl.* Cærul. & ruber. Jul. *Vis.* Balſamica, tonica, expectorans herbæ ſuaveolentis.

229) NE-

229) NEPETA, (Kazenmünze,) Linn. G. 710.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, cylindraceum: *ore* quinquedentato, acuto, erecto: *denticulis ſuperioribus* longioribus, *inferioribus* magis patulis.

COR. monopetala, ringens. *Tubus* cylindraceus, incurvus. *Limbus* dehiſcens. *Faux* patens, cordata, in lacinias duas reflexas obtuſas, breviſſimas terminata. *Labium ſuperius* erectum, ſubrotundum, emarginatum: *Lab. inferius* ſubrotundum, concavum, majus, integrum, crenulatum.

STAM. *Filamenta* quatuor, ſubulata, ſub labio ſuperiori poſita, approximata, quorum *duo* breviora. *Antheræ* incumbentes.

PIST. *Germen* quadrifidum. *Stylus* filiformis, longitudine & ſitu ſtaminum. *Stigma* bifidum, acutum.

PER. nullum. *Calyx* rectus, ſemina in ſinu continens.

SEM. quatuor, ſubovata.

OBS. *Si lacinias faucis labio inferiori annumeres, erit labium inferius tripartitum.*

SPEC. *Cataria*, (gemeine K. M.) florib. ſpicatis, verticillis ſubpedicellatis, foliis petiolatis, cordatis dentato ſerratis. *Loc.* Humidis, foſſis. *Fl.* Jul. Aug. *Vis.* Pellens, acris, aromatica.

230) LAVANDULA, (Lavandel,) Linn. G. 711.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ovatum, *ore* obſcure dentatum, breve, perſiſtens, bractea ſuffultum.

COR. monopetala, ringens, reſupinata. *Tubus* cylindraceus, calyce longior. *Limbus* patens.

Labium ſuperius majus, bifidum, patens: *L. inferius* trifidum, *laciniis* omnibus ſubrotundis, & fere æqualibus.

STAM. *Filamenta* quatuor, brevia, intra tubum corollæ, deflexa, quorum *duo* breviora. *Antheræ* parvæ.

PIST. *Germen* quadripartitum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stigma* bilobum, obtuſum, connivens.

PER. nullum. *Calyx* ore connivens, ſemina fovens.

SEM. quatuor, fere ovata.

SPEC. *Spica*, (L. Lavander, Spicke,) fol. lanceolatis integerrimis, ſpicis nudis: latifolia, anguſtifolia. *Loc.* Eur. hortis. *Fl.* Cærul. Jul. *Vis.* Nervina, cephalica: & apibus flores.

231) MENTHA, (Münze,) Linn. G. 713.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, erectum, quinquedentatum, æquale, perſiſtens.

COR. monopetala. *Petalum* erectum, tubulatum, calyce paulo longius. *Limbus* quadripartitus, fere æqualis; *lacinia ſuperiori* latiore, emarginata.

STAM. *Filamenta* quatuor, ſubulata, erecta, diſtantia, quorum *duo* proxima longiora. *Antheræ* ſubrotundæ.

PIST. *Germen* quadrifidum. *Stylus* filiformis, erectus, corolla longior. *Stigma* bifidum, patens.

PER. nullum. *Calyx* erectus, in ſinu ſemina fovens.

SEM. quatuor, parva.

SPEC. *Criſpa*, (krauſe Münze,) ſpicis capitatis, fol. cordatis, dentatis, undulat. ſeſſilib ſtaminibus corollam æquantibus. *Loc.* Hortis Eur. *Fl.* Jul. Aug. *Vis.* Herbæ odoratæ reſolvens, pellens, carminativa; amaricans. *Uſ.* Apib. flores.

2) *Arvenſis*, (kleine Acker-Feld M.) floribus verticillatis, fol. ovatis, acutis, ſerratis, ſtaminibus corollam æquantibus. *Loc.* Agris. *Fl.* Aug. Sept. *Uſ.* Apib. flores & capr. ovib. equis pabul.

232) GLECHOMA, (Gunderman,) Lin. G. 714.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, cylindraceum, ſtriatum, minimum, perſiſtens, *ore* quinquedentato, acuminato, inæquali.

COR. monopetala, ringens. *Tubus* tenuis, compreſſus. *Labium ſuperius* erectum, obtuſum, ſemibifidum: *Lab. inferius* patens, majus, obtuſum, trifidum, *lacinia intermedia* majori, emarginata.

STAM. *Filamenta* quatuor, ſub labio ſuperiore, quorum *duo* breviora. *Antherarum* ſingulum par connivens in formam crucis.

PIST. *Germen* quadrifidum. *Stylus* filiformis, ſub labio ſuperiori inclinatus. *Stigma* bifidum, acutum.

PER. nullum. *Calyx* in ſinu ſemina fovens.

SEM. quatuor, ovata.

SPEC. *Hederacea*, (Epheublätricher G. Gundelrebe,) fol. reniformibus crenatis. *Loc.* Sepibus, ad vias. *Fl.* Apr. May. *Vis.* Adſtring. vulneraria; amara. *Uſ.* Plantæ odoratæ ovib. equis pabul. & flores apib. ad cereviſiæ clarificationem.

233) LA-

233) LAMIUM, (Taubeneſſel,) Linn. G. 716.

Cal. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, ſuperne patentius, quinque dentatum, ariſtatum, fere æquale, perſiſtens.

Cor. monopetala, ringens. *Tubus* cylindraceus, breviſſimus. *Limbus* dehiſcens. *Faux* inflata, compreſſa, gibba, margine utroque denticulo reflexo terminata. *Labium ſuperius* fornicatum, ſubrotundum, obtuſum, integrum: *Lab. inferius* brevius, obcordatum, emarginatum, reflexum.

Stam. *Filamenta* quatuor, ſubulata, ſub labio ſuperiori, tecta, quorum *duo* longiora. *Antheræ* oblongæ, hirſutæ.

Pist. *Germen* quadrifidum. *Stylus* filiformis, longitudine & ſitu ſtaminum. *Stigma* bifidum, acutum.

Per. nullum. *Calyx* apertus, ſemina ſuperne plana in ſinu gerens.

Sem. quatuor, brevia, triquetra, hinc convexa, utrinque truncata.

Spec. 1) *Album*, (weiſſer T. Bienenſaug, weiſſe groſſe- todte- Neſſel,) fol. cordatis acuminatis petiolatis, verticillis vigintifloris, non foetens, folio oblongo. *Loc.* Cultis, ſepibus, muris. *Fl.* Alb. Apr. May. *Uſ.* Bob. capr. ovibus pabul. & flor. apibus: folia ad olera.

2) *Purpureum*, (rothe purpurfarbne T.) fol. cordatis obtuſis petiolatis; foetidum, fol. ſubrotundo. *Loc.* Cultis, ſepib. muris. *Fl.* Ruber May-Dec. *Uſ.* Capr. ovib. equ. pabul. & apibus.

234) GALEOPSIS, (Kazengeſichte,) Lin. G. 717.

Cal. *Perianthium* monophyllum. tubulatum, 5. dentatum acuto-ariſtatum, deſinens in ariſtas, deſinens in ſetas, longitudine ipſius tubi, perſiſtens.

Cor. monopetala, ringens. *Tubus* brevis. *Limbus* dehiſcens.

Faux tubo paulo latior, calycis longitudine, ad baſin labii inferioris utrinque denticulum acuminatum, ſubtus concavum exſerens. *Labium ſuperius* ſubrotundum, concavum apice ſerratum: *Lab. inferius* trifidum, *laciniis lateralibus* ſubrotundis, *media* majore, emarginata, crenata.

Stam.

STAM. *Filamenta* quatuor, ſubulata, ſub labio ſuperiori recondita, quorum *duo* breviora. *Antheræ* ſubrotundæ, bifidæ.

PIST. *Germen* quadrifidum. *Stylus* filiformis, longitudine & ſitu ſtaminum. *Stigma* bifidum, acutum.

PER. nullum. *Calyx* rigidus, rectus, in fundo ſemina continens.

SEM. quatuor, triquetra, truncata.

SPEC. 1) *Ladanum*, (Feld K. Kornwuth, kleine rothe Hanfneſſel,) internodiis caulinis æqualibus, verticillis omnibus remotis; ramis ſummis pubeſcentibus corollæ labium ſuperius vix crenatum apice ſubreflexo. *Loc.* Arvis, campis ſabuloſis, ſepib. *Fl.* Ruber Aug. Sept. *Uſ.* Apib. flores & bob. capr. ovib. pabulum.

2) *Galeobdolon* (gelbes K. gelber Hechtzahn, gelbe Taubeneſſel) verticillis ſexfloris, involucro tetraphyllo; fol. ovatis ſerratis acutis. *Loc.* Montoſis, nemoribus. *Fl.* Luteus May. *Uſ.* Apibus flores.

235) BETONICA, (Betonien) Linn. G. 718.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum cylindricum, 5dentatum, perſiſtens, ariſtatum.

COR. monopetala, ringens. *Tubus* incurvus, cylindricus, *Labium ſuperius* ſubrotundum, integrum, planum, erectum: *Lab. inferius* trifidum, *lacinula media* latiore, ſubrotunda, emarginata.

STAM. *Filamenta* quatuor, ſubulata longitudine faucis, quorum *duo* breviora, ad labium ſuperius inclinata. *Antheræ* ſubrotundæ.

PIST. *Germen* quadripartitum. *Stylus* figura, ſitu, & magnitudine ſtaminum. *Stigma* bifidum.

PER. nullum. *Calyx* in finu ſemina fovens.

SEM. quatuor, ovata.

SPEC. *Officinalis*, (gewöhnl. braune B.) ſpica interrupta, corollarum lacinia labii intermedia emarginata. *Loc.* Silvis. *Fl.* Jul. *Vis.* Nervina, errhina, vulneraria. *Uſ.* Ovibus pabulum & apibus.

236) STACHYS, (Rospoley, Bulkiskraut.) Linn. G. 719.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, angulatum

latum, ſemiquinquefidum, acuminatum, perſiſtens, *denticulis* acuminatis, ſubulatis, ſub inæquale.

Cor. monopetala, ringens. *Tubus* breviſſimus. *Faux* oblonga, ad baſin deorſum gibba. *Labium ſuperius* erectum, ſubovatum, fornicatum, ſæpe emarginatum: *Lab. inferius* majus, lateribus reflexum, trifidum, *lacinula intermedia* maxima, emarginata, replicata.

Stam. *Filamenta* quatuor, quorum *duo* breviora, ſubulata, ad latera faucis recurvata. *Antheræ* ſimplices.

Pist. *Germen* quadripartitum. *Stylus* filiformis, ſitu & longitudine ſtaminum. *Stigma* biſidum, acutum.

Per. nullum. *Calyx* vix mutatus.

Sem. quatuor, ovata, angulata.

Spec. 1) *Silvatica*, (groſſe ſtinckende Taubeneſſel,) Bienſaug,) verticillis ſexfloris, fol. cordat. acuminatis petiolatis, florib. laxe ſpicatis. *Loc.* Umbroſis, ſilvis. *Fl.* Aug. *Uſ.* Vaccis, bob. capr. ovib. pabul. caules præparati uti cannabis ad tomentum; herba luteo tinctoria.

2) *Germanica*, (teutſcher Rospoley, groſſer- rother- riechender- Berg-Andorn,) verticill. multifloris, foliorum ſerraturis imbricatis caule lanato, fol. oblongo cordatis. *Loc.* Foſſis, viis, pratis. *Fl.* Jul. Aug. apib. pabulum.

237) BALLOTA, (Ballote,) Linn. G. 720.

Cal. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, hypocrateriforme, pentagonum, oblongum, 10. ſtrictum, erectum, perſiſtens, æquale: ore acuto, patulo, plicato, quinquedentato. Involucrum verticillis ſubjectum foliolis linearibus.

Cor. monopetala, ringens. *Tubus* cylindraceus, longitudine calycis.

Labium ſuperius erectum, ovatum, integrum, crenatum, concavum.

Lab. inferius trifidum, obtuſum, *lacinula intermedia* majori, emarginata.

Stam. *Filamenta* quatuor, quorum *duo* breviora, ſubulata, inclinata ad labium ſuperius, eoque breviora. *Antheræ* oblongæ, laterales.

Pist. *Germen* quadrifidum. *Stylus* filiformis, ſitu & figura ſtaminum: *Stigma* tenue, biſidum.

Per.

Per. nullum. *Calyx* immutatus ſemina in ſinu fovens.
Sem. quatuor, ovata.
Obs. *Involucrum Clinopodii*; *Calyx Marrubii*, *Corolla Stachyos*; *Marrubii proxima.*
Spec. Nigra, (ſchwarze B. Andorn, Zahnloſe,) fol. cordatis, indiviſis, ſerrat. calycibus acuminatis, foetida. *Loc.* Ruderatis. *Fl.* Jun.-Sept.

238) MARRUBIUM (Andorn) Linn. G. 721.

Cal. *Perianthium* monophyllum, infundibuliforme, tubulatum, decemſtriatum: *ore* æquali, patulo, ſæpe decemdentato: *denticulis* alternis, minoribus.
Cor. monopetala, ringens. *Tubus* cylindraceus. *Limbus* dehiſcens, *fauce* longa, tubulata. *Labium ſuperius* erectum, lineare, ſemibifidum, acutum. *Lab. inferius* reflexum, latius, ſemitrifidum, *lacinia media* latiori, emarginata, *lateralibus* acutis.
Stam. *Filamenta* 4. corolla breviora, ſub labio ſuperiori recondita, quorum 2 longiora. *Anth.* ſimplices.
Pist. *Germen* quadrifidum. *Stylus* filiformis, longitudine & ſitu ſtaminum. *Stigma* bifidum.
Per. nullum. *Calyx* collo coarctatus, ore expanſus, ſemina includens.
Sem. quatuor, oblongiuſcula.
Spec. *Vulgare*, (gem. weiſſer A. Duraut,) dentibus calycinis ſetaceis uncinatis. *Loc.* Ruderatis, viis. *Fl.* Alb. Aug. *Vis.* Aperiens, pellens. *Uſ.* Plantæ coriis parandis & apib. flores.

239) LEONURUS, (Löwenſchwanz,) Lin. G. 722.

Cal. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, cylindraceo-angulatum, pentag. ſdentatum, perſiſtens.
Cor. monopetala, ringens. *Tubus* anguſtus. *Limbus* dehiſcens, *Fauce* longa. *Labium ſuperius* longius, ſemicylindraceum, concavum, gibbum, apice rotundato-obtuſum, integrum, villoſum: *Lab. inferius* reflex. tripartitum, *laciniis* lanceolatis, fere æqualibus.
Stam. *Filamenta* quatuor, ſub labio ſuperiori tecta, quorum *duo* breviora. *Antheræ* oblongæ compreſſæ, in medio bifidæ, incumbentes, abſperſæ punctis elevatis globoſis, nitidis, ſolidis minimis.
Pist. *Germina* quatuor. *Stylus* filiformis, longitudine & ſitu ſtaminum. *Stigma* bifidum, acutum.

Per.

Per. nullum. *Calyx* immutatus, ſemina ſe ipſo breviora continens.

Sem. quatuor, oblonga, hinc convexa, inde angulata.

Spec. *Cordiaca*, (Herzgeſpan, Wolfstrap,) fol. caulinis lanceolat. trilobis. *Loc.* Ruderatis. *Fl.* Jul. *Uſ.* Apib. flores.

240) CLINOPODIUM, (Wirbel-Doſte,) L. G. 725.

Cal. *Involucrum* multiſetum, longitudine perianthii, verticillo ſubjectum.

Perianthium monophyllum, cylindraceum, leviſſime incurvum, *ore* bilabiato.

Labio ſuperiore latiore, trifido, acuto, reflexo: *Lab. inferiore* bipartito, tenui, inflexo.

Cor. monopetala, ringens. *Tubus* brevis, ſenſim ampliatus in faucem.

Labium ſuperius erectum, concavum, obtuſum, emarginatum.

L. inferius trifidum, obtuſum, *lacinula media* latiore, emarginata.

Stam. *Filamenta* quatuor, ſub labio ſuperiore, quorum *duo* breviora. *Antheræ* ſubrotundæ.

Pist. *Germen* quadripartitum. *Stylus* filiformis, ſitu & longitudine ſtaminum. *Stigma* ſimplex, acutum, compreſſum.

Per. nullum. *Calyx* collo contractus, ventre gibbus, ſemina continens.

Sem. quatuor, ovata.

Spec. *Vulgare*, (gem. W. kleine Bergmünze, falſcher Waldpoley,) capitulis ſubrotundis, hiſpidis, verticillatis, bracteis ſetaceis, fol. ovatis. *Loc.* Viis, agris, ſepibus. *Fl.* Jul. Aug. apibus.

241) ORIGANUM (Doſten) Linn. G. 726.

Cal. *Involucrum* ſpicatum bracteis imbricatis, ovatis, coloratis compoſitum. *Perianthium* inæquale, varium.

Cor. monopetala ringens. *Tubus* cylindraceus, compreſſus.

Labium ſuperius erectum, planum, obtuſum, emarginatum.

Lab. inferius trifidum, *laciniis* fere æqualibus.

Stam. *Filamenta* 4. filiformia, longitudine corollæ, quorum *duo* longiora. *Antheræ* ſimplices.

Pist.

Pist. *Germen* quadrifidum. *Stylus* filiformis, ad labium ſuperius corollæ inclinatus. *Stigma* leviſſime bifidum.
Per. nullum. *Calyx* connivens, in ſinu ſemina fovens.
Sem. quatuor, ovata.
Obs. *Calycis* involucrum *eſſentiam generis in genere hoc conſtituit.*
Perianthium *in aliis fere æquale quinquedentatum; in aliis bilabiatum, labio ſuperiori magno integro, inferiori vix ullo; in aliis diphyllo.*
Origani T. *Flores ſolitarii ex ſquamulis propriis provenientes.*
Majoranæ T. *Flores e capitulo imbricato, tetragono prodeuntes.*
Dictamni *Raj. Boerh. Flores e capitulo laxo imbricato exeuntes.*
Spec. 1) *Vulgare*, (gem. braune Wald-D. Wohlgemuth,) ſpicis ſubrotundis paniculatis conglomerat. bracteis calyce longiorib. ovat. *Loc.* Humidis, montoſis, ſilvis. *Fl.* Jul.-Sept. *Vis* Corroborans, abſtergens, reſolvens, pellens herbæ odoratæ amaræ. *Uſ.* Capr. ovib. equis pabul. & apibus: lanas rubro vel purpuraſcente tingit colore: formicas pellit.
2) *Majorana*, (Majoran,) fol. ovalib. obtuſis, ſpicis ſubrotund. compactis pubeſcentibus. *Loc.* Hortis Eur. *Fl.* Jul. *Vis.* Reſolvens, nervina.

242) THYMUS, (Thymian) Linn. G. 727.

Cal. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, ſemibifidum in duo labia, perfiſtens fauce-villis clauſa.
Lab. ſuperiori latiore, plano, erecto, tridentato: *Lab. inferiori* biſeto, longitudine æquali.
Cor. monopetala, ringens. *Tubus* longitudine calycis. *Faux* parva. *Labtum ſuperius* brevius, planum, erectum, emarginatum, obtuſum.
L. inferius longius, patens, latius trifidum, obtuſum, *lacinia media* latiore.
Stam. *Filamenta* quatuor, incurva, quorum *duo* longiora. *Antheræ* parvæ.
Pist. *Germen* quadripartitum. *Stylus* filiformis. *Stigma* bifidum, acutum.
Per. nullum. *Calyx* collo anguſtatus, ſemina in ſinu fovens.
Sem. quatuor, parva, ſubrotunda.

Spec.

Spec. *Serpyllum*, (Quendel, Feldkümmel, wilder Thymian-Poley,) florib. capitatis, verticillatis, caulibus decumbentib. fol. planis obtuſ. baſi ciliatis. *Loc.* Apricis, aridis, pratis. *Fl.* May-Jul. *Vis.* Reſolvens, excitans, adſtringens, herbæ odoratæ. *Uſ.* Capris, ovib. pabul. & apib.

243) MELISSA, (Meliſſe) Linn. G. 728.

Cal. *Perianthium* monophyllum, ſubcampanulatum, arido ſcarioſum patentiuſculum, angulatum, ſtriatum, perſiſtens, *ore* bilabiato. *Labium ſuperius* tridentatum, reflexo patens, planum: *Lab. inferius* brevius, acutiuſculum, bipartitum.

Cor. monopetala, ringens. *Tubus* cylindraceus. *Faux* dehiſcens. *Labium ſuperius* brevius, erectum, fornicatum, ſubrotundum, emarginatum: *Lab. inferius* trifidum, *lacinia media* majori obcordata.

Stam. *Filamenta* quatuor, ſubulata, quorum *duo* longitudine corollæ, *duo* dimidio breviora. *Antheræ* parvæ, per paria conniventes.

Pist. *Germen* quadrifidum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ, cum ſtaminibus ſub labio ſuperiore corollæ inclinatus. *Stigma* tenue, bifidum, reflexum.

Per. nullum. *Calyx* major, immutatus, in ſinu ſemina fovens.

Sem. quatuor, ovata.

Spec. *Officinalis*, (gewöhnl. M. Mutter-Bienen-Kraut,) racemis axillaribus verticillatis, pedicellis ſimplicibus, florib. ex alis inferiorib. ſubſeſſilibus hortenſis, odorata citrata, (Citronen M.) *Loc.* Montoſis, cultis, hortis. *Fl.* Jul. *Vis.* Reſolvens, excitans, pellens.

244) OCYMUM, (Baſilien,) Linn. G. 732.

Cal. *Perianthium* monophyllum, bilabiatum, breviſſimum, perſiſtens.

Labium ſuperius planum, cordatum, bifidum, latius, adſcendens. *Lab. inferius* quadridentatum, acutum, connivens.

Cor. monopetala, ringens reſupinata. *Tubus* breviſſimus, patens.

Labium alterum ſurſum ſpectans, latius ſemiquadrifidum, obtuſum, æquale.

Labium alterum deorſum ſpectans, anguſtius, integrum, ſerratum, longius.

STAM. *Filam.* 4. declinata quorum 2. paulo longiora, & 2. baſi proceſſum reflex. exſerentia. *Anth.* ſemilunares.

PIST. *Germen* quadripartitum. *Stylus* filiformis, ſitu & longitudine ſtaminum. *Stigma* bifidum.

PER. nullum. *Calyx* clauſus, ſemina fovens.

SEM. quatuor. ovata.

OBS. *Petali labium ſuperius deorſum ſpectat, inferius vero ſurſum, diſſitante flexurâ ſtaminum; contraria ac in affinibus methodo, eſſentialis caracter conſiſtit in filamentorum duorum proceſſu reflexo.*

SPEC. *Baſilicum*, (gemeine B.) fol. ovatis glabris, calycibus ciliatis. *Loc.* Eur. hortis. *Fl.* Alb. odoratus Jul. Aug. *Vis.* Nervina, pellens, aromatica. *Uſ.* Culinaris.

245) SCUTELLARIA, (Schildkraut,) L. G. 734.

CAL. *Perianthium* monophyllum, breviſſimum, tubulatum, *ore* ferme integro, ſquamula incumbente operculi inſtar clauſibili.

COR. monopetala, ringens. *Tubus* breviſſimus, retrorſum flexus. *Faux* longa, compreſſa. *Labium ſuperius* concavum, trifidum: *lacinula media* concava, emarginata, *lateralibus* planis, acutiuſculis, *intermediæ* ſubjectis. *Labium inferius* latius emarginatum.

STAM. *Filamenta* quatuor, ſub labio ſuperiore recondita, quorum *duo* longiora. *Antheræ* parvæ.

PIST. *Germen* quadripartitum. *Stylus* filiformis, ſitu & longitudine ſtaminum. *Stigma* ſimplex, incurvatum, acuminatum.

PER. nullum. *Calyx* operculo clauſus, galeiformis, capſulæ vicem gerens, triqueter margine inferiore dehiſcens.

SEM. quatuor, ſubrotunda.

OBS. *Solo fructu ab omnibus aliis abunde diſtinguitur; Calyx enim galeam criſta & operculo repræſentat.*

SPEC. *Galericulata*, (Helmförmiges S. Fieberkraut,) foliis cordato-lanceolatis crenatis, florib. axillaribus. *Loc.* Litoribus. *Fl.* Cærul. odoratus Jun.-Aug.

246) BRUNELLA, (Brunelle,) Linn. G. 735.

CAL. *Perianthium* monophyllum, bilabiatum, fauce brevius, perſiſtens. *La-*

Labium ſuperius planum, latius, truncatum, leviſſime tridentatum.
Lab. inferius erectum, anguſtius, acutum, ſemibifidum.
OR. monopetala, ringens. *Tubus* brevis, cylindraceus. *Faux* oblonga
Labium ſuperius concavum, integrum, nutans.
L. inferius reflexum, trifidum, obtuſum, *lacinia media* latiori, emarginata, ſerrata.
TAM. *Filamenta* quatuor, ſubulata, apice ferme bifurca, quorum *duo* paulo longiora. *Antheræ* ſimplices, inſertæ filamentis infra apices, tanquam in altero ramo.
IST. *Germen* quadripartitum. *Stylus* filiformis, cum ſtaminibus ad labium ſuperius inclinatus. *Stigma* emarginatum.
ER. nullum. *Calyx* clauſus, ſemina fovens.
EM. quatuor, ſubovata.
OBS. *Eſſentialis character conſiſtit in filamentis bifurcis, uti Crambes.*
SPEC. *Vulgaris*, (gem. B. Bräunheil, Gotheil,) fol. omnibus petiolatis, bracteis cordatis, grandiflora flore magno. *Loc.* Paſcuis, apricis, rupium fiſſuris. *Fl.* Cærul. Jun. *Vis.* Adſtringens, temperans. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis pabulum & apibus.

DIDYNAMIA,

Ord. II. ANGIOSPERMIA, (Mit bedeckten Saamen.)

247) RHINANTHUS, (Hahnkam, Glitſch.) Linn. G. 740.

AL. *Perianthium* monophyllum, ſubrotundum, inflatum, compreſſum, quadridentatum, perſiſtens.
OR. monopetala, ringens. *Tubus* fere cylindraceus, longitudine calycis. *Limbus* dehiſcens, baſi compreſſus. *Labium ſuperius* galeatum, compreſſum, emarginatum, anguſtius: *Lab. inferius* patulum, planum, ſemitrifidum, obtuſum: *lacinia media* latiori.
TAM. *Filamenta* quatuor, longitudine labii ſuperioris, ſub quo recondita, quorum *duo* breviora. *Antheræ* incumbentes, hinc bifidæ, hirſutæ,

Pist. *Germen* ovato-compreſſum. *Stylus* filiformis, ſitu ſtaminum, eisque longior. *Stigma* obtuſum, inflexum.

Per. *Capſula* obtuſa, erecta, compreſſa, bilocularis, bivalvis, diſſepimento valvis oppoſito, marginibus dehiſcens.

Sem. plurima, compreſſa.

Obs. Criſta galli *Riv. capſulæ margo auctus, ſemina membrana laxa cincta, calyx æqualis, quadrifidus.*

Spec. *Criſta* Galli, (gem. H. Klapper, Gelb-Läuſe-Rodelkraut,) Corollarum labio ſuperiore compreſſo, breviore. *Loc.* Pratis. *Fl.* Luteus May. Jun.

248) EUPHRASIA, (Augentroſt,) Linn. G. 741.

Cal. *Perianthium* monophyllum, cylindricum, quadrifidum, inæquale, perſiſtens.

Cor. monopetala, ringens. *Tubus* longitudine calycis. *Labium ſuperius* concavum, emarginatum: *Lab. inferius* patens, tripartitum: *laciniis* æqualibus, obtuſis.

Stam. *Filamenta* quatuor, filiformia, ſub labio ſuperiore inclinata. *Antheræ* bilobæ, quarum inferiores lobo inferiore in ſpinulam acuminatæ.

Pist. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, ſitu & figura ſtaminum. *Stigma* obtuſum, integrum.

Per. *Capſula* ovato-oblonga, compreſſa, bilocularis.

Sem. numeroſa, minima ſubrotunda.

Spec. *Officinalis*, (gewöhnl. weiſſer A.) caule ramoſo, fol. ovatis lineatis. acute dentatis. *Loc.* Paſcuis aridis, montoſis. *Fl.* Jul.-Sept. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis pabulum & apibus.

249) MELAMPYRUM, (Kuchweizen, Fleiſchblume.) Linn. G. 742.

Cal. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, ſemiquadrifidum: *laciniis* tenuibus, perſiſtens.

Cor. monopetala, ringens. *Tubus* oblongus, recurvus. *Limbus* compreſſus. *Labium ſuperius* galeatum, compreſſum, emarginatum, marginulis lateralibus reflexis. *L. inferius* planum, erectum, longitudine ſuperioris, ſemitrifidum, *laciniis* æqualibus, obtuſum, *eminentiis* duabus in medio notatum.

Stam. *Filamenta* quatuor, ſubulata, curva, ſub labio ſuperiori recondita, quorum *duo* breviora. *Antheræ* oblongæ.

Pist

PIST. *Germen* acuminatum. *Stylus* ſimplex, ſitu & longitudine ſtaminum. *Stigma* obtuſum.

PER. *Capſula* oblonga, obliqua, acuminata, compreſſa, *margine ſuperiori* convexo, *inferiori* recto, bilocularis, bivalvis, diſſepimento valvis contrario, futura ſuperiori dehiſcens.

SEM. gemina, ovata, gibba, baſi aucta.

SPEC. *Arvenſe*, (Acker K. Schwarz-Wachtel-Weizen,) ſpicis conicis laxis, bracteis dentato-ſetaceis, foliis laciniatis laxe ſpicat. *Loc.* Agris. *Fl.* May. Jun. *Uſ.* Bob. capr. ovib. pabul. ſemen loco panis in annonæ penuria.

250) PEDICULARIS, (Läuſekraut,) Lin. G. 746.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ſubrotundum, ventricoſum, *ore* quinquefido, æquali, perſiſtens.

COR. monopetala, ringens. *Tubus* oblongus, gibbus. *Labium ſuperius* galeatum, erectum, compreſſum, emarginatum, anguſtius; *L. inferius* patens, planum, ſemitrifidum, obtuſum: *lacinia media* anguſtiore.

STAM. *Filamenta* quatuor, longitudine labii ſuperioris, ſub quo recondita, quorum *duo* breviora. *Antheræ* incumbentes, ſubrotundæ, compreſſæ.

PIST. *Germen* ſubrotundum, *Stylus* filiformis, ſitu ſtaminum, ſed longior. *Stigma* obtuſum, inflexum.

PER. *Capſula* ſubrotunda, acuminata, obliqua, bilocularis, diſſepimento, valvis oppoſito, apice dehiſcens.

SEM. plurima, ſubrotunda, compreſſa, tunicata. *Receptacula* oblonga, petiolata.

OBS. *Capſula apice obliqua eſt in plurimis.* Sceptrum Carolinum *Rudb. capſula regulari gaudet, & rictu clauſo. Dantur ſpecies calycis ore bifido.*

SPEC. *Paluſtris*, (Sumpf L. groſſer ſtaudiger Sumpf-Rodel,) caule ramoſo, calycibus calloſo punctatis, corollis labio obliquis. *Loc.* Paludoſis. *Fl.* Ruber Jun, Obs. Loca paludoſa frigidaq. indicat.

251) ANTIRRHINUM, (Dorant, Orant.) Linn. G. 750.

CAL. *Perianthium* 5partitum, perſiſtens, *laciniis* oblongis, anguſtis, acutis, perſiſtentibus, *inferioribus duabus* magis dehiſcentibus.

COR. monopetala, ringens. *Tubus* oblongus, gibbus

Limbus bilabiatus. *Labium ſuperius* bifidum, lateribus reflexum: *Lab. inferius* trifidum, obtuſum. *Palatum* convexum, ſæpius clauſum, palato prominente inter labia, e labio inferiori, ſubtus gutture concavo, producto.

Nectarium ad baſin corollæ deorſum productum, prominens.

STAM. *Filamenta* quatuor, ſub labio ſuperiori incluſa, longitudine fere corollæ, *duo* tamen breviora. *Antheræ* conniventes.

PIST *Germen* ſubrotundum. *Stylus* ſimplex, longitudine & ſitu ſtaminum. *Stigma* obtuſum.

PER. *Capſula* ſubrotunda, obtuſa, bilocularis, variæ in variis dehiſcentiæ & figuræ.

SEM. plurima. *Receptacula* reniformia, ſolitaria, diſſepimento affixa.

OBS. Nectarium *&* Pericarpium *in hocce genere valde diverſa occurrunt.*

Linariæ T. *Nectarium longum, ſubulatum. Capſula æqualiter dehiſcens.*

Antirrhini T. *Nectarium obtuſum, vix prominens.* 35-38. *Capſula oblique apice dehiſcens, baſi inæqualis.*

Elatine *Dill. Nectarium ſubulatum. Capſula dehiſcendo utrinque deponens lamellam.*

SPEC. 1) *Cymbalaria*, (Zymbel- Nabel- Flachs-Kraut mit dem Epheublat,) fol. cordatis 5. lobis alternis, caulib. procumbentibus, hederaceo folio. *Loc.* Ruderatis. *Fl.* Apr. May. ſuſpectus.

2) *Linaria*, (gem. gelbes Flachs- Lein- Harn-Kraut,) foliis lanceolato-linearib. confertis, caule erecto ſpicis terminalibus ſeſſilibus florib. imbricatis. *Loc.* Ruderatis, viis. *Fl.* Jul. *Vis.* Anodyna, pellens. *Uſ.* Capr. ovib. pab. & apib. muſcas necat.

252) SCROPHULARIA, (Braunwurz,) Linn. G. 756.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, perſiſtens, *laciniis* corolla brevioribus, rotundatis.

COR. monopetala, inæqualis. *Tubus* globoſus, magnus, inflatus. *Limbus* quinquepartitus, minimus: *Laciniis* duabus ſuperioribus majoribus, erectis: *duabus* lateralibus, patulis, tertia infima, reflexa.

STAM.

TAM. *Filamenta* quatuor, linearia, declinata, longitudine corollæ, quorum *duo* ſeriora. *Antheræ* didymæ.
IST. *Germen* ovatum. *Stylus* ſimplex, ſitu & longitudine ſtaminum. *Stigma* ſimplex.
ER. *Capſula* ſubrotunda, acuminata, bilocularis, bivalvis, diſſepimento è marginibus valvularum inflexis conſtructo, apice dehiſcens.
EM. plurima, parva. *Receptaculum* unum, ſubrotundum, in utrumque loculamentum ſe inſinuans.
BS. *In fauce corollæ, ſub lacinia limbi ſuprema, reperitur lacinula quædam, labrum parvum mentiens, quæ omnibus ſpeciebus communis non eſt.*
Corolla concipi debet in hoc genere reſupinata, labium ſuperius minus recurvum, ad quod ſtamina declinata, rotundatum; lateralia crenata, rotundata cum ſupremo æqualia. L. inferius majus, patulum, bipartitum: intermedia minima antica.

SPEC. 1) *Nodoſa* foetida, (knotige Br. Fiſch-Kropf-Ranken, Feigwarzen-Wurz,) fol. cordatis trinervat. Caule acutangulo, racemo terminali. *Loc.* Sepibus, pratis ſilvis. *Fl.* Jun. Jul. *Uſ.* Capr. pabulum.

2) *Aquatica*, (Waſſer Br. falſche Waſſer-Betonien,) fol. cordatis, petiolat. decurrentib. obtuſis, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Loc.* Humidis. *Fl.* Aug. Sept. apibus.

53) DIGITALIS, (Fingerhut) Linn. G. 758.

AL. *Perianthium* quinquepartitum: *laciniis* ſubrotundis, acutis, perſiſtentibus, *ſuprema* cæteris anguſtiore.
OR. monopetala, campanulata. *Tubus* magnus, patens, deorſum ventricoſus, *baſi* cylindracea, arcta. *Limbus* parvus, quadrifidus: *lacinia ſuperiori* patentiori, emarginata, *infima* majori.
TAM. *Filamenta* quatuor, ſubulata, baſi corollæ inſerta, ad idem latus inclinata, quorum *duo* longiora. *Antheræ* bipartitæ, hinc acuminatæ.
IST. *Germen* acuminatum. *Stylus* ſimplex, ſitu ſtaminum. *Stigma* acutum.
ER. *Capſula* ovata, longitudine calycis, acuminata, bilocularis, bivalvis, valvis bifariam rumpentibus.
EM. plurima, parva.
BS. *Dantur ſpecies in quibus corollæ laciniæ acutæ &*

evidentiores sunt, & labium superius ac inferius acutum, magisque prominens.

SPEC. *Purpurea*, (grosser gelber F.) calycinis foliolis acutis ovatis, corollis obtusis, labio superiore integro. *Loc.* Silvis. *Fl.* Jul. Aug. apibus.

254) OROBANCHE, (Sonnenwurz,) Lin. G. 779.

CAL. *Perianthium* monophyllum, semiquinquefidum, erectum, coloratum, persistens.

COR. monopetala, ringens. *Tubus* inclinatus, amplus, ventricosus. *Limbus* patens. *Labium superius* concavum, apertum, emarginatum: *L. inferius* reflexum, trifidum, margine inæquali: *laciniis* omnibus subæqualibus.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, sub labio superiori recondita, quorum *duo* longiora. *Antheræ* erectæ, conniventes, limbo breviores. *Nectarium* glandula ad basin germinis.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* simplex, longitudine & situ staminum. *Stigma* semibifidum, obtusum, crassiusculum, nutans.

PER. *Capsula* ovato-oblonga, acuminata, unilocularis, bivalvis. *Receptacula* quatuor, linearia, lateralia, adnata.

SEM. numerosa, minima.

OBS. *Species datur calyce quinquefido. Stigmatis lacinia singula emarginata.*

SPEC. *Maior*, (grosse S. Schmeer-Maywurz, Hanfwürger,) caule simplicissimo pubescente, staminibus subexsertis. *Loc.* Montosis, agris, pratis. *Fl.* May-Jul.

Classis XV.

TETRADYNAMIA,

(Mit 4 langen und 2 kurzen Staubfäden.)

CAL. *Perianthium* tetraphyllum, oblongum: *Foliolis* ovato-oblongis, concavis, obtusis conniventibus, basi deorsum gibbis, oppositis paribus, deciduis. Calyx hic nectarium est, hinc basi sæpe gibbus.

COR. Cruciformis dicta. *Petala* quatuor, æqualia: *ungues* plano-subulati, erecti, calyce fere longiores. *Lim-*

Limbus planus, Laminis extrorſum latioribus, obtuſis, lateribus ſe invicem vix tangentibus.

Inſertio petalorum eſt in eodem cum ſtaminib. circulo.

STAM. *Filamenta* ſex, ſubulata, erecta, quorum *duo oppoſita* longitudine calycis: *quatuor reliqua* paulo longiora, corolla breviora. *Antheræ* oblongiuſculæ, acuminatæ, baſi craſſiores, erectæ, apicibus extrorſum reclinatis.

Nectariferæ glandulæ in variis & diverſis generibus, vario ſeſe modo offerunt, ſtaminibus adſident, & præſertim filamentis brevioribus affiguntur ad eorum baſin, quas ne comprimant, ſæpius incurvantur, & ſic breviora evadunt duo iſta filamenta.

PIST. *Germen* ſupra receptaculum, quotidie altius accreſcens. *Stylus* longitudine ſtaminum longiorum, vel nullus. *Stigma* obtuſum.

PER. *Siliqua* bivalvis, ſæpe bilocularis, a baſi ad apicem dehiſcens, diſſepimento ad apicem extra valvulas prominulo, quod ſtyli vices antea geſſit.

SEM. ſubrotunda, nutantia, alternatim & longitudinaliter diſſepimento immerſa. *Receptaculum* lineare, diſſepimentum ambiens, & ſuturis peric. immerſum.

OBS. *Hæc Claſſis eſt vere Naturalis, & aſſumta fuit pro Naturali ab omnibus, & conſummatiſſimis Syſtematicis: tamen apud Singulos unum alterumve ſæpius genus contra naturam additum fuit*; heic vero nullum niſi forte *Cleome*.

Plantæ in hac claſſe Antiſcorbuticæ ab omnibus dicuntur; ſapor pleriſque acer cum aquoſo mixtus.

Diſtinguitur ab omnibus bifariam in ea genera, quæ gaudent Pericarpio.

α Siliculoſo *i. e. ſubrotundo, Styloque inſtructo ſæpius ſiliculæ longitudine.*

β Siliquoſo *i. e. longiſſimo, Styloque vix notabili prædito.*

Eſſentialis character generum in hac claſſe a ſitu Nectariferæ glandulæ communiter dependet.

Ord. I. SILICULOSA, (Mit Schötchen.)

255) MYAGRUM, (Leindotter,) Linn. G. 796.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* ovato-oblongis, concavis, dehiſcentibus, coloratis, deciduis.

COR. tetrapetala, cruciformis. *Petala* plana, ſubrotunda, obtuſa; *unguibus* anguſtis.

STAM. *Filamenta* ſex, longitudine calycis: quorum *quatuor oppoſita* paulo longiora. *Antheræ* ſimplices.
PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine calycis. *Stigma* obtuſum.
PER. *Silicula* obcordata, leviter compreſſa, rigida, apice ſtylo rigido conico terminata, bivalvis.
SEM. ſubrotunda.
OBS. Myagri T. Pericarpium *uniloculare, duobus loculis vacuis in ſummitate, unico ad baſin ſeminifero.* Semen *unicum.* ♀.
Alyſſi ſp. T. Pericarpium *biloculare*, ſemina *nonnulla*.
SPEC. *Sativum*, (zahmer L. groſſer Dotter, kleiner Oelſaamen.) ſiliculis biarticulatis diſpermis, fol. lanceolatis, extrorſum ſinuatis denticulat. *Loc.* Agris, viis. *Fl.* Jun. Jul. *Uſ.* Bob. capr. ovibus equis pabul. & apib. ſemen oleum exhibet ad lampades & in culina.

256) DRABA, (Hungerblümgen,) Linn. G. 800.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* ovatis, concavis, erecto-patulis, deciduis.
COR. tetrapetala, cruciformis. *Petala* oblonga, patentiuſcula: *unguibus* minutiſſimis.
STAM. *Filamenta* ſex, longitudine calycis: quorum *quatuor oppoſita* paulo longiora, erecto-patentia. *Antheræ* ſimplices.
PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* vix ullus. *Stigma* capitatum, planum.
PER. *Silicula* elliptico-oblonga, compreſſa, integra, ſtylo deſtituta, bilocularis, *diſſepimento* valvis parallelo: *valvulis* plano-concavis.
SEM. plura, parva, ſubrotunda.
OBS. *In aliis petala ad ungues uſque bipartita, 2. in aliis modo apice emarginata, 4-6. in aliis integerrima.*
Eſſentialis character conſiſtit in Silicula ex ovali oblonga compreſſa, ſtylo fere diſtituta: hinc ab Alyſſo, Subularia & Lunaria facile diſtinguitur.
SPEC. *Verna*, (Frühlings H. kleines Vogel-Nägel-Kraut,) ſcapis nudis, fol. lanceolatis ſubincifis. *Loc.* Aridis, paſcuis. *Fl.* Mart. Apr. *Obſ.* Smolandiis tempus ſecale ferendi floreſcentia, & racemus nutans inſtantes imbres aut premenſem noctem, indicat.

257) LE-

257) LEPIDIUM, (Kreſſig,) Linn. G. 801.

CAL *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* ovatis, concavis, deciduis.

COR. tetrapetala, cruciformis. *Petala* obovata, calyce duplo longiora: *unguibus* anguſtis.

STAM. *filamenta* ſex, ſubulata, longitudine calycis, quorum *duo oppoſita* breviora. *Antheræ* ſimplices.

PIST. *Germen* cordatum. *Stylus* ſimplex, longitudine ſtaminum. *Stigma* obtuſum.

PER *Silicula* ſubcordata, vix emarginata, compreſſa, margine acuta, bilocularis: *diſſepimento* lanceolato: *valvulis* navicularibus, carinatis.

SEM. nonnulla, ovato-acuminata, baſi anguſtiora, nutantia.

OBS. Naſturtii T. *Pericarpium margine acutius, apice magis ſæpius emarginatum.*

Lepidii T. *Pericarpium margine obtuſum, non emarginatum apice.*

Iberis *flore gaudet diandro, qui in hac claſſe inſuetus* 14-17. *& ruderale etiam apetalo* 14.

SPEC. 1) *Sativum*, (Garten K.) florib. tetradynamiis, fol. oblongis multifidis: hortenſe criſpum. *Loc.* Cultis, hortis. *Vis.* Diuretica, mundificans, acris. *Uſ.* Culinaris, ad acetaria, & condimentum carnium: ſemen oleum ſuave exhibet.

2) *Latifolium*, (Pfefferkraut, Edel-Leberkraut,) fol. ovato-lanceolatis integris ſerratis. *Loc.* Cultis, umbroſis. *Fl.* Jun-Aug. *Vis.* Eadem & uſus cum ſativa.

258) THLAPSI, (Taſche) Linn. G. 802.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* ovatis, concavis, erecto patulis, deciduis.

COR. tetrapetala, cruciformis. *Petala* ſub ovata, calyce duplo longiora: *unguibus* anguſtis.

STAM. *Filamenta* ſex, corolla dimidio breviora: quorum *duo oppoſita* adhuc breviora. *Antheræ* acuminatæ.

PIST. *Germen* ſubrotundum, compreſſum, emarginatum. *Stylus* ſimplex, longitudine ſtaminum. *Stigma* obtuſum.

PER. *Silicula* compreſſa, obcordata emarginata ſtylo longitudine emarginaturæ, bilocularis: *diſſepimento* lanceolato: *valvulis* navicularibus.

SEM.

Sem. plura, nutantia, ſuturis affixa.
Obs. Burſæ paſtoris *T. Silicula obcordata, margine deſtituta* 7-10.
Thlaſpi T. *Silicula verticaliter cordata, margine acuto cincta.*
Spec. 1) *Arvenſe*, (breiter Baurenſenf, Taſchen-Pfenning-Kraut,) ſiliculis orbiculatis, fol. oblongis dentat. glabris. *Loc.* Agris. *Fl.* May. *Uſ.* Bob. capr. ovib. pabul. ſed ingratus fit carnis ſapor, curculiones pellit, campos argilloſos indicat.
2) *Burſa paſtoris*, (Hirtentäſchlein, Täſchelkraut,) ſiliculis obcordatis, fol. radicalibus pinnatifidis. *Loc.* Cultis, ruderatis. *Fl.* Mart-Dec. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis, ſuibus pabulum.

259) COCHLEARIA, (Löffelkraut,) L. G. 803.

Cal. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* ovatis, concavis, dehiſcentibus, deciduis.
Cor. tetrapetala, cruciformis. *Petala* obovata patentia, calyce *duplo* majora: *unguibus* anguſtis, calyce brevioribus, patulis.
Stam. *Filamenta* ſex, ſubulata, longitudine calycis: quorum *duo oppoſita* breviora. *Antheræ* obtuſæ, compreſſæ.
Pist. *Germen* cordatum. *Stylus* ſimplex, breviſſimus, perſiſtens. *Stigma* obtuſum:
Per. *Silicula* cordata, gibba, leviſſime compreſſa, ſubemarginata ſtylo inſtructa, bilocularis, ſcabra, margine obtuſo.
Sem. quatuor circiter in ſingulo loculo.
Spec. *Officinalis* (gewöhnl. L.) fol. radicalibus ſubrotundis, caulinis oblongis ſubſinuatis. *Loc.* Eur. hortis. *Vis.* Mundificans, diuretica, acris. *Uſ.* Culinar. ad acetaria.

260) IBERIS, (Iberpflanze,) Linn. G. 804.

Cal. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* obovatis, concavis, patentibus, parvis, æqualibus, deciduis.
Cor tetrapetala, inæqualis. *Petala* verticaliter ovata, obtuſa, patentia: *unguibus* oblongis, erectis: quorum *duo exteriora proxima* longe majora, inter ſe æqualia, *duo interiora* minima, reflexa.

Stam.

TAM. *Filamenta* ſex, ſubulata, erecta, quorum *duo lateralia* breviora. *Antheræ* ſubrotundæ.

PIST. *Germen* ſubrotundum, compreſſum. *Stylus* ſimplex, brevis. *Stigma* obtuſum.

PER. *Silicula* erecta, ſuborbiculata, compreſſa, ſuperne margine bifido acuto cincta, bilocularis: *diſſepimento* lanceolato: *valvulis* navicularibus, compreſſis, carinatis.

SEM. ſolitaria, nonnulla, ſubovata.

SPEC. *Nudicaulis*, (I. mit bloſem Stam,) herbacea, fol. ſinuatis, caule nudo ſimplici. *Loc.* Sterilibus, arenoſis.

261) ALYSSUM, (Alyſſen,) Linn. G. 805.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum, oblongum: *foliolis* ovato-oblongis; obtuſis, conniventibus, deciduis.

COR. tetrapetala, cruciformis. *Petala* plana, calyce breviora, patentiſſima: *unguibus* longitudine calycis.

STAM. *Filamenta* ſex longitudine calycis: quorum *duo oppoſita* paulo breviora, denticulo notata. *Antheræ* erecto-patentes.

PIST. *Germen* ſubovatum. *Stylus* ſimplex, longitudine ſtaminum, germine longior. *Stigma* obtuſum.

PER. *Silicula* ſubgloboſa, emarginata, ſtylo longitudine ſiliculæ inſtructa, bilocularis: *diſſepimento* elliptico: *valvulis* elliptico-hemiſphæricis.

SEM. nonulla, orbiculata, receptaculis filiformibus, ad apicem ſiliculæ egreſſis, affixa.

OBS. Petala *in aliis emarginata ſunt, in aliis vero integra.* Silicula *in aliis ventricoſa, in aliis compreſſa (non vero oblonga) eſt.*

Eſſentialis character conſiſtit in filamentis minoribus denticulo introrſum baſi inſerto.

SPEC. *Incanum*, (weis beſtäubte A. Schildbeſenkraut, Wegkres, Baurenſenf,) caule erecto, fol. lanceolatis incanis, integerrimis, florib. corymboſis. *Loc.* Arenoſis, apricis. *Fl.* May. Apibus.

262) LUNARIA, (Mondviole,) Linn. G. 809.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum, oblongum: *foliolis* ovato-oblongis, obtuſis, conniventibus, deciduis, quorum *duo alterna* baſi gibba, ſaccataque.

COR. tetrapetala, cruciformis. *Petala* integra, obtuſa, magna,

magna, longitudine calycis, desinentia in ejusdem longitudinis *ungues*.

Stam. *Filamenta* sex, subulata, longitudine calycis: quorum *quatuor* longitudine calycis, *duo* vero paulo breviora. *Antheræ* erecto-patentes.

Pist. *Germen* pedicellatum, ovato-oblongum. *Stylus* brevis. *Stigma* obtusum; integrum.

Per. *Silicula* elliptica, plano compressa, erecta, maxima, pedicello insidens, stylo terminata, bilocularis, bivalvis: *dissepimento* valvulis parallelo.

Sem. nonnulla, reniformia, compressa, marginata, in medio siliculæ posita: *Receptaculis* filiformibus, longis; futuris lateralibus insertis.

Spec. *Annua*, (jährige M. Silberblume.) foliis oppositis. *Loc.* Montosis. *Fl.* Jul.

TETRADYNAMIA,

Ord. II. SILIQUOSA, (Mit Schoten.)

263) CARDAMINE, (Bergkresse,) Linn. G. 812.

Cal. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* ovato-oblongis, obtusis, subpatulis, gibbis, parvis, deciduis.

Cor. tetrapetala, cruciformis. *Petala* oblongo & obovata, obversa, patentissima, desinentia in *ungues* erectos, calyce duplo longiores.

Stam. *Filamenta* sex, subulata: quorum *duo opposita* longitudine dupla calycis, *reliqua* vero paulo longiora. *Antheræ* parvæ, cordato oblongæ, erectæ.

Pist. *Germen* tenue, cylindraceum, longitudine staminum. *Stylus* nullus. *Stigma* obtuso-capitatum, integrum.

Per. *Siliqua* longa, cylindraceo-compressa, bilocularis, bivalvis: *valvulis* dehiscendo spiraliter revolventibus.

Sem. plurima, subrotunda.

Obs. *Datur species staminibus duobus istis minoribus sæpius destituta.* 12. *& alia petalis destituta* 9.

Spec. *Pratensis* (Wiesenkresse-Gauchblume, braune wilde Kresse,) fol. pinnatis, foliolis radicalib. subrotundis, caulinis lanceolatis. *Loc.* Pascuis aquosis, silvis. *Fl.* Mart.-May. *Us.* Bob. capr. ovib. pabul. & apibus.

264) SI-

264) SISYMBRIUM, (Raucke) Linn. G. 813.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* lanceolato-linearibus, patentiuſculis, coloratis, deciduis.
COR. tetrapetala, cruciformis. *Petala* oblonga, patentia, calyce ſæpius minora, unguibus minimis.
STAM. *Filamenta* ſex, calyce longiora: quorum *duo oppoſita* paulo breviora. *Antheræ* ſimplices.
PIST. *Germen* oblongum, filiforme. *Stylus* vix ullus. *Stigma* obtuſum.
PER. *Siliqua* longa, incurva, gibba, teres, bilocularis, bivalvis: *valvulis* diſſepimento paulo brevioribus, rectis.
SEM. plurima, parva.
OBS. Sophia *corollam calyce breviorem gerit, & ſiliquam tenuiſſimam longiſſimam* 18. Radiculæ D. *ſiliquam gibbam breviſſimam proferunt uti* 4. 5.

SPEC. 1) *Naſturtium aquaticum*, (Brunkreſſe,) ſiliquis declinatis, foliis pinnatis, foliolis ſubcordatis. *Loc.* Fontibus, rivulis. *Fl.* Mart. Jun. Sept. *Uſ.* Ad olera vernalia antiſcorbutica & acetaria.

2) *Sophia*, (Sophienkraut, Welſaamen, Beſemkraut,) petalis calyce minoribus, fol. decompoſito pinnatis. *Loc.* Agris, muris, tectis. *Fl.* Mai. Jun. *Obſ.* Semen cum 9. partibus pulveris pyrii mixtum, bombardæ immiſſum & exploſum, eam ita præparare fertur, ut longiorem adtingat metam, ejusque vis fulminans, contenti nitri ope, augeatur. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis pabul.

265) ERYSIMUM (Hederich,) Linn. G. 814.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* ovato-oblongis parallelo-conniventibus, coloratis, deciduis.
COR. tetrapetala, cruciformis. *Petala* oblonga, plana apice, obtuſiſſima, *unguibus* longitudine calycis, erectis. *Nectarifera* glandula duplex intra filamentum brevius.
STAM. *Filamenta* ſex, longitudine calycis: quorum *duo oppoſita* breviora. *Antheræ* ſimplices.
PIST. *Germen* lineare, tetragonum, longitudine ſtaminum. *Stylus* breviſſimus. *Stigma* capitatum, perſiſtens, parvum.
PER. *Siliqua* longa, linearis, ſtricta, tetragona, bivalvis, bilocularis.
SEM. plurima, parva, ſubrotunda.

SPEC.

Spec. *Officinale vulgare*, (gewöhnlicher H. Wegſenf, gelb Eiſenkraut,) ſiliquis ſpicæ adpreſſis, fol. runcinatis. *Loc.* Ruderatis, viis. *Fl.* Jun. Aug. *Uſ.* Capris, ovibus, pabulum.

266) CHEIRANTHUS, (Levcoje) Linn. G. 815.

Cal. *Perianthium* tetraphyllum, compreſſum: *foliolis* lanceolatis, concavis, erectis, parallelis, conniventibus, deciduis: quorum *duo exteriora* baſi gibba.

Cor. tetrapetala, cruciformis. *Petala* ſubrotunda, calyce longiora, *unguibus* longitudine calycis.

Stam. *Filamenta* ſex, ſubulata, parallela, longitudine calycis: quorum *duo* intra foliola calycina gibba, paulo breviora. *Antheræ* erectæ, baſi bifidæ, apice acutæ & reflexæ.
Nectarifera glandula cingit baſin ſtaminis minoris utrinque.

Pist. *Germen* priſmaticum, tetragonum, longitudine ſtaminum, tuberculo utrinque notatum. *Stylus* breviſſimus, compreſſus. *Stigma* oblongum, bipartitum, reflexum, craſſiuſculum, perſiſtens.

Per. *Siliqua* longa, compreſſa, angulis duobus oppoſitis obliteratis, denticulo notatis, bilocularis, bivalvis, Stylo breviſſimo, & Stigmate bifido erecto inſtructa.

Sem. plurima, pendula, alterna, ſubovata, compreſſa, margine membranacea.

Obs. *Denticulus utrinque germini inſidens, in aliis fere evaneſcit: in aliis accreſcit.*

Spec. 1) *Cheiri*, (gelber Veil, Violen,) fol. lanceolat. acutis glabris, ramis angulatis. *Loc.* Cultis, hortis. *Fl.* Luteus odoratus, Apr. apibus & ſanguineo-luteus. (Goldlak)

2) *Incanus*, (beſtäubte L.) fol. lanceolat. integerrimis obtuſis incanis, ſiliquis apice truncatis compreſſis, caule ſuffruticoſo. *Loc.* Eur. hortis. *Fl.* Albus & purpureus ſuaveol. Maj. Jun. Apib.

267) HESPERIS, (Nachtviole, Wendeblumen) Linn. G. 817.

Cal. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* lanceolato-linearibus, parallelo-conniventibus, ſuperne incumbentibus, inferne dehiſcentibus, deciduis: quorum *duo oppoſita* baſi gibba.

Cor.

COR. tetrapetala, cruciformis. *Petala* oblonga, longitudine calycis, parum reflexa oblique contra motum ſolis, deſinentia in *ungues* attenuatos, longitud. calycis.
STAM. *Filamenta* ſex, ſubulata, longitudine tubi; quorum *duo* dimidio breviora. *Antheræ* lineares, erectæ, apice reflexæ.
Glandula mellifera acuminata, inter ſtamen, brevius, germenque collocata, idemque ſtamen dein cingens.
PIST. *Germen* longitudine calycis, priſmaticum, tetragonum. *Stylus* nullus. *Stigma* bipartitum, introrſum ſitum, oblongum, erectum, baſi bifurcatum, apice connivens, marceſcens.
PER. *Siliqua* longa, compreſſo-plana, ſtriata, bilocularis, bivalvis: *valvis* longitudine diſſepimenti.
SEM. plurima, ovata, compreſſa.
SPEC. 1) *Matronalis*, (Matronal N. Viola matronalis, Schoten-Pfingſt-Violen, Matronenblume,) caule ſimplici erecto, fol. ovato-lanceolatis denticulat. petalis mucrone emarginatis. *Loc.* Europæ hortis. *Fl.* Alb. ſuaveolens Jun.
2) *Inodora*, (geruchloſe N.) caule ſimplici erecto, fol. ſubhaſtat. dentatis, petalis obtuſis. *Loc.* Montoſis. *Fl.* Mai.

268) ARABIS, (Gænſekraut) Linn. G. 818.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum, deciduum: *foliolis duobus oppoſitis* majoribus, ovato-oblongis, acutis, baſi prominulis, gibbis, concavis: *duobus reliquis* linearibus, erectis.
COR. tetrapetala, cruciformis. *Petala* ovata, deſinentia in *ungues*, longitudine calycis.
Nectaria 4. *ſingulum* eſt ſquamula intra fundum folioli calycini, receptaculo affixa, reflexa, perſiſtente.
STAM. *Filamenta* ſex, ſubulata, erecta: quorum *duo* longitudine calycis, *quatuor* duplo longiora. *Antheræ* cordatæ, erectæ.
PIST. *Germen* teres, longitudine ſtaminum. *Stylus* nullus. *Stigma* obtuſum, integrum.
PER. *Siliqua* compreſſa, longiſſima, linearis, torulis ad ſemina inæqualis: *valvulis* longitud. ferme diſſepimenti.
SEM. plurima, ſubrotunda, compreſſa.
OBS. *Nectaria & Stigma neque Cheiranthum, neque Heſperidem eſſe demonſtrant.*

Spec. *Alpina*, (Alpen-Gänſekraut, unächtes Alpenthurnkr.) fol. amplexicaulibus dentatis, caule erecto ſimplici. *Loc.* Alpibus rupibus. *Fl.* Jul.

269) TURRITIS, (Thurnkraut,) Linn. G. 819.

Cal. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* ovato-oblongis, parallelo conniventibus, deciduis.

Cor. tetrapetala, cruciformis. *Petala* ovato-oblonga, obtuſa, erecta, integra: *unguibus* erectis.

Stam. *Filamenta* ſex, ſubulata, erecta, longitudine tubi: quorum *duo* breviora. *Antheræ* ſimplices.

Pist. *Germen* longitudine floris, teres, parum compreſſum. *Stylus* nullus. *Stigma* obtuſum.

Per. *Siliqua* omnium longiſſima, ſtricta, tetragona, angulis oppoſitis alternis obſoletis, ſub compreſſis, bilocularis, bivalvis: *valvulis* diſſepimento vix æqualibus.

Sem. numeroſiſſima, rotundiuſcula, emarginata.

Spec. *Glabra*, (glattes T. Thurn-Senf-Kohl, Waldkohl,) fol. radicalibus dentatis hiſpidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Loc.* Paſcuis, vineis. *Fl.* Jun. *Uſ.* Bob. capr. ovib. pabul. & apibus.

270) BRASSICA, (Kohl,) Linn. G. 820.

Cal. *Perianthium* tetraphyllum, erectum: *foliolis* lanceolato-linearibus, concavo-canaliculatis, baſi gibbis, erectis, parallelis, deciduis.

Cor. tetrapetala, cruciformis. *Petala* ſubovata, plana, patentia, integra, ſenſim attenuata in *ungues* longitudine fere calycis.

Glandulæ nectariferæ 4. ovatæ: quarum *una* utrinque inter ſtamen brevius & piſtillum, & *una* utrinque inter ſtamina longiora & calycem poſita.

Stam. *Filamenta* ſex, ſubulata, erecta: quorum *duo oppoſita* longitudine calycis, *quatuor* vero longiora. *Antheræ* erectæ, acuminatæ.

Pist. *Germen* teres, longitudine ſtaminum. *Stylus* brevis, craſſitie germinis. *Stigma* capitatum, integrum.

Per. *Siliqua* longa, teretiuſcula, depreſſa utrinque *diſſepimento* apice prominente tereti, bilocularis, bivalvis: *valvulis* diſſepimento brevioribus.

Sem. plura, globoſa.

Ors

Obs. Napus T. *facie vix a Rapa differt.*
Rapæ T. *calyx corollæ concolor.*
Braſſicæ P. *calyx vireſcens.*

Spec. 1) *Campeſtris*, (Feld K.) radice cauleque tenui, fol. caulinis uniformibus cordatis ſeſſilibus. *Loc.* Agris. *Fl.* May. Jun. apibus & ovibus pabulum.

2) *Oleracea*, (Küchen K.) radice cauleſcente tereti carnoſa. Braſſica *Viridis*, (grüner Kohl,) *rubra*, (rother K.) *capitata* alba, (weiſſer Kopf K.) *ſabauda* alba criſpa, (Savoyer K. weiſſer Wirſching,) *laciniata* ſubrubra, (Blauk.) *feleniſia* anguſto apii folio, (Blumaſche K.) *botrytis* cauliflora, (Blumen K.) *gongylodes*, (Kohlrabe,) hæ omnes varietates Braſſicæ *Loc.* Cultis, agris, hortis. *Fl.* Jun.-Aug. *Uſ.* Culinaris ad olera, acetaria.

271) SINAPIS, (Senf,) Linn. G. 821.

Cal. *Perianthium* tetraphyllum, patens: *foliolis* linearibus, concavo-canaliculatis, cruciformi-patentibus, deciduis.

Cor. tetrapetala, cruciformis. *Petala* ſubrotunda, plana, patentia, integra, *unguibus* erectis, linearibus, longitudine vix calycis inſidentia.

Glandulæ nectariferæ quatuor, ovatæ: quarum *una* utrinque inter ſtamen brevius & piſtillum, & *una* utrinque inter ſtamina longiora & calycem poſita.

Stam. *Filamenta* ſex, ſubulata, erecta: quorum *duo oppoſita* longitudine calycis, *quatuor* vero longiora. *Antheræ* erecto-patentes, acuminatæ.

Pist. *Germen* teres. *Stylus* longitudine germinis, altitudine ſtaminum. *Stigma* capitatum, integrum.

Per. *Siliqua* oblonga, inferne toroſa, ſcabra, biloculares, bivalvis: *diſſepimento* valvulis duplo ſæpius longiore, magno, compreſſo.

Sem. plura, globoſa.

Obs. *Hinc* Sinapis *calyce patente, unguibus vero Corollae erectis a Braſſica differt.*

Spec. 1) *Arvenſis*, (wilder ſchwarzer Acker S. gelber Hederich,) ſiliquis multangulis toroſo-turgidis roſtro longioribus. *Loc.* Agris. *Fl.* Lut. May. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis, ſuib. pabul. & apib. ſemina oleum exhibent.

2) *Nigra*, (ſchwarzer S.) ſiliquis glabris apice tetragonis. *Loc.* Ruderatis, aggeribus. *Fl.* Jun. *Vis.* Incidens, rubefaciens, ſtimulans, acris.

272) RAPHANUS, (Rettich,) Linn. G. 822.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum, erectum: *foliolis* oblongis, parallelis, conniventibus, deciduis, baſi gibbis.

COR. tetrapetala, cruciformis. *Petala* obcordata, patentia, *ungues* calyce paulo longiores.

Glandulæ nectariferæ quatuor: *unica* utrinque inter ſtamen breve & piſtillum: *unica* vero utrinque inter ſtamina longiora & calycem.

STAM. *Filamenta* ſex, ſubulata, erecta: quorum *duo oppoſita* longitudine calycis, *quatuor* vero longitudine unguium corollæ. *Antheræ* ſimplices.

PIST. *Germen* oblongum, ventricoſum, attenuatum, longitudine ſtaminum. *Stylus* vix ullus. *Stigma* capitatum, integrum.

PER. gibbum, oblongum cum acumine, glabrum, torulis ventricoſum, ſubarticulatum.

SEM. ſubrotunda, glabra.

OBS. Raphani T. *fructus ſpongioſus, bilocularis, non dehiſcens.* 1.

Raphaniſtri T. *fructus articularis, diſcedens ſecundum articulos.* 2.

SPEC. 1) *Sativus*, (Radiesgen, Monath R.) Siliquis teretibus, toroſis, bilocularibus: minor oblongus, maior rotundus. *Loc.* Eur. hortis. *Fl.* May.-Aug. *Uſ.* Culinaris, ad acetaria.

2) *Raphaniſtrum*, (Acker R. Hederich,) ſiliquis teretib. articulatis lævibus unilocularibus. *Loc.* Inter ſegetes. *Fl.* Alb. May.-Sept. *Uſ.* Culinaris.

273) ISATIS, (Wayd,) Linn. G. 824.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* ovatis, patentiuſculis, coloratis, deciduis.

COR. tetrapetala, cruciformis. *Petala* oblonga, obtuſa, ſenſim attenuata in *ungues*, patentia.

STAM. *Filamenta* ſex, erecto-patentia, longitudine corollæ: horum *duo* breviora. *Antheræ* oblongæ, laterales.

PIST. *Germen* oblongum, anceps, compreſſum, longitu-

gitudine breviorum ſtaminum. *Stylus* nullus. *Stigma* obtuſum, capitatum.

ER. *Silicula* oblonga, lanceolato-obtuſa, compreſſa, anceps, unilocularis, non dehiſcens, bivalvis: *valvulis* navicularibus, compreſſis, carinatis, decidua.

EM. unicum, ovatum, intra centrum pericarpii.

SPEC. *Tinctoria*, (Färber W. Scharte,) fol. radicalib. crenatis, caulinis ſagittatis, ſiliculis oblongis. *Loc.* Montoſis, ſilvis. *Fl.* May. Jun. *Uſ.* Foliorum cæruleo-tinctorius.

Claſſis XVI.

MONODELPHIA,

(Verwachſene Staubfäden in 1. Tropp.)

AL. *Perianthium* ſemper præſens, perſiſtens, in plurimis duplicatum.

OR. *Petala* 5. obcordata, latere altero amplectente proximum contra motum Solis.

TAM. *Filamenta* inferne coalita, ſuperne diſtincta, exteriora breviora. *Antheræ* incumbentes.

IST. *Receptaculum fructificationis* in centro floris prominet. *Germina* erecta, rotato-articulatim ambientia apicem receptaculi. *Styli* omnes coaliti inferne in unum corpus cum receptaculo, ſuperne diſtincti in tot, quot germina ſunt, fila. *Stigmata* patentia, tenuia.

ER. *Capſula* in tot locula, quot Piſtilla, diſtincta, variæ in variis figuræ; conſtat hæc ſæpe ex totidem Arillis connexis.

EM. reniformia.

RS. Corollam *huic claſſi plerumque monopetalam aſſignavit* TOURNEFORTIUS: *omnia tamen petala baſi diſtincta ſunt, licet filamentis in unum corpus coalitis cohærentia, hinc* Pentapetala *rectius dicatur.*

iviſa fuere Genera hujus claſſis a ſolo fructu, qui non ſufficit: hinc ad folia confugere neceſſe viſum fuit Plurimis. Nos genera diſtinguimus a Calyce, qui magni momenti eſt, & limites abſolutos ponit.

rd. II. DECANDRIA, (Mit 10. Staubf.)

74) GERANIUM, (Storchſchnabel,) L.G. 832.

AL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* ovatis, acutis, concavis, perſiſtentibus.

Cor. *Petala* quinque, obcordata, vel ovata, patentia, magna.

Stam. *Filamenta* decem, ſubulata, apice patentia, *alterna* longiora, corolla breviora. *Antheræ* oblongæ, verſatiles.

Pist. *Germen* quinquangulare, roſtratum. *Stylus* ſubulatus, ſtaminibus longior, perſiſtens. *Stigmata* quinque, reflexa.

Per. nullum, fructus pentacoccus roſtratus.

Sem. ſolitaria, reniformia, ſæpe arillata, ariſta longiſſima demum ſpirali.

Spec. 1) *Paluſtre*, (Waſſer-Bruch-Sumpf-St. Schnabelkraut.) pedunculis bifloris longiſſimis, declinatis, fol. ſ lobis inciſis, petalis integris. *Loc.* Paludoſis, ſilvis. *Fl.* Sanguineus Jun. apib.

2) *Pratenſe*, (Wieſen St.) pedunculis bifloris, fol. ſubpeltatis, multipartitis pinnato-laciniatis rugoſis acutis, petalis integris. *Loc.* Pratis, ſilvis. *Fl.* May.

3) *Robertianum*, (ſtinckender St. Ruprechtskraut,) pedunculis bifloris, calycib. piloſis, 10. angulatis, fol. ſ-trive-partitis. *Loc.* Rupibus, muris. *Fl.* May. Jun. *Uſ.* Capr. equis pabulum

4) *Sanguineum*, (blutröther St. Blutwurz-Kraut, rothe Hünerwurz,) pedunculis unifloris, fol. ſ. partitis, trifidis orbiculatis. *Loc.* Pratis ſiccis umbroſis, ſilvis. *Fl.* Ruber. May. *Uſ.* Radic. coriis parandis & apibus flores.

Ord. IV. POLYANDRIA, (Mit vielen Staubfäden im Fruchtboden,)

275) ALTHÆA, (Eibiſch, Hemſt.) L. G. 839.

Cal. *Perianthium* duplex:

Exterius monophyllum, inæqualiter novemfidum, *laciniis* anguſtiſſimis, minus, perſiſtens.

Interius monophyllum, ſemiquinquefidum, *laciniis* latioribus, acutioribus, perſiſtentibus.

Cor. *Petala* quinque, baſi coalita, verticaliter cordata, præmorſa, plana.

Stam. *Filamenta* numeroſa, inferne coalita in cylindrum, ſuperne laxa, corolla inſerta. *Antheræ* fere reniformes.

Pist.

Pist. *Germen* orbiculatum. *Stylus* cylindraceus, brevis. *Stigmata* numerosa (viginti) setacea, longitudine styli.

Per. *Arilli* in verticillum depressum inarticulati circum *Receptaculum* columnare, decidui introrsum dehiscentes.

Sem. solitaria, compresso-reniformia.

Spec. *Officinalis* (gewöhnl. E.H. fol. simplicibus tomentosis. *Loc.* Cultis, hortis. *Fl.* Jul. *Vis.* Emolliens, invisсans, nutriens. *Us.* Radic. siccatæ ad diapasma.

276) ALCÆA, (Pappel Pampelblume,) L.G. 840.

Cal. *Perianthium* duplex:

Exterius monophyllum, semisexfidum, patentius, persistens. *Interius* monophyllum, semiquinquefidum, majus, persistens.

Cor. *Petala* 5. basi coalita, obcordata, maxima, emarginata, patentia.

Stam. *Filamenta* numerosa, inferne coalita in cylindrum pentagonum, superne laxa, corollæ inserta. *Antheræ* sub reniformes.

Pist. *Germen* orbiculatum. *Stylus* cylindraceus, brevis. *Stigmata* numerosa (20) setacea, longitudine styli.

Per. *Arilli* articulati in verticillum circum *Receptaculum* columnare, depressum discedentes, introrsum dehiscentes.

Sem. solitaria, compresso-reniformia.

Spec. *Rosea*, (Stockrosen, Rosen P.) fol. sinuato-angulosis. *Loc.* Eur. hortis. *Fl.* Aug. *Vis.* Eadem cum Althæa.

277) MALVA, (Pappel,) Linn. G. 841.

Cal. *Perianthium*, duplex:

Exterius triphyllum, angustius foliolis cordatis persistentibus, acutis.

Interius monophyllum, semiquinquefidum, majus, latius, persistens.

Cor. *Petala* quinque, basi coalita, obcordata, præmorsa, plana.

Stam. *Filamenta* numerosa, inferne coalita in cylindrum, superne laxa, corollæ inserta. *Antheræ* reniformes.

PIST. *Germen* orbiculatum. *Stylus* cylindraceus, brevis. *Stigmata* plurima, ſetoſa, longitudine ſtyli.

PER. *Arilli* in verticillum depreſſum inarticulati circum *Receptaculum* columnare, decidui, introrſum dehiſcentes.

SEM. ſolitaria, reniformia.

SPEC. 1) *Sylveſtris*, (Wald P.) Haſenpappel, Pappeln,) caule erecto herbaceo, foliis 7. lobatis acutis, pedunculis petiolisque piloſis. *Loc.* Silvis, muris, viis. *Fl.* Jun.-Aug. Apibus.

2) *Alcæa*, Sigmarskraut-Wurz,) caule erecto, fol. multipartitis, ſcabriuſculis. *Loc.* Silvis, ad vias, dumetis. *Fl.* Jul. Aug. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis pabulum & apibus.

Claſſis XVII.

DIADELPHIA,

(Verwachſene Staubfäden in 2 Partheyen,)

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, marceſcens: *baſi* gibba, inferne pedunculo annexa, ſuperne obtuſa, mellifera: *ore* 5dentato, acuto, erecto, inæquali; *denticulo infimo impari* longiori, *pari ſupremo* breviori remotiori: *fundo* melleo liquore madido, receptaculum includente.

COR. *Papilionacea* dicta, inæqualis:

Petalis ſingulis diſtincto nomine iuſignitis.

Vexillum: Petalum reliqua tegens, incumbens, majus, plano-horizontale, ungue ſuperiori margini receptaculi inſertum, extra calycem ad ſubrotundam figuram accedens, fere integrum, linea longitudinali præſertim verſus apicem, elevata, quaſi ad latera depreſſum fuiſſet petalum. Pars petali baſi proxima ad ſemicylindraceam accedens, ſubjecta amplectitur. Limbus petali utrinque deprimitur, latera autem margini proxima ſurſum reflectuntur, ubi dimidiatus tubus deſinit ad explicationem dimidiati limbi, fiunt a tergo duæ impreſſiones concavæ, ſubtus prominentes, quæ alas ſubjacentes comprimunt.

Alæ: Petala duo, paria, ad ſingulum latus floris ſingula, ſub vexillo poſita, margine incumbentia, parallela, ex ſubrotundo-oblonga, extrorſum latiora,

tiora, margine ſuperiori rectiore, inferiori ad rotunditatem magis dilatato; baſis biſida eſt in ſingulo, cujus pars inferior producitur in unguem, lateri receptaculi inſerto, longitudine circiter calycis; pars autem ſuperior brevior eſt, & inflexa.

Carina: Petalum infimum ſæpius bipartitum, ſub vexillo, intra alas collocatum, cymbiforme, concavum, lateribus compreſſum, ſitu natantis cymbæ, baſi mutilatum, cujus pars inferior extenditur in unguem, longitudine calycis, receptaculo inſertum: laciniæ autem laterales & ſuperiores breviores implicantur cum alarum parte conformi. Latera carinæ forma gaudent alis conſimili & ſitu fere æquali, licet inferiore & interiore, linea carinalis hujus petali ad medium usque recta extenditur, deinde ſenſim aſcendit ad ſegmentum circuli; Linea vero marginalis recta excurrit ad apicem, ubi cum carinali linea obtuſe deliqueſcit.

STAM. *Diadelpha* dicta: *Filamenta* duo, difformia, *alterum inferius* piſtillum involvens, *alterum ſuperius* piſtillo incumbens.

F. *inferius* germen vaginans, infra medium membranaceum, cylindraceum, longitudinaliter ſurſum dehiſcens; inde definit in partes 9. ſubulatas, longitudinem & flexuram carinæ ipſius corollæ imitantes, e quibus radii intermedii ſeu inferiores, per paria alterna longiores ſunt.

F. *ſuperius* ſubulato-ſetoſum, rimam filamenti prioris cylindracei tegens, incumbens, ſitu reſpondens, ſimplex, & ſecundum gradus brevius exiſtens, baſi ſua dehiſcit a reliquis: & melli utrinque exitum parat.

Antheræ ſimul numeratæ 10. ſunt: *unicum* in filamento ſuperiore: *novem* (ſingula anthera ſingulo radio filamenti inferioris inſidente:) vero in inferiore. Singulæ parvæ, æquales magnitudine, terminales.

PIST. unicum, ſuperum: *Germen* oblongum, teretiuſculum, leviter compreſſum, rectum, longitudine cylindri filamenti inferioris, a quo involvitur.

Stylus ſubulato-filiformis, aſcendens, longitudine & ſitu radiorum filamenti, inter quos collocatur, marceſcens.

Stigma pubeſcens, a parte ſurſum verſa, *Antheris* immediate ſubjectum.

PER. *Legumen* oblongum, compreſſum, obtuſum, bivalve, ſutura longitudinali ſupra & infra exiſtente, utraque recta, ſuperiore tamen prope baſin deſcendente, & inferiore prope apicem adſcendente, dehiſcens demum ſutura ſuperiore.

SEM. nonnulla, ſubrotunda, glabra, carnoſa, pendula, embryone prominulo verſus inſertionis hilum punctata. Excluſis ovis ſervant Cotyledones formam dimidiati ſeminis.

RECEPTACULA. *Seminalia propria* ſunt minima, breviſſima, baſi attenuata, diſco affigente obtuſa oblonga, inſerta longitudinaliter ſuturæ (tantum ſuperioris leguminis) ſitu alterno, ut ſeparatis valvulis alterna ſemina valvulæ adhæreant ſingulæ.

OBS. Claſſis *hæc eſt naturaliſſima, & inter omnes ſingularis ſtructuræ floris.*

FLORUM ſitus communis *eſt oblique pendulus ad angulum ſcilicet acutum a linea perpendiculari.*

Leguminis figura *non tanti eſt, ac a Syſtematicis facta, nec adeo abſolute pro diſtinguendis generibus accipienda, ac hactenus recepta fuit.* Calyx *autem licet vulgo vili æſtimatus, magni in genere faciendus eſt: nec* Folia *pro characteribus unquam aſſumi debent.*

Ord. I. HEXANDRIA, (Mit 6 Staubf.)

278) FUMARIA, (Erdrauch,) Linn. G. 849.

CAL. *Perianthium* diphyllum: *foliolis* oppoſitis, æqualibus, lateralibus, erectis, acutis, parvis, deciduis.

COR. oblonga, tubulata, ringens, palato prominente, faucem claudente.

Labium ſuperius planum, obtuſum, emarginatum, reflexum. (*Vexillum.*)

Nectarium eſt baſis Labii ſuperioris, poſtice prominens, obtuſa.

Lab. inferius ſuperiori omnino ſimile verſus baſin carinatum. (*Carina.*)

Nectarium eſt baſis carinata, licet minus prominens in hoc. (*Alæ.*)

Faux tetragona, obtuſa, perpendiculariter bifida.

STAM. *Filamenta* 2. æqualia, lata, intra ſingulum labium

bium ſingula, incluſa, acuminata. *Antheræ* tres in ſingulo filamento, terminales.

PIST. *Germen* oblongum, compreſſum, acuminatum. *Stylus* brevis. *Stigma* orbiculatum, erectum, compreſſum.

PER. *Silicula* unilocularis.

SEM. ſubrotunda.

OBS. Stamina *in hocce genere fere ſola conſtantia obſervantur.* Fumariæ *off.* *Silicula ſubrotunda, ſæpe monoſperma, decidua.*

SPEC. *Officinalis*, (gewöhnl. E. Taubenkropf.) pericarpiis monoſpermis racemoſis, caule diffuſo. *Loc.* Agris, montibus. *Fl.* May. Jun. *Vis.* Balſamica, tonica, pellens. *Uſ.* Bob. capr. ovibus pabulum.

Ord. II. OCTANDRIA, (Mit 8 Staubf.)

279) POLYGALA (Creuzblume,) Linn. G. 851.

CAL. *Perianthium* triphyllum, parvum: *foliolis* ovatis, acutis, *duobus* infra corollam, *unico* ſupra eandem, perſiſtentibus.

COR. Papilionacea ex figura, numero petalorum indeterminato exiſtente.

Alae ſubovatæ, planæ, maximæ, extra reliquas corollæ partes poſitæ, ex dentibus calycis factæ perſiſtentes. *Vexillum* fere cylindraceum, tubulatum, breve, *ore* reflexo, parvo, bifidum.

Carina concava, compreſſa, verſus apicem ventricoſa.

Appendix Carinae Corpora plerisque 2. tripartita, penicilliformia, carinæ verſus apicem affixa.

STAM. *Filamenta* diadelphia, (octo connata,) carina incluſa. *Antheræ* octo, ſimplices.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* ſimplex, erectus. *Stigma* terminale craſſiuſculum, bifidum.

PER. *Capſula* turbinato-cordata, compreſſa, *margine* acuto: bilocularis, bivalvis, *diſſepimento* valvis contrario. *margine* utrinque dehiſcens.

SEM. ſolitaria, ovata.

OBS. *Appendix carinae in diverſis diverſus eſt, & multis appendix, penicilliformis deeſt, unde imberbes dictæ.*

SPEC. *Vulgaris*, (gemeine C. Himmelfarts-Natter-

ter-Milch-Blume, Stamfel.) florib. criſtatis racemoſis, caulibus herbaceis ſimplicib. procumbentib. fol. lineari-lanceolatis. *Loc.* Pratis, montoſis, ſilvis. *Fl.* May. Jun. *Uſ.* Bob. capr. ovib. pabulum.

Ord. III. DECANDRIA. (Mit 10 Staubf.)

280) SPARTIUM, (Pfriemen,) Linn. G. 858.

CAL. *Perianthium* monophyllum, cordato-tubulatum: ſummo margine breviſſimum inferne, verſus apicem 5. denticulis notatum, coloratum, parvum.

COR. papilionacea, pentapetala.
Vexillum obcordatum, totum reflexum, maximum.
Alæ ovatæ, oblongæ, vexillo breviores, filamentis annexæ.
Carina dipetala, lanceolata, oblonga, alis longior, margine carinali villis connexo, filamentis inſerta.

STAM. *Filamenta* decem, connata, inæqualia, ſenſim longiora, *ſuperius* breviſſimum: *inferius* novemfidum. *Antheræ* oblongiuſculæ.

PIST. *Germen* oblongum, hirſutum. *Stylus* ſubulatus, aſſurgens. *Stigma* ſuperiori lateri apicis adnatum, oblongum, villoſum.

PER. *Legumen* cylindraceum, longum, obtuſum, uniloculare, bivalve.

SEM. plura, globoſo-reniformia.

SPEC. *Scoparium*, (Gniſt-Pfriemen-Beſen-Kr.) fol. ternatis, ſolitariisque, ramis inermib. angulatis. *Loc.* Arenoſis, ſilveſtribus, montoſis. *Fl.* Flav. Jun. apibus. *Uſ.* Ad ſepes in hortis, coriis parandis, ſemina toſta ſuccedaneum Coffeæ.

281) GENISTA, (Ginſter, Genſt,) Linn. G. 859.

CAL. *Perianthium* monophyllum, parvum, tubulatum, fere bilabiatum: *labio ſuperiori* bidentato, profundius diviſo: *labio inferiori* tridentato, fere æquali.

COR. papilionacea. *Vexillum* ovato-acutum, a carina remotum, totum reflexum.
Alæ oblongæ, laxæ; reliquis breviores.
Carina recta, emarginata, vexillo longior.

STAM. *Filamenta* decem, connata, e carina emergentia. *Antheræ* ſimplices.

PIST.

Pist. *Germen* oblongum. *Stylus* ſimplex, aſſurgens. *Stigma* acutum, involutum.
Per. *Legumen* ſubrotund., turgidum, uniloculare, bivalve.
Sem. ſolitaria, ſæpius reniformia.
Spec. 1) *Tinctoria*, (Färber G. Pfriemen, gelbe Färberblume,) fol. lanceolatis glabris, ramis ſtriatis, teretibus erectis. *Loc.* Silvis, montoſis. *Fl.* Luteus Mai. Jul. *Uſ.* Ad ſepes humiles in hortis; bob. capr. ovib. pabul. luteo-tinctorius, & pictorum Schütgelb, ex lac præparatur.
2) *Germanica*, (kleiner teutſcher G. Pfr.) ſpinis compoſitis, ramis floriferis inermibus, fol. lanceolatis. *Loc.* Silvis, montoſis. *Fl.* Mai.-Jul.

282) ONONIS, (Hauhechel,) Linn. G. 863.

Cal. *Perianthium* quinquepartitum, longitudine fere corollæ: *laciniis* linearibus, acuminatis, leviter ſurſum arcuatis: *infima* ſub carina.
Cor. papilionacea. *Vexillum* cordatum, ſtriatum lateribus depreſſum magis reliquis. *Alæ* ovatæ, vexillo dimidio breviores.
Carina acuminata, alis fere longior.
Stam. *Filamenta* 10. in cylindrum integrum connata, aſſurgentia. *Antheræ* ſimplices.
Pist. *Germen* oblongum, villoſum. *Stylus* ſimplex, aſſurgens. *Stigma* obtuſum.
Per. *Legumen* rhombeum, turgidum, ſubvilloſum, uniloculare, bivalve.
Sem. pauca, reniformia.
Spec. *Spinoſa*, (Stall-Ochſen-Kraut, Ochſenbreg,) florib. racemoſis geminis, ſubſeſſilibus ſolitariis lateralibus, fol. ternatis; ſuperiorib. ſolitariis; mitis, ramis inermibus ſubvilloſis: *Spinoſa* caule ſpinoſo. *Loc.* Aridis, montoſis, viis. *Fl.* purpur. Jul.-Sept. *Vis.* Radic. diuretica, pellens. *Uſ.* Bob. capr. ovib. pabul.

283) ANTHYLLIS, (Wolblume,) Linn. G. 864.

Cal. *Perianth.* monophyllum, ovato-oblongum, parum inflatum, villoſum, *ore* 5dentato, inæquali; perſiſtens.
Cor. papilionacea. *Vexillum* longius, lateribus reflexis, ungue longitudine calycis.
Alæ duæ oblongæ, vexillo breviores.
Carina compreſſa, longitudine alarum, alis ſimilis.

Stam.

STAM. *Filamenta* 10. connata aſſurgentia. *Antheræ* ſimplices.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* ſimplex, aſcendens. *Stigma* obtuſum.

PER. *Legumen* ſubrotundum, tectum, intra calycem, minimum, bivalve.

SEM. unum, alterumve.

SPEC. *Vulneraria*, (Wund-Kraut-Klee, groſſer-gelber-Haſen-Kazen-Klee,) herbacea, fol. pinnatis inæqualib. capitulo duplicato. *Loc.* Montoſis, pratis. *Fl.* Mai. Jun. *Uſ.* Bob. capr. ovib. pabul. herba luteo colore veſtes ruſticorum inficit. Color florum, ruber, luteus, albus variat ratione terræ.

284) PHASEOLVS, (Bohnen,) Linn. G. 866.

CAL. *Perianthium* monophyllum, bilabiatum: *labio ſuperiore* emarginato, *inferiore* tridentato.

COR. papilionacea. *Vexillum* cordatum, obtuſum, emarginatum, reclinatum, lateribus reflexis. *Alæ* ovatæ, longitudine vexilli, unguibus longis inſidentes.

Carina anguſta, ſpiraliter contra ſolem revoluta.

STAM. *Filamenta* diadelpha, (ſimplex & novemfidum,) intra carinam, ſpiralia. *Antheræ* decem, ſimplices.

PIST. *Germen* oblongum, compreſſum, villoſum. *Stylus* filiformis, ſpiraliter inflexus, ſuperne pubeſcens. *Stigma* obtuſum, craſſiuſculum, villoſum.

PER. *Legumen* longum, rectum, coriaceum, obtuſum cum acumine.

SEM. reniformia, oblonga, compreſſa.

OBS. *Carina cum contentis genitalibus ſpiralis, eſſentialis eſt nota.* Calyx *alius exterior dyphyllus ſubrotundus in multis ſpeciebus adeſt.*

SPEC. *Vulgaris*, (gemeine B.) volubilis, floribus racemoſis geminis, bracteis calyce minoribus, leguminib. pendulis, flore albo; *coccineus* flore coccineo, (türkiſche B.) *Loc.* Cultis, hortis. *Fl.* Mai. Jul. *Uſ.* Culinaris ad olera, acetaria: fabæ pulveriſatæ ad diapaſma ſine cortice duriore.

285) PISUM, (Erbſe,) Linn. G. 870.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, acutum, perſiſtens: *laciniis duabus ſuperioribus* latioribus.

COR.

Cor. papilionacea. *Vexillum* latiſſimum, obcordatum, reflexum, emarginatum cum acumine.
Alæ duæ, ſubrotundæ. conniventes, vexillo breviores.
Carina compreſſa, ſemilunulata, alis brevior.
Stam. *Filamenta* diadelpha, (*unicum* ſimplex ſuperius, ſubulato-planum: & *novem* ſubulata infra medium in cylindrum, ſuperne fiſſum; coalita. *Antheræ* ſubrotundæ.
Pist. *Germen* oblongum, compreſſum. *Stylus* aſcendens, triangulus, membranaceus, carinatus, extrorſum flexis lateribus. *Stigma* angulo ſuperiori adnatum, oblongum, villoſum.
Per. *Legumen* magnum, longum, teretiuſculum (vel compreſſum deorſum,) apice ſurſum acuminato, uniloculare, bivalve.
Sem. plura, globoſa.
Spec. 1) *Sativum*, (zahme E.) petiolis teretibus, ſtipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis multifloris; hortenſe majus, (Zucker-Erbſen,) ſine cortice duriore. *Loc.* Cultis, agris, hortis. *Fl.* alb. ſubruber. Mai. Jun. *Uſ.* Culinaris ad olera.
2) *Arvenſe*, (Stock-E.) petiolis tetraphyllis, ſtipulis crenatis, pedunculis unifloris. *Loc.* Inter ſegetes. *Fl.* Jun. Jul. *Uſ.* Culinar. pecorib. pabul.

286) OROBUS, (Erven, Kichern,) Linn. G. 871.

Cal. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, baſi obtuſum: *ore* obliquo, 5dentato, breviſſimo: *denticulis tribus inferioribus* acutioribus: *duobus ſuperioribus* brevioribus, profundius & obtuſe diviſis: marceſcens.
Cor. papilionacea. *Vexillum* obcordatum, apice lateribusque reflexum, longius.
Alæ duæ, oblongæ, longitudine fere vexilli, aſſurgentes, conniventes.
Carina inferne manifeſte bifida, acuminata, aſſurgens: *marginibus* conniventibus, parallelis, compreſſis: *fundo* ventricoſo.
Stam. *Filamenta* diadelpha, (ſimplex & novemfidum) aſcendentia. *Antheræ* ſubrotundæ.
Pist. *Germen* cylindraceum, compreſſum. *Stylus* filiformis, ſurſum flexus, erectus. *Stigma* lineare, latere interiori a medietate ad apicem ſtyli pubeſcens.
Per. *Legumen* teres, longum, apice acuminato aſcendente, uniloculare, bivalve.

Sem.

Sem. plurima, ſubrotunda.

Spec. 1) *Vernus*, (Frühlings-E. rothe-Wald-Wicken-Kichern,) fol. pinnatis ovatis, ſtipulis ſemiſagittatis integerrimis, caule ſimplici. *Loc.* Nemoroſis, montoſis. *Fl.* Purpur. May. *Uſ.* Bob. capr. ovibus, equis, pabulum.

2) *Tuberoſus*, (knollichte E. falſch Süſsholz, Waldwicken,) fol. pinnatis lanceolatis, ſtipulis ſemiſagittatis integerrimis, caule ſimplici. *Loc.* Pratis, ſilvis. *Fl.* May. Jun. *Uſ.* Bob. capr. ovibus, equis, pabul. & apib. Radix in annonæ difficultate aliment.

287) LATHYRUS, (Platerbſe,) Linn. G. 872.

Cal. *Perianthium* monophyllum, ſemiquinquefidum, campanulatum: *laciniis* lanceolatis, acutis: ſuperioribus duabus brevioribus, infima longiore.

Cor. papilionacea. *Vexillum* obcordatum, maximum lateribus & apice reflexum,
Alæ oblongæ, lunulatæ, breves, obtuſæ.
Carina ſemiorbiculata, magnitudine alarum, iisque latior, in medio introrſum dehiſcens.

Stam. *Filam.* diadelpha, aſſurgentia. *Antheræ* ſubrotundæ.

Pist. *Germen* compreſſum, oblongum, lineare. *Stylus* ſurſum erectus, planus, ſuperne latior, apice acuto. *Stigma* villoſum, a medietate ſtyli ad apicem antice.

Per. *Legumen* longiſſimum, cylindraceum vel compreſſum, acuminatum, bivalve.

Sem. plura, cylindracea, globoſa, vel parum angulata.

Spec. 1) *Odoratus*, (wohlriechende P. ſpaniſche Wicken,) pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, fol. ovato-oblongis, leguminibus hirſutis. *Loc.* Europæ hortis. *Fl.* Suaveolens purpur. & rubro-albus Jun. Aug.

2) *Tuberoſus*, (knollichte P. Erd-Nus-Mäusgen-Feigen-Eicheln, falſch Schweinbrod,) pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ovalib. internodiis nudis. *Loc.* Montoſis, ſilvis, inter ſegetes. *Fl.* Jun. Jul. *Uſ.* Bob. capr. ov. equis, pabul. & apib. radix eſculenta in annonæ penuria ad alimentum.

3) *Pratenſis*, (Wieſen-P. Kichern, gemeine gelbe-Vogel-Honig-Zaunwicken,) pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis, foliolis lanceolatis. *Loc.* Pratis, ſilvis, ad muros. *Fl.* Luteus, May. *Uſ.* Bob. capr. ovibus, equis, pabulum & apibus.

4) *Sil-*

4) *Silveſtris*, (wilde P. Wald-Kichern,) pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis enſiformibus, internodiis membranaceis. *Loc.* Montoſis, ſilvis. *Fl.* Jul. apibus.

288) VICIA, (Wicke,) Linn. G. 873.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, erectum, ſemiquinquefidum, acutum, ſurſum obliquum, *dentibus ſuperioribus* brevioribus, conniventibus: *omnibus* æqualis latitudinis.

COR. papilionacea. *Vexillum* ovale, ungue lato oblongo, apice emarginatum cum acumine, lateribus reflexum, linea longitudinali compreſſa elevata.

Alæ duæ, oblongæ, rectæ, ſemicordatæ, ungue oblongo, vexillo breviores.

Carina ungue oblongo, bipartito: ventriculo compreſſo, ſemiorbiculato, alis breviore.

STAM. *Filamenta* diadelpha. *Antheræ* erectæ, ſubrotundæ, quadriſulcæ.

Nectarii glandula intra ſtamen compoſitum & germen e receptaculo oritur brevis, acuminata.

PIST. *Germen* lineare, compreſſum, longum. *Stylus*, filiformis, brevior, ad angulum erectum aſcendens. *Stigma* obtuſum ſub apice barbatum.

PER. *Legumen* longum, coriaceum, bivalve, uniloculare. acumine terminatum. SEM. plura, ſubrotunda.

SPEC. 1) *Cracca*, (Vogelwicke, groſſe blaue Waldwicke,) pedunculis multifloris, florib. imbricatis, foliolis lanceolatis pubeſcentibus, ſtipulis integris. *Loc.* Pratis, agris. *Fl.* Jun. *Uſ.* Bobus, capris, ovibus, equis, pabulum & apibus.

2) *Sativa*, (Futer-Heide-W.) leguminibus ſeſſilib. ſubinatis erectis, foliis retuſis, ſtipulis notatis. *Loc.* Cultis, inter ſegetes. *Fl.* Jun. *Uſ.* Herba bob. capr. ovib. equis, flores apibus, ſemina avib. gallinis, columbis, ſuib. pabulum; & in annonæ penuria loco panis.

3) *Sepium*, (wilde Waid-Zaun-W.) Leguminibus pedicellatis ſubquaternis erectis, foliolis ovatis acutis integerrimis, exterioribus decreſcentibus. *Loc.* Sepibus. *Fl.* May. Jun. *Uſ.* Bob. vaccis capr. ovib. equ. ſuibus pabulum.

4) *Faba*, (Buffbohne,) caule erecto, petiolis abs-

que cirrhis: minor ſ. equina, (Saubohne,) corollarum odoratarum ala in medio macula atra holoſericea; foliola convoluta, ſemina ovata, compreſſa. *Loc.* Cultis, agris. *Uſ.* Seminum culinaris, ſuccedaneum panis.

289) ERVUM, (Linſe,) Linn. G. 874.

CAL. *Perianthium* ſpartitum, longitudine fere corollæ; *laciniis* linearibus, acuminatis, fere æqualibus.
COR. papilionacea. *Vexillum* planum, leviter reflexum, ſubrotundum, majus.
Alæ obtuſæ, vexillo dimidio breviores.
Carina alis brevior, acuminata.
STAM. *Filamenta* diadelpha, aſſurgentia. *Antheræ* ſimplices.
PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* ſimplex, aſſurgens. *Stigma* obtuſum, imberbe.
PER. *Legumen* oblongum, obtuſum, teres, ſeminibus protuberantibus, nodoſum.
SEM. quatuor, fere ſubrotunda.
OBS. Differt a vicia ſolo *Stigmate*.

SPEC. 1) *Lens*, (gemeine L.) pedunculis ſubbifloris, ſeminib. compreſſis convexis, foliolis integerrimis, ſtipulis indiviſis. *Loc.* Inter ſegetes. *Fl.* Jun. *Uſ.* Seminum alimentarius hominib. & animalibus.

2) *Hirſutum*, (zottige L. kleine wilde rauhe Feldwicke.) pedunculis multifloris, ſeminib. globoſis binis. *Loc.* Agris. *Fl.* Jun.

290) CYTISUS, (Geisklee,) Linn. G. 877.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, breve, baſi obtuſum: *ore* bilabiato: *ſuperiore* bifido, acuminato: *inferiori* tridentato.
COR. papilionacea. *Vexillum* ovatum, aſſurgens, lateribus reflexis. *Alæ* longitudine vexilli, rectæ, obtuſæ. *Carina* ventriculoſa, acuminata.
STAM. *Filamenta* diadelpha, aſſurgentia. *Antheræ* ſimplices.
PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* ſimplex, aſſurgens. *Stigma* obtuſum.
PER. *Legumen* oblongum, obtuſum, baſi anguſtum, rigidum.

SEM.

SEM. nonnulla, reniformia, compreſſa.

SPEC. *Nigricans*, (ſchwärzlicher G.) racemis ſimplicib. erectis, foliolis ovato-oblongis. *Loc.* Montoſis, ſilvis. *Fl.* Jun. Jul.

2) *Cajan*. (Indianiſcher G.) racemis axillarib. erectis, foliolis ſublanceolatis tomentoſis: intermedio longius petiolato. *Loc.* Eur. hortis. *Fl.* Luteus Jun. *Uſ.* Seminum eſculentus & columbis pabulum.

291) CORONILLA, (Kronwicke,) L. G. 883.

CAL. *Umbellula* ſimplex. *Perianthium* monophyllum, breviſſimum, compreſſum, bifidum, erectum, *dentibus tribus inferioribus* minoribus, ſuperioribus *duobus* coalitis, perſiſtens.

COR. papilionacea.

Vexillum cordatum, undique reflexum, alis vix longius.

Alæ ovatæ, ſurſum conniventes, deorſum dehiſcentes, obtuſæ.

Carina compreſſa, acuminata, aſcendens, alis ſæpius brevior.

STAM. *Filamenta* diadelpha, (ſimplex & novemfidum,) ad angulum fere rectum aſcendentia, apicibus latiuſculis. *Antheræ* ſimplices, parvæ.

PIST. *Germen* teres, oblongum. *Stylus* ſetaceus, aſcendens. *Stigma* parvum, obtuſum.

PER. *Legumen* longiſſimum, teres rectum, inter ſingula ſemina iſthmis contractum, bivalve, unilociulare, articulatim diſcedens.

SEM. plura.

SPEC. *Varia*, (bunte K. falſches Saintfoin, Peltſchenkraut.) herbacea, leguminibus erectis teretib. torofis numeroſis, foliolis plurimis glabris. *Loc.* Montoſis, collibus. *Fl.* Jul. Aug.

292) ORNITHOPUS, (Vogelfus,) Linn. G. 884.

CAL. Umbella ſimplex. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, *ore* quinquedentato, fere æquali, perſiſtens.

COR. papilionacea.

Vexillum obcordatum, integrum.

Alæ ovatæ, rectæ, magnitudine vix vexilli.

Carina compreſſa, minima.

STAM. *Filamenta* diadelpha. *Antheræ* ſimplices.
PIST. *Germen* lineare. *Stylus* ſetaceus, aſcendens, *Stigma* punctum terminale.
PER. *Legumen* ſubulatum, teres, arcuatum, articulatum, iſthmisque interceptum, articulatim diſcedens.
SEM. ſolitaria, ſubrotunda.

SPEC. *Perpuſillus*, (kleiner V.) fol. pinnatis, leguminibus ſubarcuatis, articulis leguminum ſubrotundis lævibus. *Loc.* Montoſis arenoſis. Fl. Jun.

293) HIPPOCREPIS, (Hufeiſen) Linn. G. 885.

CAL. Umbella ſimplex. *Perianthium* monophyllum, 5dentatum, *denticulis duobus ſuperioribus*, conjunctis, minusque diviſis, perſiſtens.
COR. papilionacea.
Vexillum cordatum, ungui longitudine calycis inſidens.
Alæ ovato-oblongæ, obtuſæ.
Carina lunulata, compreſſa.
STAM. *Filam.* diadelpha, aſcendentia. *Anth.* ſimplices.
PIST. *Germen* tenue, oblongum, deſinens in *Stylum* ſubulatum, aſcendentem. *Stigma* ſimpliciſſimum.
PER. *Legumen* compreſſo membranaceum, longiſſimum, incurvatum, ſutura altera fere ad ſuperiorem inciſum multoties, ſinubus ſubrotundis, hinc *articulis* conſtans obtuſe trigonis, plurimis, ſutura ſuperiore connexis.
SEM. ſolitaria ſingulo articulo, oblonga, incurva.
OBS. *Eſſentialis character in Legumine ſoleæ equinæ forma conſtat.*

SPEC. *Comoſa*, (zopfiges H.) leguminibus pedunculatis confertis, margine exteriore repandis. *Loc.* Montoſis. *Fl.* May.

294) HEDYSARUM, (Süſsklee) Linn. G. 887.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ſemiquinquefidum: *laciniis* ſubulatis, erectis, perſiſtentibus.
COR. papilionacea, ſtriata.
Vexillum reflexo-compreſſum, ovato-oblongum, emarginatum longum.
Alæ oblongæ, reliquis anguſtiores, rectæ.
Carina recta, compreſſa, extrorſum latior, fere rectangulo obtuſa, a baſi ad gibbum bifida.
STAM. *Filamenta* diadelpha, (ſimplex & novemfidum) ad

ad angulum rectum inflexa. *Antheræ* ſubrotundæ, compreſſæ.

PIST. *Germen* tenue, compreſſum, lineare. *Stylus* ſubulatus, ut ſtamina inflexus. *Stigma* ſimpliciſſimum.

PER. *Legumen* articulis ſubrotundis, compreſſis, monoſpermis, bivalvibus.

SEM. reniforme, ſolitarium.

OBS. *Pericarpium in hoc genere parum differt, hinc in varia genera dilaceratum fuit.*

Onobrychis *T. Legumen unico articulo conſtans.*

SPEC. *Onobrychis*, (türkiſcher Klee, Schweizer-Hanenkam-Klee, Hanenkopf, Eſperſette,) fol. pinnatis, leguminibus monoſpermis aculeatis, corollarum alis calyce breviorib. caule elongato: incana, foliis longioribus. *Loc.* Cultis, pratis. *Fl.* rubro-purpur. May. Jun. *Uſ.* Folior. equis, jumentis pabulum.

295) ASTRAGALUS, (Tragant,) Linn. G. 892.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, quinquedentatum, acutum, *denticulis inferioribus* gradatim minoribus.

COR. papilionacea.

Vexillum longius reliquis, lateribus reflexum, emarginatum, obtuſum, rectum.

Alæ oblongæ, vexillo breviores.

Carina longitudine alarum, emarginata.

STAM. *Filamenta* diadelpha, fere recta. *Antheræ* ſubrotundæ.

PIST. *Germen* teretiuſculum. *Stylus* ſubulatus, aſcendens. *Stigma* obtuſum.

PER. *Legumen* biloculare: *loculis* ad alterum latus magis flexis.

SEM. reniformia.

SPEC. *Glyccyphyllos*, (wildes Süſsholz, Foenugrec, Steinwicken,) cauleſcens proſtratus, leguminibus ſubtriquetris arcuatis, foliis ovalibus pedunculo longioribus. *Loc.* Nemoroſis, montoſis. *Fl.* Jul. *Uſ.* Pecorib. pabul. folia dulcia.

296) TRIFOLIUM, (Klee.) Linn. G. 896.

CAL. *Umbellula* ſ. capitulum receptaculo communi. *Perianthium* monophyllum, tubulatum quinquedentatum, perſiſtens.

Cor. papilionacea, ſæpius perſiſtens, marceſcens.
Vexillum reflexum.
Alæ vexillo breviores.
Carina alis brevior.
Stam. *Filamenta* diadelpha. *Antheræ* ſimplices.
Pist. *Germen* ſubovatum. *Stylus* ſubulatus, aſcendens. *Stigma* ſimplex.
Per. *Legumen* breve, univalve, non dehiſcens, deciduum.
Sem. pauciſſima, ſubrotunda.
Obs. *Characterem hujus generis abſolutum cum nota ſua vera & eſſentiali, inter omnes dare difficillimum iudico.*
Spec. 1) *Melilotus officinalis*, (gemeiner teutſcher gelber Steinklee,) leguminibus racemoſis nudis diſpermis rugoſis acutis, caule erecto. *Loc.* Saxoſis, pratis. *Fl.* Flav. & alb. Jul.-Sept. *Vis.* Anodyna, emolliens, reſolvens, lubricans. *Uſ.* Pecorib. bob. capr. ovib. equis, ſuib. pabulum.
2) *Hybridum*, (Baſtart K.) capitulis umbellatis, leguminibus tetraſpermis, caule adſcendente. *Loc.* Cultis, Eur. hortis. *Fl.* Alb. apib. pabulum.
3) *Repens*, (kriechender K. Bienenklee, kleiner weiſſer Wieſen Honigk.) Capitulisum bellaribus, ſubrotundis, leguminibus tetraſpermis, floſculis pedunculatis, caule repente. *Loc.* Paſcuis. *Fl.* Alb. Aug. *Uſ.* Pabul. pecorib. & apibus flores ſiccati loco panis in annona.
4) *Pratenſe*, (gemeiner groſſer braunrother Wieſenklee, Himmelbrod.) ſpicis ſubvilloſis, cinctis ſtipulis oppoſitis membranaceis, corollis monopetalis. *Loc.* Pratis. *Fl.* May.-Aug. *Uſ.* Vaccis, bob. capr. ovib. equ. ſuib. pabul. & apib. Floſculi ſiccati loco panis *Scotis;* florum capitula veſtimenta eorum lanea inficiunt colore viridi.
5) *Arvenſe*, (Acker K. Haſen K.-Pfötchen,) ſpicis villoſis ovalibus dentib. calycinis ſetaceis æqualib. *Loc.* Agris. *Fl.* Jul. coriis parandis.

297) LOTUS (Schotenklee,) Linn. G. 897.

Cal. *Umbellula* ſimplex. *Perianthium* monophyllum, teres, ſemiquinquefidum, *dentibus* acutis, æqualibus, erectis, perſiſtens.
Cor. papilionacea.

Vexil-

Vexillum ſubrotundum, deorſum flexum: ungue oblongo, concavo.
Alæ ſubrotundæ, vexillo breviores, latæ, ſurſum conniventes.
Carina inferne gibba, ſuperne clauſa, acuminata, aſcendens, brevis.
STAM. *Filamenta* diadelpha, aſcendentia, apicibus latiuſculis. *Antheræ* parvæ, ſimplices.
PIST. *Germen* teres, oblongum. *Stylus* ſimplex, aſcendens. *Stigma* punctum inflexum.
PER. *Legumen* cylindraceum, ſtrictum, farctum, calyce longius, multiloculare, bivalve, uniloculare.
SEM. plura, cylindrica.
SPEC. 1) *Siliquoſus*, (Wieſen S.) leguminib. ſolitariis membranaceo-quadrangulis, caulibus procumbentib. foliis ſubtus pubeſcentib. *Loc.* Montoſis pratis ſubhumidis. *Fl.* Lut. Jun.
2) *Corniculatus*, (kleiner gelber gehörnter S. Walzenkraut, Honig-Horn-Klee.) florum capitulis depreſſis, caulibus herbaceis decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus. Trifolium corniculatum. *Loc.* Aridis, agris ſepibus, pratis. *Fl.* Luteus May. *Uſ.* Pecorib. pabul. & apibus.

298) TRIGONELLA, (Trigonelle,) L. G. 898.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, ſequinquefidum; *denticulis* ſubulatis, fere æqualibus.
COR. papilionacea, quaſi tripetala.
Vexillum ſubovatum, obtuſum, reflexo-patens.
Alæ duæ, ovato-oblongæ, extrorſum reflexo-patentes: ut vexillum cum alis quaſi conſtituat corollam tripetalam regularem.
Carina breviſſima, obtuſa, umbilicum floris occupans.
STAM. *Filamenta* diadelpha brevia, aſſurgentia. *Antheræ* ſimplices.
PIST. *Germen* ovato-oblongum. *Stylus* ſimplex, aſſurgens. *Stigma* ſimplex.
PER. *Legumen* ovato-oblongum, compreſſum, tectum.
SEM. plura, ſubrotunda.
OBS. *Sola Corollæ figura ab omnibus diſtinctum evadit genus.*
SPEC. 1) *Corniculata*, (gehörn'er T.) leguminibus pedunculatis, congeſtis declinatis, ſubfalcatis, florib.

ſpicatis, pedunculis communibus longis ſubſpinoſis, caule erecto. *Loc.* Silvis. *Fl.* Jul.

2) *Foenum græcum*, (Bockshorn, griechiſch Heu, Siebenzeit,) leguminibus ſeſſilib. ſtrictis erectiuſculis ſubfalcatis acuminatis, caule erecto. *Loc.* Cultis. *Fl.* Jun. *Vis.* Inviſcans, nutriens, emolliens; equis medicamentum proficuum.

299) MEDICAGO, (Schneckenklee,) L. G. 899.

CAL. *Perianthium* monophyllum, rectum, campanulato-cylindraceum, ſemiquinquefidum, acuminatum, æquale.

COR papilionacea.

Vexillum ovatum, integrum, marginibus inflexis, totum reflexum.

Alæ ovato-oblongæ, appendice carinæ affixæ, lateribus conniventibus ſub carina.

Carina oblonga, bifida, patens, obtuſa, deflexa a piſtillo & hians a vexillo.

STAM. *Filamenta* diadelpha, coalita fere ad apices. *Antheræ* parvæ.

PIST. *Germen* pedicellatum, oblongum, incurvatum, compreſſum, filamentis involutum, e carina exiliens, vexillum reflectens, definens in *Stylum* brevem, ſubulatum, fere rectum. *Stigma* terminale minimum.

PER. *Legumen* compreſſum, longum, inflexum.

SEM plura, reniformia vel angulata.

SPEC. 1) *Sativa*, (Lucerne, Spargel-Schneckenklee,) pedunculis racemoſis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. *Loc.* Cultis & apricis Galliæ. *Fl.* Jun. Jul. *Uſ.* Pecorib. pabulum.

2) *Falcata*, (wilder gelber Sichelklee, groſſer Steinklee, ſchwediſch Heu,) pedunculis racemoſis, leguminibus lanatis, caule proſtrato. *Loc.* Montoſis, viis, pratis apricis, ſiccis. *Fl.* Flav. Jun. Jul. apibus. *Uſ.* Pecorib. pabulum.

Claſſis XVIII.

POLYADELPHIA.

(Mit verwachſenen Staubfäden in mehr als zwey Partheyen.)

Ord.

Ord. IV. POLYANDRIA (Viele dem Fruchtboden einverleibte Staubfäden.)

300) HYPERICUM, (Johannis Pflanze,) L. G. 902.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: *laciniis* ſubovatis, concavis, perſiſtentibus.

COR. *Petala* quinque, oblongo-ovata, obtuſa, patentia, ſecundum motum ſolis notata.

STAM. *Filamenta* numeroſa, capillaria, baſi coalita in quinque ſeu tres phalanges. *Antheræ* parvæ.

PIST. *Germen* ſubrotundum. *Styli* 3. (ſimplices interdum 1. 2. 5.) ſimplices, diſtantes, longitudine ſtaminum. *Stigmata* ſimplicia.

PER. *Capſula* ſubrotunda, *loculis* numero ſtyli.

SEM. plurima, oblonga.

SPEC. 1) *Perforatum*, (gemeines durchſtochenes I. Hexenkraut, Hartheu.) floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtuſis pellucido-punctatis. *Loc.* Pratis, ſilvis, ſepibus. *Fl.* Jun.-Sept. *Vis.* Vulneraria, reſolvens, antiverminoſa. *Uſ.* Flores aperti apibus proficui, nondum aperti flavotinctorii: pecorib. pabul. junior planta: ſpiritum frumenti purpure ocolore flores tingunt.

2) *Hirſutum*, (zotige I.) floribus trigynis, calycibus ſerrato-glanduloſis, caule tereti erecto, foliis ovatis ſubpubeſcentibus. *Loc.* Silvis, montibus. *Fl.* Jun. Jul. rubro-tinctor.

Claſſis XIX.

SYNGENESIA,

(Mit verwachſenen Staubbeuteln;)

SYNGENESIA * Compoſiti Tournef. Riv. Raj. Herm. &c.

FLOSCULI Character Naturalis.

CAL. Corona ſeminis, apici germinis inſidens. (*Vide ſeminis coronam.*)

COR. monopetala *Tubo* anguſtiſſimo, longo, germini inſidens: *eſt vel*

α. TUBULATA: *Limbo* campanulato, quinquefido: *laciniis* reflexo-patentibus.

β. LIGULATA: *Limbo* lineari plano, extrorsum verso, apice integro, tridentato vel 5dentato, truncato.

γ. NULLA: *Limbo* destituta, *tuboque* saepe carens.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima, collo corollulae inserta. *Antherae* totidem, lineares, erectae, lateribus coalitae in cylindrum tubulatum, quinquedentatum, longitudine limbi.

PIST. *Germen* oblongum, inferum sub corollula, supra receptaculum commune. *Stylus* filiformis, erectus, staminum longitudine, Antherarum cylindrum perforans. *Stigma* bipartitum, *laciniis* revolutis, patentibus.

PER. verum nullum, licet in quibusdam *Crusta* coriacea.

SEM. unicum, oblongum, saepe tetragonum, basi saepius angustiore.

Coronatum PAPPO *radiis* plurimis in orbem positis *simplicibus* vel *radiatis*, vel *ramosis*: eoque pappo vel *sessili* vel *stipiti* insidente.

PERIANTHIO parvo, saepe 5dentato, persistente.

Corona destitutum.

OBS. *Sexus vario modo sese habet, hinc sequentes species floseulorum.*

Floseulus Tubulatus Hermaphroditus, *si stamina & pistillum adsint.*

- - - - - Masculus, *si stamina sine stigmatibus.*
- - - - - Femineus, *si pistillum sine staminibus.*
- - - - - Neutra, *si nec stamina, nec stylus, aut stigma.*
- - - *Ligulatus* Hermaphroditus, Masculus, Femineus, Neuter *ex prioribus patent,*

FLOSCULOSI Character.

FLOSCULOSUS flos, *Compositus* est ex Floseulis plurib.

RECEPTACULUM COMMUNE FRUCTIFICATIONIS plures Floseulos sessiles recipit.

Disco concavo, plano, convexo, pyramidato vel globoso.

- - superficie *nuda*, leviss imis punctis inaequali, vel *villosa*: villis erectis tecta, vel *Paleacea*: paleis linearibus, subulatis, compressis, erectis, floseulis distinguentibus vestita.

CALYX. *Communis* est *Perianthium*, quod Receptaculum

lum & floſculos continet, qui contrahitur abſoluta floreſcentia: expanſus reflectitur maturo ſemine: & eſt vel *Simplex*, dum ſerie unica ambit floſculos. *Imbricatus*, dum ſquamæ numeroſæ exteriores gradatim breviores, incumbunt interioribus.
Auctus, dum unica ſeries laciniarum æqualis longior cingit floſculos, & alia minima cingit baſin tantum ſimplicis interioris & majoris calycis.

SPECIES COMPOSITORUM Florum ſequentes ſunt: componuntur enim vel ex
1. Floſculis tubuloſis hermaphroditis in diſco; tubuloſis hermaphroditis in radio.
2. Floſculis tubuloſis hermaphroditis in diſco; tubuloſis femineis in radio.
3. Floſculis tubuloſis hermaphroditis in diſco; tubuloſis neutris in radio.
4. Floſculis tubuloſis hermaphroditis in diſco; ligulatis hermaphroditis in radio.
5. Floſculis tubuloſis hermaphroditis in diſco; ligulatis femineis in radio.
6. Floſculis tubuloſis hermaphroditis in diſco; ligulatis neutris in radio.
7. Floſculis tubuloſis hermaphroditis in diſco; nudis femineis in radio.
8. Floſculis tubuloſis maſculinis in diſco, nudis femineis in radio.
9. Floſculis ligulatis hermaphroditis in diſco; ligulatis hermaphroditis in radio.

Ord. I. POLYGAMIA ÆQUALIS, (Mit lauter fruchtbaren Zwittern.)

301) TRAGOPOGON, (Bocksbart,) L. G. 905

CAL. *Communis* ſimplex, octophyllus: *foliolis* lanceolatis, æqualibus, *alternis* interioribus, *omnibus* coalitis baſi.
COR. *Compoſita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* multis, *exterioribus* paulo longioribus. *Propria* monopetala, ligulata, truncata, ſdentata.
STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima, *Anthera* cylindracea, tubulata.
PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, revoluta.

PER.

PER. nullum. *Calyx* connivens, acuminatus, longitudine ſeminum, ventriculoſus.
SEM. ſolitaria, oblonga, utrinque attenuata, angulata, ſcabra, ſtipite ſubulato, longo, pappigero terminata. *Pappus* plumoſus, planus, radiis circiter triginta duob.
REC. *Commune* nudum, planum, ſcabrum.
SPEC. *Pratenſe*, (wilder gelber Wieſen B. Wolfsbart, Süſsling, Haberwurz, Habermauchele,) calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris ſtrictis. *Loc.* Pratis apricis. *Fl.* Flav. May. Jun. apibus. *Uſ.* Culinar. turiones loco aſparagorum. Bob. capr. ovib. equ. ſuibus pabulum nutriens.

302) SCORZONERA, (Scorzoner,) L. G. 906.
CAL. *Communis* imbricatus, longus, fere cylindraceus: *ſquamis* circiter 15. margine membranaceis.
COR. *Compoſita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* plurimis, *exterioribus* paulo longioribus. *Propria* monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinquedentata.
STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.
PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, reflexa.
PER. nullum. *Calyx* ovato-oblongus, connivens.
SEM. ſolitaria, oblonga, cylindracea, ſtriata, calyce dimidio breviora. *Pappus* plumoſus.
REC. nudum.
SPEC. 1) *Humilis*, (wilde niedrige teutſche S. Schlangenwurz,) caule ſubnudo unifloro, foliis lato lanceolatis nervoſis planis. *Loc.* Montoſis, pratis apricis. *Uſ.* Ovib. pabul. & ſuibus farinacea radix quæ ſuccedaneum eſt panis, uſtilagine corrupti flores pigmentum nigrum Sinenſi ſimile, (Tuſch,) exhibent.
2) *Hiſpanica*, (Spaniſche Schlangenmord,) caule ramoſo, foliis amplexicaulibus integris ſerrulatis, latifolia ſinuata. *Loc.* Cultis, Eur. hortis. *Uſ.* Culinar. eſculentæ radicis mucilaginoſæ ſubamaro-dulcis.

303) PICRIS (Bitterkraut,) Linn. G. 907.
CAL. *Communis* duplicatus. *Exterior* maximus, pentaphyllus: *foliolis* cordatis, planis, laxis conniventibus. *Interior* imbricatus, ovatus. COR.

Cor. *Compoſita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* numeroſis.
Propria monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinquedentata.
Stam. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.
Pist. *Germen* ſubovatum. *Stylus* longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, reflexa.
Per. nullum. *Calyx* immutatus.
Sem. ſolitaria, ventricoſa, obtuſa, *Pappus* plumoſus.
Rec. nudum.
Spec. *Hieracioides*, (Habichtkraut ähnliches B. Coſtenkraut.) perianthiis laxis, foliis integris.
Loc. Agrorum verſuris. *Fl.* Lut. Jun.

304) SONCHUS, (Gänſediſtel,) Linn. G. 908.

Cal. *Communis* ventricoſo-gibbus, *ſquamis* plurimis, linearibus, inæqualibus.
Cor. *Compoſita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* numeroſis æqualibus.
Propria monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinquedentata.
Stam. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.
Pist. *Germen* ſubovatum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, reflexa.
Per. nullum. *Calyx* connivens in globum depreſſum, acuminatum.
Sem. ſolitaria, oblongiuſcula, *Pappus* piloſus nudus.
Rec. nudum.
Spec. 1) *Arvenſis*, (Acker G. groſer kriechender Ackerhaſenkohl,) pedunculis calycibusque hiſpidis, ſubumbellatis, foliis runcinatis baſi cordatis. *Loc.* Agris argilloſis. *Fl.* Aug.
2) *Oleraceus*, (Kohlartiger G. Sau-Leber-Diſtel, Haſenkohl.) pedunculis tomentoſis, calycibus glabris, annuus, ramoſus, diffuſus, foliis laciniatis. *Loc.* Cultis, hortis. *Fl.* Jun.-Aug. apibus. *Uſ.* Culinar. ad olera, acetaria tenera fol. & rad. nutriens: vaccar. leporum pabul. & ovium.

305) LACTUCA, (Salat, Lattich,) Linn. G. 909.

Cal. *Communis* imbricatus, ſubcylindricus, *ſquamis* plurimis, acuminatis.

Cor.

Cor. *Compoſita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* plurimis, æqualibus.
Propria monopetala, ligulata, truncata, 4-5dentata.
Stam. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubulata.
Pist. *Germen* ſubovatum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, reflexa.
Per. nullum. *Calyx* connivens, ovato-cylindraceus.
Sem. ſolitaria, ovata, acuminata, compreſſa. *Pappus* ſimplex piloſus, *Stipite* longo, inferne attenuato.
Rec. nudum.
Spec. 1) *Sativa*, (zahmer S.) foliis rotundatis, caule corymboſo, capitata, (Kopf S.) criſpa, (krauſe S.) *Loc.* Cultis, agris, hortis. *Fl.* Aug. *Vis.* Refrigerans, relaxans, diluens. *Uſ.* Culinaris, ad olera, acetaria.
2) *Perennis*, (beſtändiger Berg S. Heidelattich,) foliis linearibus dentato-pinnatis, laciniis ſurſum dentatis. *Loc.* Montoſis. *Fl.* Cærul. Jun.

306) CHONDRILLA, (Chondrille,) Linn. G. 910.

Cal. *Communis* calyculatus, cylindraceus. *Squamis cylindri* plurimis, parallelis, linearibus, æqualibus, *ſ. baſeos* paucis, breviſſimis.
Cor. *Compoſita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* plurimis, æqualibus.
Propria monopetala, ligulata, linearis, truncata, quadriquinqueve-dentata.
Stam. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.
Pist. *Germen* ſubovatum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, reflexa.
Per. nullum. *Calyx* cylindraceus, oblongus.
Sem. ſolitaria, ovata, compreſſa, ſcabra. *Stipite* longo, ſuperne attenuato. *Pappus* piloſus.
Rec. nudum.
Spec. *Juncea*, (Binſen C. Sandhabichtkraut,) fol. ſagittatis amplexicaulibus, caule ſimplici, floribus ſubſeſſilibus lateralibus. *Loc.* Glareoſis, agrorum marginibus.

307) PRENANTHES (Haſenſtrauch.) L. G. 911.

Cal. *Communis* calyculatus, cylindraceus, glaber, *ſqua-*

ſquamis cylindri numero corollularum ſ. baſeos paucis inæqualibus breviſſimis.

Cor. *Compoſita* fere ex ſimplici orbe floſculorum *corollulis hermaphroditis* 5-8. æqualibus, in orbem ſimplicem poſitis.

Propria monopetala, ligulata, truncata, quadridentata.

Stam. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Antheræ* cylindraceæ, tubuloſæ.

Pist. *Germen* ſubovatum. *Stylus* filiformis, ſtaminibus longior. *Stigma* bifidum, reflexum.

Per. nullum. Calyx cylindraceus, ore leviſſime connivens.

Sem. ſolitaria, cordata, *Pappus* piloſus. *Receptaculum* nudum.

Obs. *Datur ſpecies quæ pappum ſtipite ſuſtentat.* 4.

Spec. *Purpurea*, (Purpurfarb. H. wilder Lattich mit rothen Blumen und breiten Blättern.) floſculis quinis, foliis lanceolatis denticulatis. *Loc.* Nemoribus, montanis. *Fl.* Jul.

308) LEONTODON, (Bärenzahn,) L. G. 912.

Cal. *Communis* imbricatus, oblongus: *Squamis interioribus* linearibus, parallelis, æqualibus, *ſ. exterioribus* paucioribus, ſæpe reflexis ad baſin.

Cor. *Compoſita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* numeroſis, æqualibus.

Propria monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinquedentata.

Stam. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea tubuloſa.

Pist. *Germen* ſubovatum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigmata* duo, revoluta.

Per. nullum. *Calyx* oblongus, rectus.

Sem. ſolitaria, oblonga, ſcabra. *Pappus* ſtipitatus plumoſus.

Rec. nudum, punctatum.

Obs. Dens Leonis V. Pappo *ſimplici ſeu capillari gaudet &* calycis *ſquamis exterioribus reflexis.*

Taraxaconoides V. Pappo *plumoſo ſeu radiato, &* calycis *ſquamis omnibus erectis diſtinguitur*, 5-8.

Spec. 1) *Taraxacum*, (Pfaffen-Röhrle, blat Mönchskopf, Hundslattich-Blume, Butterblume.) calyce inferne reflexo, foliis runcinatis denticulatis lævibus lacteſcens. *Loc.* Paſcuis. *Fl.* Flav. Mart.-May. apibus. *Vis.* Aperiens, deten-

detergens, laxans, difuens diuretica. *Uſ.* Folia primo vere ad acetaria, olera: herba bob. capr. ovib. pabul. & ſuibus radices.

2) *Autumnale* (Herbſt L.) caule ramoſo, pedunculis ſquamoſis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. *Loc.* Pratis, paſcuis. *Fl.* Jul.-Sept.

309) HIERACIUM, (Habichtkraut,) Lin. G. 913.

CAL. *Communis* cylindricus, imbricatus. *Squamis* pluribus, linearibus, valde inæqualibus, longitudinalibus & incumbentibus.

COR. *Compoſita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* numeroſis, æqualibus.
Propria monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinquedentata.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Antherae* cylindracea, tubuloſa.

PIST. *Germen* ſubovatum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo recurva.

PER. nullum. *Calyx* connivens, ovatus.

SEM. ſolitaria, obtuſo tetragona, brevia, *Pappus* piloſus.

REC. nudum.

SPEC. 1) *Piloſella*, (gelbe Mausöhrlein, Nagelkr.) fol. integerrimis ovatis, ſubtus tomentoſis, caule repente, ſcapo unifloro. *Loc.* Paſcuis aridis, montoſis. *Fl.* Flav. May. *Uſ.* Capr. ovib. pabul. & apibus: coccum polonicum radix producit.

2) *Auricula*, (gelbe groſſe Mausöhrgen,) fol. integerrimis lanceolatis, ſcapo nudo multifloro ſtolonibus reptantibus. *Loc.* Pratis aridis, agris. *Fl.* May. Jun.

3) *Paludoſum*, (Sumpf H.) caule paniculato,) fol. amplexicaulibus, dentatis glabris, calycibus hi ſpidis. *Loc.* Nemoribus paludoſis. *Fl.* Jun.

4) *Umbellatum*, (Doldenförmiges H.) fol. linearibus ſubdentatis ſparſis, floribus ſubumbellatis. *Loc.* Paſcuis ſiccis, montoſis. *Uſ.* Herbæ luteo tinctorius & pecorib. pabulum.

310) CREPIS, (Grundfeſte.) Linn. G. 914.

CAL. *Communis* duplex.

Exte

Exterior breviſſimus, patulus, deciduus.
Interior ovatus, ſimplex, ſulcatus, perſiſtens; Squamis linearibus, conniventibus.
COR. *Compoſita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* plurimis æqualibus.
Propria monopetala, ligulata, linearis, truncata quinquedentata.
STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.
PIST. *Germen* ſubovatum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo. reflexa.
PER. nullum. *Calyx* ſubrotundus.
SEM. ſolitaria, oblonga. *Pappus* piloſus, ſtipitatus.
REC. nudum.
SPEC. 1) *Tectorum*, (klein Habichtkr. Dachpipau,) fol. lanceolatis runcinatis ſeſſilibus lævibus: inferioribus dentatis, caule glabro. *Loc.* Aridis, tectis, pratis. *Fl.* May. Jun. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equ. ſuibus pabulum.
2) *Biennis*, (zweyjähr. Pippau, gemeines Feldhabichtkr.) foliis runcinato pinnatifidis ſcabris, baſi ſuperne dentatis, calycibus muricatis. *Loc.* Pratis, ſepib. *Fl.* Luteus May. Jun. apib. profic.

311) HYOSERIS, (Schweinſalat,) Linn. G. 916.

CAL. *Communis* decaphyllus: *Squamis* lanceolatis, erectis, æqualib. baſi calyculatus, ſquamis breviſſimis. *Proprius* ſuperus, quinquepartitus, breviſſimus, acutus, perſiſtens, qui pappi loco.
COR. *Compoſita* imbricatiuſcula, uniformis: *corollulis hermaphroditis* per orbem unum alterumve diſpoſitis. *Propria* monop. ligulata, linearis, truncata, ſdentata.
STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.
PIST. *Germen* oblongiuſculum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, reflexa.
PER. nullum. *Calyx Comm.* rectus.
SEM. ſolitaria, oblongiuſcula compreſſa, longitudine calycis, cum *Calyculo* proprio *Pappus* capillaris rarior.
REC. nudum.
SPEC. *Fœtida*, (ſtinkendes Kranichkraut.) ſcapis ſimpliciſſimis unifloris, fol. pinnatifidis, ſeminibus nudis. *Loc.* Montoſis. *Fl.* Jun.

312) HYPOCHOERIS, (Saukraut,) Linn. G. 918.

CAL. *Communis* ſubrotundus, imbricatus, baſi ventricoſus, e *Squamis* lanceolatis, acutis.

COR. *Compoſita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* æqualibus, numeroſis.
Propria monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinquedentata.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Antherа* cylindracea, tubuloſa.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, reflexa.

PER. nullum. *Calyx* connivens, globoſo-acuminatus.

SEM. ſolitaria, oblonga, ſtipitatus pappus plumoſus.

REC. *Paleis* lanceolato-linearibus, ſeminum longitudine.

SPEC. *Radicata*, (gros gewurzeltes Ferkelkr. knollichtes S.) fol. runcinatis obtuſis ſcabris, caule ramoſo nudo lævi, pedunculis ſquamoſis. *Loc.* Paſcuis, ſilvis montanis. *Fl.* Sept. apibus utiles.

313) LAPSANA, (Rainkohl,) Linn. G. 919.

CAL. *Communis* calyculatus, ovatus, angulatus: *ſquamis tubi* octo, æqualibus, linearibus, cavo-canaliculatis, carinatis, acutis S. *baſeos* ſex, imbricatis, parvis, alternis, minimis.

COR. *Compoſita* imbricata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* circiter 16. æqualibus.
Propria monopetala, ligulata, truncata, ſdentata.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Antherа* cylindracea, tubuloſa.

PIST. *Germen* oblongiuſculum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* bifidum, reflexum.

PER. nullum. *Calycis ſquamæ tubi* ſemina proxima amplectuntur.

SEM. ſolitaria, oblonga, cylindraceo-trigona. *Pappus* varius vel multus.

REC. nudum, planum.

SPEC. *Communis*, (gemeiner R. Milchen, wilder Kohl, falſcher Salat,) calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramoſiſſimis. *Loc.* Cultis, ſilvis, ſepibus. *Fl.* Jun. *Uſ.* Pecoribus bob. ovib. equis, ſuibus pabul. & folia juniora in annonæ penuria ad olera.

314) CI-

314) CICHORIUM, (Wegwarten,) Lin. G. 921.

CAL. *Communis* calyculatus cylindraceus: *ſquamis octo* anguſto-lanceolatis, æqualibus, cylindrum conſtituentibus; 5. vero incumbentibus, brevioribus.

COR. *Compoſita* plana, uniformis: *corollulis hermaphroditis* 20. in orbem poſitis.
Propria monopetala, ligulata, truncata, profunde quinquedentata.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindraceo-pentagona, tubuloſa.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, revoluta.

PER. nullum. *Calyx* cylindraceus, apice connivens.

SEM. ſolitaria, compreſſa, angulis acutis. Pappus margo obſoletus ſub quinquedentatus.

REC. paleaceum.

SPEC. 1) *Intybus*, (wilde W. Hundsläufte, Cichorie.) floribus geminis ſeſſilibus, fol. runcinatis lacteſcens. *Loc.* Marginibus agrorum & viarum. *Fl.* Cærul. Jul. *Vis.* Aperiens, diluens, tonica, purificans. *Uſ.* Radicis recentis culinar. ad olera, acetaria, ſiccatæ loco panis, toſtæ ſuccedaneum coffee & porcis ſaginatio, herbæ, ovib. proficuæ, flavo-tinctorius uſus.

2) *Endivia*, (Endivien, Garten Wegwarten,) floribus ſolitariis pedunculatis, foliis integris crenatis. *Loc.* Cultis, hortis Eur. *Vis.* Eadem cum. Intybo. & diuretica, mitior quam Cichor. Intyb. *Uſ.* Culinaris ad olera & acetaria.

315) ARCTIUM, (Klette,) Linn. G. 923.

CAL. *Communis* globoſus, imbricatus: *ſquamis* lanceolatis, deſinentibus in *aculeos* ſubulatos, longos, apice reflexo hamatos.

COR. *Compoſita* tubulata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* æqualibus.
Propria monopetala, tubulata: *tubo* tenui, longiſſimo: *limbo* ovato, quinquefido: *laciniis* linearibus, æqualibus.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa, longitudine corollæ, quinquedentata.

PIST. *Germen* oblongum, apice villoſo. *Stylus* filiformis, ſtaminibus longior. *Stigma* bifidum, reflexum.
PER. nullum. *Calyx* connivens.
SEM. ſolitaria, verticaliter pyramidata, *angulis* duobus oppoſitis obliteratis, extrorſum gibba: *Pappus* ſimplex ſemine brevior.
REC. Paleaceum, planum, *paleis* ſetaceis.
SPEC. *Lappa*, (gemeine groſſe K. Kletwurz,) fol. cordatis inermibus, petiolatis, capitulis tomentoſis. *Loc.* Cultis ruderatis, viis. *Fl.* Jul. Aug. *Vis.* Purificans, diuretica, aperiens, pellens; ſuccedaneum radic. ſarſaparillæ. *Uſ.* Bob. capris pabul. Capitula ovibus puerisque inviſa & adhærentia: radix ſiccata pulveriſata ad diapaſma.

316) SERRATULA, (Scharte,) Linn. G. 924.

CAL. *Communis* oblongus, ſubcylindraceus, imbricatus: *ſquamis* lanceolatis, acutis, muticis.
COR. *Compoſita* tubuloſa, uniformis: *corollulæ hermaphroditæ* æquales.
Propria monopetala, infundibuliformis: *tubo* inflexo: *limbo* ventricoſo, quinquefido.
STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Antheræ* cylindracea, tubuloſa.
PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, oblonga, reflexa.
PER. nullum. *Calyx* immutatus.
SEM. ſolitaria, obovata, *Pappus* ſeſſilis.
REC. nudum vel paleaceum.
OBS. Pappus *in aliis plumoſus, in aliis piloſus eſt.*
Carduus *a* Serratula *diſtinguitur receptaculo piloſo, calyce ventricoſo, ejusque ſquamis aculeatis, ac ſtigmate minus bifido.*
SPEC. 1) *Tinctoria*, (Färber S. Diſtel, Wieſen-Berg-S.) foliis lyrato-pinnatifidis; pinna terminali maxima, floſculis conformibus. *Loc.* Silvis pratis. *Fl.* Aug. *Uſ.* Foliorum juniorum capr ovib. equis pabul. radicis luteo-tinctorius.
2) *Arvenſis*, (Haber- Sau- Acker-Diſtel.) folii dentatis ſpinoſis: Carduus radice repente, fol lanceolatis dentatis margine aculeatis. *Loc.* Agris *Fl.* Jul. *Uſ.* Pappus pro plumis uſurpatur.

317) CAR

317) CARDUUS, (Diſtel,) Linn. G. 925.

CAL. *Communis* ventricoſus, imbricatus: *ſquamis* numeroſis, lanceolatis, acuminatis, ſpinoſis.
COR. *Compoſita* tubuloſa, uniformis: *corollulæ hermaphroditæ* fere æquales, reflexæ.
Propria monopetala, infundibuliformis: *tubo* tenuiſſimo, *limbo* erecto, baſi ovato, quinquefido: *laciniis* linearibus, æqualibus, *unica* profundius ſeparata.
STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa, longitudine corollulæ, ore quinquedentata.
PIST. *Germen* ovatum, coronatum. *Stylus* filiformis, ſtaminibus longior. *Stigma* ſimplex, ſubulatum, nudum, emarginatum.
PER. nullum. *Calyx* parum connivens.
SEM. ſolitaria, obovata, tetragona, obliteratis *angulis* oppoſitis duobus: *Pappus* ſeſſilis longiſſimus.
REC. planum, piloſum.

SPEC. 1) *Nutans*, (überhängende Biſam-Diſtel.) fol. ſemidecurrentibus ſpinoſis, florib. cernuis, ſquamis calycinis ſuperne patentibus. *Loc.* Viis. *Fl.* Jul. Aug. *Uſ.* Bob. equis pabul. & apib. flor.

2) *Paluſtris*, fol. decurrentibus dentatis, margine ſpinoſis, florib. racemoſis erectis, pedunculis inermibus. *Loc.* Pratis ſubpaludoſis. *Fl.* Aug. *Uſ.* Folia teneriora ad olera; equis pabulum.

3) *Tuberoſus*, (knollige D.) fol. petiolatis ſubdecurrentib. ſubpinnatifidis ſpinoſis, caule inermi, floribus ſolitariis. *Loc.* Inundatis. *Fl.* Jun.

318) ONOPORDUM, (Eſelsfurz,) L. G. 927.

CAL. *Communis* ſubrotundus, ventricoſus, imbricatus: *ſquamis* numeroſis, ſpinoſis, undique prominentibus.
COR. *Compoſita* tubuloſa, uniformis: *corollulæ hermaphroditæ* æquales.
Propria monopetala, infundibuliformis: *tubo* tenuiſſimo: *limbo* erecto, ventricoſo, quinquefido: *laciniis* æqualibus, *unica* profundius ſeparata.
STAM. *Filamenta* 5. capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa, longitudine corollæ, 5dentata.
PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, ſtaminibus longior. *Stigma* coronatum.

PER. nullum. *Calyx* leviter connivens.
SEM. ſolitaria, *Pappus* capillaris.
REC. cellulis membranaceis, tetragonis reticulatum. inſtar favi.
SPEC. *Acanthium*, (E. mit dem Bärenklaublat, Zellblume, groſſe weiſſe Wegdiſtel.) calycibus ſquarroſis, ſpinis ſubulatis, fol. ovato-oblongis ſinuatis. *Loc.* Ruderatis, hortis. *Fl.* Alb. Jul. Aug. apib. *Uſ.* Culinar. ſuccedaneum cynaræ ſcolymi.

319) CYNARA, (Artiſchoken,) Linn. G. 928.

CAL. *Communis* ventricoſus, imbricatus: *ſquamis* numeroſis, ſubrotundis, carnoſis, auctis apice *appendiculo* ſquamiformi, patente, maiori, ſubrotundo, canalyculato, emarginato cum ſpina.
COR. *Compoſita* tubuloſa, uniformis: *corollulæ hermaphroditæ* fere æquales.
Propria monopetala, infundibuliformis: *tubo* tenuiſſimo: *limbo* erecto, ovato, quinquefido: *laciniis* linearibus, *altera* profundius ſeparata.
STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa, longitudine corollulæ, quinquedentata.
PIST. *Germen* ſubovatum. *Stylus* filiformis, ſtaminibus longior. *Stigm.* ſimplex, oblong. emarginatum.
PER. nullum. *Calyx* parum connivens.
SEM. ſolitaria, oblongo-ovata, tetragono-compreſſa. *Pappus* ſeſſilis longus.
REC. ſetoſum.
SPEC. *Scolymus*, (A. der Golddiſtel gleichend,) fol. ſubſpinoſis pinnatis indiviſisque, calycinis ſquamis ovatis, laciniis ſerratis: hortenſis aculeata, & foliis non aculeatis, (Garten A.) *Loc.* Germaniæ hortis, agris Italiæ. *Fl.* Cærul. Jul. Aug. *Uſ.* Culinar. receptaculi floris.

320) CARLINA, (Eberwurz,) Linn. G. 929.

CAL. *Communis* ventricoſus, radiatus, imbricatus: *ſquamis* numeroſis laxis, acutis, quarum *interiores* in orbem poſitæ, longiſſimæ, nitidæ, coloratæ, radiantes florem compoſitum, patentes.
COR. *Compoſita* uniformis, tubuloſa: *corollulæ hermaphroditæ* æquales.

Pro-

Propria monopetala, infundibuliformis: *tubo* tenui: *limbo* campanulato quinquefido.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.

PIST. *Germen* breve. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* oblongum, bifidum vel integrum.

PER. nullum. *Calyx* immutatus.

SEM. ſolitaria, teretiuſcula. Pappus plumoſus ramoſus.

REC. planum, *paleis* ternis fiſſis.

SPEC. 1) *Acaulis*, (ſtammloſe E.) caule unifloro flore breviore. *Loc.* Montibus apricis. *Fl.* Alb. Jul. Aug. *Vis.* Pellens, ſudorifera, tonica, graveolens, acris.

2) *Vulgaris*, (gem. E. Sodkraut,) caule multifloro corymboſo, florib. terminalibus, calycibus radio albis. *Loc.* Montoſis, aridis, ſilvis. *Fl.* Aug. Sept.

321) CARTHAMUS, (Bürſtenpflanze,) L.G. 931.

CAL. *Communis* ovatus, imbricatus: *ſquamis* numeroſis, inferne arctis, auctis apice *appendiculo* foliolaceo, ſubovato, plano, patente, obtuſo.

COR. *Compoſita* uniformis, tubuloſa: *corollulæ hermaphroditæ* æquales.

Propria monopetala, infundibuliformis: *limbo* quinquepartito, erecto, fere æquali.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylyndracea, tubuloſa.

PIST. *Germen* breviſſimum. *Stylus* filiformis, ſtaminibus longior. *Stigma* ſimplex.

PER. nullum. *Calyx* connivens.

SEM. ſolitaria.

REC. planum, *piloſum*, pilis ſemine longioribus.

SPEC. *Tinctorius*, (Saflor,) fol. ovatis integris ſerrato aculeatis. *Loc.* Eur. hortis. *Fl.* Luteus Jul. Aug. *Uſ.* Corollæ luteo & cum acido mixtæ in ſerica roſeo-tinctoriæ.

322) BIDENS, (Zweyzahn,) Linn. G. 932.

CAL. *Communis* erectus: *foliolis* ſæpe æqalibus, oblongis, canaliculato-concavis.

COR. *Compoſita* uniformis, tubuloſa: *corollulæ hermaphroditæ* tubuloſæ in diſco. Interdum *Feminæ* nudæ in ambitu.

Propria infundibuliformis: *limbo* quinquefido, erecto.
STAM. *Filamenta* quinque capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.
PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* ſimplex, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, oblonga, reflexa.
PER. nullum. *Calyx* immutatus.
SEM. Solitaria, obtuſa, angulata. Pappus ariſtis duabus pluribuſve, oblongis, rectis, acutis, retrorſum ſcabro-hamoſis.
REC. planum, *paleis* deciduis inſtructum.
OBS. *In pluribus ſpeciebus calyculus patens pentaphyllus, calyci adnatus, cingit florem compoſitum.*

SPEC. 1) *Tripartita*, (dreymal getheilter Z. Waſſer-Hanf-Doſten-Stern-Kraut, gelb Färberkraut,) foliis trifidis, calycibus ſubfolioſis, ſeminibus erectis, corona ſeminum retrorſum aculeata. *Loc.* Inundatis. *Fl.* Aug. Sept. *Uſ.* Bob. ovibus pabulum & luteo-tinctorius.

2) *Cernua*, (niedergebeugter Z.) fol. lanceolatis amplexicaulib. floribus cernuis, ſeminibus erectis. *Loc.* Ad fontes & foſſas. *Fl.* Jul. Aug.

323) EUPATORIUM, (Albkraut,) Linn. G. 935.

CAL. *Communis* oblongus, imbricatus: *ſquamis* lineari-lanceolatis, erectis, inæqualibus.
COR. *Compoſita* uniformis, tubuloſa: *corollulæ hermaphroditæ* æquales.
Propria infundibuliformis: *limbo* quinquefido, patulo.
STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.
PIST. *Germen* minimum, coronatum. *Stylus* filiformis, longiſſimus, ad ſtamina uſque bifidus, ramis rectis erectisque. *Stigmata* tenuia.
PER. nullum. *Calyx* immutatus.
SEM. oblonga, *Pappus* plumoſus longus.
REC. nudum.

SPEC. *Cannabinum*, (Waſſerdoſte, Hirſchklee, Hirſchgunſel,) foliis digitatis. *Loc.* Montoſis & ad aquas. *Fl.* Aug. apibus & capris pabulum.

SYN-

SYNGENESIA.

Ord. II. POLYGAMIA SUPERFLUA. (Mit fruchtbaren Zwittern und fruchtbaren Weibchen.)

324) TANACETUM, (Rheinfarn,) Linn. G. 944.

Cal. *Communis* hemiſphæricus, imbricatus: *ſquamis* acutis, compactis.

Cor. *Compoſita* tubuloſa, convexa: *corollulæ hermaphroditæ* numeroſæ, tubuloſæ in diſco: femineæ nonnullæ in radio.

Propria hermaphroditi infundibuliformis: *limbo* quinquefido, reflexo, feminea trifida introrſum profundius diviſa.

Stam. hermaphroditis *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.

Pist. hermaphr. *Germen* oblongum, parvum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* bifidum, revolutum. Femineis *Germen* oblongum, *Stylus* ſimplex. *Stigmata* duo reflexa.

Per. nullum. *Calyx* immutatus.

Sem. ſolitaria, oblonga, nuda.

Rec. convexum nudum.

Spec. *Vulgare*, (gemeiner R.) foliis bipinnatis inciſis ſerratis: *criſpum* foliis criſpis. *Loc.* Montoſis, paſcuis, aggeribus. *Fl.* Luteus odorat. Jul. *Vis* Carminativa, pellens, ſudorifera, antiverminoſa, balſamica, tonica; amara. *Uſ.* Foliorum viridi- & corollar. luteo-tinctorius. bob. ovib. pabul. folia & ſemen ad cimices, pulices: demortuorum cadavera a putredine diutius conſervant Lappones.

325) ARTEMISIA, (Beyfus,) Linn. G. 945.

Cal. *Communis* ſubrotundus, imbricatus: *ſquamis* rotundatis, conniventibus.

Cor. compoſita: *corollulæ hermaphroditæ* tubuloſæ. plures, in diſco. *Femininæ* petalis ferme nudæ, in ambitu. *Propria Hermaphroditi* infundibuliformis: *Limbo* quinquefido.

Stam. Hermaphroditis *Filamenta* 5. capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa, 5dentata.

Pist. Hermaphroditis *Germen* parvum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* bifidum, revolutum.

Femineis *Germen* minimum. *Styius* filiformis, hermaphroditis longior. *Stigma* hermaphroditis ſimile.

Per. nullum. *Calyx* vix mutatus.

Sem. *Hermaphroditis* ſolitaria, nuda.

Femineis ſolitaria, nuda.

Rec. planum, nudum, aut villoſum.

Ord. Abſinthium T. *Receptaculo villoſo gaudet, & calyce magis globoſo.* 1. 3. 7. 8. 9. 10. 11. 21.

Abrotanum T. *Receptaculo eſt nudo.* 2.

Artemiſia T. *Receptaculo etiam eſt nudo.* 4. 5. 6. 13. 16, 17. 19.

Spec. 1) *Abſinthium*, (gemeiner Wermuth,) foliis compoſitis multifidis, florib. ſubgloboſis pendulis; receptaculo villoſo. *Loc.* Ruderatis aridis & cultis. *Fl.* Jul. Aug. *Vis.* Balſamica, antiverminoſa, ſtomachica, pellens, amara, graveolens herba. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis pabul. & ad pulices, cereviſiæ acidæ vel vino infuſa aceſcentiam tollit.

2) *Vulgaris*, (gemeiner B. Buck,) foliis pinnatifidis planis inciſis: ſubtus tomentoſis, racemis ſimplicibus, florib. ovatis, radio quinquefloro. *Loc.* Cultis, ruderatis, viis. *Fl.* Jul.-Sept. *Vis.* Roborans, uterina, pellens. *Uſ.* Bobus, capris equis pabulum.

326) GNAPHALIUM, (Ruhrpflanze,) Lin. G. 946.

Cal. *Communis* rotundatus, imbricatus: *ſquamis* ovatis, conniventibus, ſuperne laxioribus.

Cor. compoſita: *corollulæ hermaphroditæ* tubuloſæ, interdum femineis apetalis mixtæ.

Propria Hermaphroditis infundibuliformis: *Limbo* quinquefido, reflexo.

Femineis (ſi quæ) corolla nulla.

Stam. Hermaphroditis *Filamenta* 5. capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.

Pist. Hermaphroditis *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* bifidum.

Femineis *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine hermaphroditi. *Stigma* bifidum, reflexum.

Per.

PER. nullum. *Calyx* perſiſtens, nitidus.
SEM. *Hermaphroditis* ſolitaria, oblonga, parva, coronata *Pappo*. *Femineis* ſimilia hermaphroditis.
REC. nudum.
OBS. *in aliis Corona ſeminis Pappus eſt capillaris, in aliis plumoſus.*

SPEC. 1) *Arenarium*, (Sand R. gelbe Rhein-Fluſs-Motten-Blume.) herbaceum, foliis lanceolatis, inferioribus obtuſis, caule ſimpliciſſimo, corymbo compoſito. Stœchas citrina. *Loc.* Arenoſis. *Vis.* Exſiccans.

2) *Dioicum*, (getrennte R. weis und rothe Mausöhrlein, Kazenpfötgen, Berg-R.) ſarmentis procumbentibus caule ſimpliciſſimo, corymbo ſimplici terminali, floribus dioicis. *Loc.* Aridis, apricis, montoſis. Piloſella minor. *Fl.* May. *Vis.* Adſtringens, roborans. *Uſ.* Ovib. equis ſuibus pabulum.

3) *Silvaticum*, (Wald R. gros Ruhrkraut,) caule ſimpliciſſimo, floribus ſparſis. G. maius, anguſto oblongo folio. *Loc.* Silvis arenoſis, montanis. *Fl.* Aug. Sept.

327) CONYZA, (Flöpflanze,) Linn. G. 950.

CAL. *Communis* imbricatus, oblongus, ſquarroſus: *ſquamis* acutis exterioribus patentiuſculis.
COR. *Compoſita* tubuloſa: *corollulæ hermaphroditæ* numeroſæ, tubuloſæ, in diſco. *Femineæ* apetalæ ſubrotundæ in ambitu.
Propria Hermaphroditi infundibuliformis: *Limbo* quinquefido, patulo.
Femineis infundibuliformis, limbo trifido.
STAM. Hermaphroditis *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.
PIST. Hermaphroditis *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* bifidum.
Femineis *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine hermaphroditi, tenuior. *Stigmata* duo, tenuiſſima.
PER. nullum. *Calyx* connivens.
SEM. *Hermaphroditis* ſolitaria, oblonga, coronata *Pappo* ſimplici. *Femineis* ſolitaria, oblonga, coronata *Pappo* ſimplici.
REC. nudum, planum.

SPEC.

Spec. *Squarrosa*, (F. Dürwurz, Ruhrkraut, gelbe Münze,) foliis lanceolatis acutis, caule annuo corymboso. *Loc.* Montanis siccis. *Fl.* Jul. Aug. *Us.* Culices & pulices pellit.

328) ERIGERON, Altmanskraut,) Linn. G. 951.

Cal. *Communis* oblongus, cylindraceus, imbricatus: *squamis* subulatis, erectis, gradatim longioribus, subæqualibus.

Cor. *Composita* radiata: *corollulæ hermaphroditæ* tubulosæ, in disco. *Femininæ* ligulatæ, in radio.

Propria Hermaphroditi infundibuliformis: *Limbo* quinquefido. *Femineæ* ligulata, linearis subulata, erecta, sæpius integerrima.

Stam. Hermaphroditis *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubulosa.

Pist. Hermaphroditi *Germen* minimum, coronatum pappo corollula sua longiori. *Stylus* filiformis, longitudine pappi. *Stigmata* duo, oblonga, revoluta.

Femineis *Germen* minimum, pappo corollæ suæ longitudine fere æquali. *Stylus* capillaris, longitudine pappi. *Stigmata* duo, tenuiſſima.

Per. nullum. *Calyx* connivens.

Sem. *Hermaphroditis* oblonga, parva: *Pappus* longus. *Femineis* simillima hermaphroditis.

Rec. nudum, planum.

Obs. *Flosculos disci intimos, seu intermedios, sæpius masculos esse observat Dillenius.*

Species datur flosculis femineis nudis.

Spec. *Acre*, (scharfes A. blaue Dürrwurz Beruf-Beschrey-Kraut,) pedunculis alternis unifloris. *Loc.* Apricis, siccis. *Fl.* Cærul. Jul.-Sept. *Vis.* Siccans, discutiens.

329) TUSSILAGO, (Huflattig,) Linn. G. 952.

Cal. *Communis* cylindraceus: *squamis* lanceolato-linearibus 15. *s.* 20. æqualibus.

Cor. *Composita* varia. *Corollulæ* in aliis *Hermaphroditæ*, tubulosæ omnes, vel tantum in disco. *Femineæ* aliis nullæ, aliis ligulatæ.

Propria Hermaphroditi infundibuliformis: *Limbo* 5. fido (vel quadrifido), acuto, reflexo, calyce longiore.

Femineæ nulla aut ligulata, anguſtiſſima, calyce longior, integra.

Stam.

STAM. Hermaphroditis *Filamenta* 5. capillaria, breviſſima. *Antherae* cylindracea, tubuloſa.
PIST. Hermaphroditis *Germen* breve, coronatum. *Stylus* filiformis, ſtamine longior. *Stigma* craſſiuſculum.
Femineis *Germ.* breve. *Stylus* filiformis, longitudine hermaphroditi *Stigma* biſidum, craſſiuſculum.
PER. nullum. *Calyx* vix mutatus.
SEM. *Hermaphroditis* ſolitaria, oblonga, compreſſa, *Pappus* piloſus. Stipitatus.
Femineis, ſi quæ, ſimillima hermaphroditis.
REC. nudum.
OBS. Petaſites *T. caret floſculis in radio ligulatis, licet quibuſdam feminei nudi adſint.* 9. 8.
Tuſſilago *T. inſtruitur ſemper femineis in radio, corolla ligulata præditis.* 5.
SPEC. 1) *Farfara*, (gemeine H. Brandlattich, Roshuf,) ſcapo imbricato unifloro, foliis ſubcordatis angulatis denticulatis. *Loc.* Argilloſis, ſubtus humidis. *Fl.* Flav. Jan.-Mart. apibus pabul. *Vis. Radicis* & *foliorum* vulneraria, adſtringens, *florum* leniens, diſcutiens, expectorans.
2) *Petaſites*, (Peſtilenz- Schweis - Wurz, groſſer Huflattich,) thyrſo ovato, floſculis omnibus, hermaphroditis. *Loc.* Pratis, fluviis. *Fl.* Mart. apibus. *Vis.* Radicis diaphoretica, diſcutiens.

330) SENECIO, (Creuzpflanze,) Linn. G. 953.

CAL. *Communis* calyculatus, conicus, truncatus: *ſquamis* ſubulatis, plurimis, in cylindrum ſuperne contractum parallelis, contiguis, æqualibus, pauciioribus baſin imbricatim tegentibus, apicibus emortuis.
COR. *Compoſita* calyce altior: *corollulæ hermaphroditæ* tubuloſæ, numeroſæ, in diſco. *Femineæ* ligulatæ, in radio, ſi quæ adſint.
Propria Hermaphroditi infundibuliformis: *Limbo* reflexo quinquefido.
Femineis (ſi quæ) oblonga, obſolete tridentata.
STAM. Hermaphroditis *Filamenta* quinque, capillaria, minima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.
PIST. Utriſque *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, oblonga, revoluta.
PER. nullum. *Calyx* conico-connivens.
SEM. hermaphroditis ſolitaria, ovata, *Pappus* crinitus, longus; *Femineis* ſimillima hemaphroditis.

REC.

Rec. nudum, planum.
Obs. Senecio *T. caret Radio communi corollæ* 1-7.
Jacobæa *T. inſtruitur Radio communi corollæ.* 8-40.
Spec. 1) *Vulgaris*, (gemeine C. Creuz-Wurz, Goldkraut,) corollis nudis, foliis pinnato ſinuatis amplexicaulibus, floribus ſparſis. *Loc.* Cultis, ſucculentis ruderatis. *Fl.* Flav. Febr.-May. *Uſ.* Bobus, capr. ſuibus pabulum & avibus.
2) *Jacobæa*, (Jacobs Blumkraut,) corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis, laciniis lacinulatis, caule erecto. *Loc.* Paſcuis humentibus, viis. *Fl.* Luteus Jul.-Sept. *Uſ.* Viridi-tinctorius.
3) *Saracenicus*, (Saraceniſche C.) corollis radiantibus, floribus corymboſis, foliis lanceolatis ſerratis glabriuſculis. *Loc.* Montanis, nemoroſis. *Fl.* Jul. Aug.

331) ASTER, (Sternblume,) Linn. G. 954.

Cal. *Communis* ſquamoſo-imbricatus: *ſquamis* anterioribus apice prominulis.
Cor. *Compoſita* radiata: *corollulæ hermaphroditæ* numeroſæ, in diſco. *Femineæ* ligulatæ, decem plures, in radio.
Propria Hermaphroditi infundibuliformis: *Limbo* quinquefido, patulo.
Femineæ ligulata, lanceolata, tridentata.
Stam. Hermaphroditis *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.
Pist. Hermaphroditis *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* bifidum, patens.
Femineis *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine hermaphroditi. *Stigmata* duo, oblonga, revoluta.
Per. nullum. *Calyx* vix mutatus.
Sem. *Hermaphroditis* ſolitaria, oblonga, ovata, *Pappus* piloſus.
Feminis ſimilia hermaphroditis.
Rec. planiuſculum, nudum.
Spec. 1) *Alpinus*, (Alpen St.) foliis lanceolatis hirtis, radicalibus obtuſis, caule ſimpliciſſimo unifloro. *Loc.* Alpibus, Auſtria, hortis. *Fl.* Cæruleus Jun.
2) *Amellus*, (wildes blaues Stern- Kraut-Wurz,) foliis

foliis lanceolatis obtusis scabris trinervis, pedunculis nudiusculis corymbosis, squamis calycinis obtusis. *Loc.* Montosis, collibus: Atticus vulgar. *Fl.* Aug. Sept. disci lutei, radii cærulei.

3) *Dumosus*, (buschige St.) foliis linearibus integerrimis, caule paniculato, floribus terminalibus. *Loc.* Europæ hortis. *Fl.* Sept. in radio albi & in disco lutei.

4) *Annuus*, (jährige St.) foliis ovatis, inferioribus crenatis, caule corymboso, pedunculis nudis, calycibus hemisphæricis. *Loc.* Canada & Eur. hortis. *Fl.* Alb. Aug. apibus pabulum.

5) *Mutabilis*, (veränderliche St.) fol. lanceolatis serratis, calycibus squarrosis, panicula subfastigiata. *Loc.* America, & Eur. hortis. *Fl.* Aug. cærulei, in disco primum flavi dein purpurei.

6) *Chinensis*, (sinesische St.) foliis ovatis angulatis dentatis petiolatis, calycibus terminalibus patentibus folliosis. *Loc.* China, & hortis Eur. *Fl.* Aug. simplices & compositi albi, vel rubri, l. cærulei.

332) SOLIDAGO, (Goldruthe,) Linn. G. 955.

CAL. *Communis* oblongus, imbricatus: *squamis* oblongis, angustis, acuminatis, rectis, conniventibus.

COR. *Composita* radiata: *corollulæ hermaphroditæ* tubulosæ, plurimæ in disco.

Femineæ ligulatæ, 10. pauciores (sæpius 5.), in radio.

Propria Hermaphroditi infundibuliformis: *Limbo* quinquefido, patulo.

Femineæ ligulata, lanceolata, tridentata.

STAM. Hermaphroditis *Filamenta* 5. capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulosa.

PIST. Hermaphroditis *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* bifidum, patens.

Femineis *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine hermaphroditi. *Stigmata* duo, revoluta.

PER. nullum. *Calyx* vix mutatus.

SEM. *Hermaphroditis* solitaria, obovato-oblonga, *Pappus* capillaris.

Femineis simillima hermaphroditis.

REC. planiusculum, nudum.

SPEC. *Virga-aurea*, (gemeine Goldruthe, heidnisch

niſch oder Gulden Wundkraut,) caule ſubflexuoſo angulato, racemis alternis paniculatis erectis confertis. *Loc.* Paſcuis ſiccis, ſilvis. *Fl.* Aug. *Vis.* Adſtringens, vulneraria.

333) INULA, (Alant,) Linn. G. 956.

CAL. *Communis* imbricatus, foliolis laxis, patulis; exterioribus majoribus, æqualis longitudinis.

COR. *Compoſita*, radiata, lata. *Coroſiulæ hermaphroditæ* æquales, numeroſiſſimæ in diſco. *Femineæ* ligulatæ, numeroſæ, confertæ, in radio.

Propria Hermaphroditi infundibuliformis: limbo quinquefido, erectiuſculo.

Feminea ligulata, linearis, integerrima.

STAM. Hermaphroditis *Filamenta* 5. filiformia, brevia. *Anthera* cylindrica, compoſita ex minoribus 5. linearibus, coalitis: ſingulis inferne deſinentibus in ſetas duas, rectas, longitudine filamentorum.

PIST. Hermaphroditis *Germen* longum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum.

Stigma bifidum, erectiuſculum.

Femineis *Germen* longum. *Stylus* filiformis, ſemibifidus. *Stigmata* erecta.

PER. nullum. *Calyx* immutatus.

SEM. Hermaphroditis ſolitaria, linearia, quadrangula, *Pappus* ſimplex, longitudine ſeminis Femineis ſimilia Hermaphroditis.

REC. planum, nudum.

OBS. *Ergo antheris inferne in ſetas decem deſinentibus non modo ab Aſtere, ſed & ab omnibus adhuc notis cognitis differt.*

SPEC. 1) *Helenium*, (Alant) foliis amplexicaulibus ovatis rugoſis: ſubtus tomentoſis, calycum ſquamis ovatis patulis. *Loc.* Cultis, Anglia. *Fl.* Jul. Aug. apibus. *Vis.* Pellens, expectorans, ſtomachica, antiverminoſa. *Uſ.* Capr. equis pabulum.

2) *Dyſenterica*, (Ruhr A. Ruhrkraut, welſcher Wolverley, Waſſerfallkraut, gelbe Dürwurz,) foliis amplexicaulibus cordato-oblongis ſubtomentoſis, caule villoſo paniculato, ſquamis calycinis ſetaceis. *Loc.* Foſſis ſubhumidis. *Fl.* Luteus Jul. Aug.

3) *Sa-*

3) *Salicina*, (A. mit den Weidenblättern, gelbes-glattes- Bergſtern - Kraut,) fol. ſeſſilib. lanceolatis recurvis ſerrato - ſcabris, florib. inferiorib. altioribus, ramis ſubangulatis glabris. *Loc.* Montoſis, pratis uliginoſis, aſperis. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis, vaccis pabul. & apibus.

334) ARNICA, (Wolverley Arnic.,) Linn. G. 958.

CAL. *Communis imbricatus* radio corollæ brevior, foliolis lanceolatis longitudine calycis erectis.

COR. *Compoſita* radiata: *corollulæ hermaphroditæ* numeroſæ in diſco. *Femineæ* circiter 20. in radio. *Propria Hermaphroditi* tubuloſa erecta 5fida æqualis, *Femineæ*, lanceolata, tridentata, longiſſima, patens.

STAM. Hermaphroditis *Filamenta* quinque, breviſſima, *Antheræ* cylindrica. Femineis filamenta 5. ſubulata erecta. *Antheræ* nullæ.

PIST. Hermaphroditis *Germen* oblongum. *Stylus* ſimplex, longitudine ſtaminum. *Stigma* bifidum. *Femineis* ſimillimum hermaphroditis.

PER. nullum. *Calyx* immutatus.

SEM. *Hermaphroditis* ſolitaria oblonga. *Pappus* piloſus pubeſcens, longus.
Femineis ſimillima hermaphroditis. *Pappus* nullus.

REC. nudum.

OBS. corollulæ diſci ſæpe trifidæ, lacinia exteriore duplo latiore.

SPEC. *Montana*, (Berg W. Falkraut, Mutter- Engels-Kraut.) fol. ovatis integris: caulinis geminis oppoſitis. *Loc.* Alpibus, pratis, ſilvis. *Fl.* Jun. Aug. *Vis.* Repellens, vulneraria, emetica, purgans, reſolvens, pellens; acris.

335) DORONICUM, (Gemswurz,) Linn. G. 959.

CAL. *Communis* foliolis lanceolato - ſubulatis 20. circiter. Æqualibus, erectis, duplicis ſeriei: longitudine ſæpius radii corollæ.

COR compoſita radiata, corollulæ hermaphroditæ tubuloſæ, numeroſæ in diſco. *Femineæ* ligulatæ numemero foliorum calycis in radio, propria hermaphroditi infundibuliformis: limbo 5fido, patulo. Feminea ligulata lanceolata, tridentata.

STAM. Hermaphroditis filamenta 5. capillaria, breviſſima, *Anthera* cylindracea tubuloſa.

PIST. Hermaphroditis germen oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* emarginatum. Femineis: *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis longitudine hermaphroditi. *Stigmata* 2. reflexa.
PER. nullum. *Calyx* leviter connivens.
SEM. ſolitaria hermaphr. obovata, compreſſa, ſulcata. *Pappus* piloſus: femineis ſolitaria obovata, ſulcata, parum compreſſa: *Pappus* piloſus.
REC. nudum, planum.
SPEC. *Plantagineum*, (G. mit dem Wegerichblat,) foliis ovatis acutis ſubdentatis, ramis alternis. *Loc.* Montoſis. *Fl.* Jul. *Uſ.* Smolandiæ ruſtici folia in defectu tabaci fumant.

336) BELLIS, (Maslieben,) Linn. G. 962.

CAL. *Communis* ſimplex, erectus, *foliolis* 10. ad 20. duplici ſerie poſitis, lanceolatis, æqualibus.
COR. *Compoſita* radiata: *corollulæ hermaphroditæ* tubuloſæ, numeroſæ, in diſco.
Femininæ ligulatæ, calycis foliis plures, in radio.
Propria Hermaphroditi infundibuliformis: quinquefida.
Femineæ ligulata, lanceolata, vix tridentata.
STAM. Hermaphroditis *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.
PIST. Hermaphroditis *Germen* ovatum. *Stylus* ſimplex. *Stigma* emarginatum.
Femineæ *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis. *Stigmata* duo, patula.
PER. nullum. *Calyx* immutatus.
SEM. *Hermaphroditis* ſolitaria obovata, compreſſa. *Pappus* nullus.
Femineis ſimilia hermaphroditis.
REC. nudum, conicum.
SPEC. *Perennis*, (Maslieben, Gänsblümle, Angerblume,) ſcapo nudo, unifloro; *hortenſis* flore pleno albo bullato, & rubro multiplici fiſtuloſo. *Loc.* Cultis apricis paſcuis. *Fl.* Jan.-Dec. *Vis.* Adſtringens, vulneraria, reſolvens. *Uſ.* Foliorum in annonæ caritate ad olera.

337) TAGETES, (Samtblume,) Linn. G. 964.

CAL. *Communis* ſimpliciſſimus, monophyllus, tubuloſus, oblongus, pentagonus, quinquedentatus.

COR.

Cor. *Compoſita* radiata: *corollulæ hermaphroditæ* tubuloſæ, plures, in diſco elevato.
Femineæ ligulatæ, quinque, in radio.
Propria Hermaphroditis tubuloſa, ſemiquinquefida, erecta, calyce longior: laciniis linearibus, introrſum villoſis.
Femineis ligulata, hermaphroditis longior, longitudine & latitudine fere æqualis, obtuſiſſima, verſus tubum anguſtior, tomentoſa perſiſtens.
Stam. Hermaphroditis *Filamenta* 5. capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.
Pist. Hermaphroditis *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* bifidum, tenue, reflexum.
Femineis *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine hermaphroditi. *Stigma* bifidum, tenue, reflexum.
Per. nullum. *Calyx* immutatus.
Sem. *Hermaphroditis* ſolitaria, linearia, compreſſa, calyce paulo breviora. *Pappus* ariſtis 5. erectis acuminatis inæqualibus. Femineis ſimilia hermaphroditis.
Rec. nudum, parvum, planum.
Spec. 1) *Patula*, (auseinander gebreitete S.) caule ſubdiviſo patulo: flos *Africanus minor*, multiplicato flore. *Loc.* Eur. hortis. *Fl.* Fulvo-maculatus Jul.-Sept.
2) *Erecta*, (aufrechte S.) caule ſimplici erecto, pedunculis nudis unifloris: *maius* ſimplici flore; maximus rectus, flore multiplicato maximo. *Loc.* Mexico & hortis Eur. *Fl.* Flav. Jul.-Sept.

338) CHRYSANTHEMUM, (Wucherblume,) Linn. G. 966.

Cal. *Communis* hemiſphæricus, imbricatus: *ſquamis* arcte incumbentibus, *interioribus* per gradus majoribus, *intimis* terminatis ſquama ſcarioſa.
Cor. *Compoſita* radiata: *corollulæ hermaphroditæ* tubuloſæ, nnmeroſæ, in diſco. *Femininæ* duodecim plures, in radio.
Propria Hermaphroditis infundibuliformis, quinquefida, patula, longitudine calycis.
Femineis ligulata, oblonga, tridentata.
Stam. Hermaphroditis *Filamenta* quinque, capillaria,

breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa, corolla fere brevior.

PIST. Hermaphroditis *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, ſtaminibus longior. *Stigmata* duo, revoluta.

Femineis *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, cum hermaphroditis æqualis. *Stigmata* duo, obtuſa, revoluta.

PER. nullum. *Calyx* immutatus.

SEM. *Hermaphroditis* ſolitaria, oblonga. *Pappus* nullus. *Femineis* ſimillima hermaphroditis.

REC. nudum, punctatum, convexum.

OBS. Leucanthemi *T. corollulæ femininæ lanceolata, & membranæ calycinæ auguſtæ.*

Chryſanthemi *T. Corollulæ femininæ ovato-truncatæ, & membranæ calycinæ ovatæ.*

1) *Leucanthemum*, (groſſe Gänſeblumen, Masliebchen, Johannisblume, Kalb-Rinds-Auge,) foliis amplexicaulib. oblongis, ſuperne ſerratis, inferne dentatis. *Loc.* Pratis. *Fl.* Albus May. Jun. *Uſ.* Capris, ovib. equis, vaccis pabul. & apibus.

2) *Montanum*, (Berg W.) foliis imis ſpathulato-lanceolatis ſerratis, ſummis linearibus. *Loc.* Montoſis, collibus. *Fl.* Jun.

339) MATRICARIA, (Mutterkraut,) L. G. 967.

CAL. *Communis* hemiſphæricus, conſtans *ſquamis* linearibus imbricatis, fere æqualibus.

COR. *Compoſita* radiata: *corollulæ hermaphroditæ* tubuloſæ, numeroſæ, in diſco hemiſphærico. *Femineæ*, in radio plures.

Propria hermaphroditi infundibuliformis quinquefida, patens. *Feminea* oblonga, tridentata.

STAM. Hermaphroditis *Filamenta* 5. capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.

PIST. Hermaphroditis *Germen* oblongum, nudum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* bifidum, patens.

Femineis *Germen* nudum. *Stylus* filiformis, longitudine fere hermaphroditi. *Stigmata* duo revoluta.

PER. nullum. *Calyx* immutatus.

SEM. *Hermaphroditis* ſolitaria, oblonga, pappus nullus. *Femineis* ſimillima hermaphroditis.

REC. convexum, nudum.

SPEC

Spec. 1) *Parthenium*, (gemein Muterkraut, Metter.) fol. compoſitis planis, foliolis ovatis inciſis, pedunculis ramoſis. *Loc.* Cultis, ruderatis. *Fl.* Jul. *Vis.* Anodyna, emenagoga, cum chamomilla eadem, ſed debilior.

2) *Chamomilla*, (Chamillen) receptaculis conicis, radiis patentibus, feminibus nudis, ſquamis calycinis margine æqualibus, foliis ſupradecompoſitis ſetaceis, pedunculis ſolitariis. *Loc.* Cultis, agris. *Fl.* Jul. *Vis.* Emolliens, anodyna, carminativa, autiſpasmodica. *Uſ.* Bob. capr. ovib. pabulum.

34) ANTHEMIS, (Chamille,) Linn. G. 970.

Cal. *Communis* hemiſphæricus: *ſquamis* linearibus, fere æqualibus.

Cor. *Compoſita* radiata: *corollulæ hermaphroditæ* tubuloſæ, numeroſæ, in diſco convexo. *Femininæ* plures, in radio.

Propria Hermaphroditi infundibuliformis: quinquedenta, erecta.

Feminea ligulata, lanceolata, interdum tridentata.

Stam. Hermaphroditis *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima, *Anthera* cylindracea, tubuloſa.

Pist. Hermaphroditis *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, reflexa. Femineis *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine hermaphroditi. *Stigmata* duo, revoluta.

Per. nullum. *Calyx* immutatus.

Sem. *Hermaphroditis* ſolitaria, oblonga, Pappus nullus. *Femineis* ſimillima hermaphroditis.

Rec. conicum, *paleaceum.*

Spec 1) *Nobilis*, (gemeine ächte edle Feld-Chamillen, Hermel.) foliis pinnato-compoſitis linearibus, acutis, ſubvilloſis, laciniis ſetaceis: Chamæmelum nobile romanum odoratum flore multiplici (mit halbgefüllter Blume,) *Loc.* Paſcuis apricis, Viis. *Fl.* Albus ſuaveolens May. Jun. *Vis.* Balſamica, antiſpasmodica, &c. eadem cum Matricar. Chamom.

2) *Arvenſis*, (wilde falſche geruchloſe Acker C. Ochsauge,) receptaculis conicis, paleis ſetaceis, feminibus coronato-marginatis. *Loc.* Agris, viis. *Fl.* Jun.-Aug. *Uſ.* Bob. ovib. equis pabul.

3) *Cotula*, (ſtinkende Hunds-C. Krötendill.) receptac. conicis, paleis ſetac. ſeminibus nudis. *Loc.* Ruderatis, agris. *Fl.* foetidus Jun. Jul. *Obſ.* Bufones adlicit.

4) *Tinctoria*, (Färber C. Gill- Streich-Blume,) foliis bipinnatis ſerratis, ſubtus tomentoſis, caule corimboſo ramoſo, laciniis linearibus dentatis ſerratis, floribus pedunculatis. *Loc.* Apricis pratis ſiccis, ſilvis. *Fl.* Jun. Jul. citrino-tinctorii.

341) ACHILLEA, (Achillenkraut:) Lin. G. 971.

CAL. *Communis* oblongo-ovatus, imbricatus: *ſquamis* ovatis-acutis, conniventibus.

COR. *Compoſita* radiata: *corollulæ hermaphroditæ* tubuloſæ, 5. 16. in diſco.

Femininæ ligulatæ, 5. ad 10. in radio.

Propria Hermaphroditi infundibuliformis: quinquefida, patula.

Feminæ ligulata, ob-cordata, patens, trifida: *lacinula intermedia* minore.

STAM. Hermaphroditis *Filamenta* 5. capillaria, breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.

PIST. Hermaphroditis *Germen* parvum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* obtuſum, emarginatum.

Femineis *Germen* parvum. *Stylus* filiformis, longitudine hermaphroditi. *Stigmata* duo, obtuſa, reflexa.

PER. nullum. *Calyx* vix mutatus, receptaculum filiforme elongatum, ut diſcus ſeminum, ovatus, calyce duplo longior.

SEM. *Hermaphroditis* ſolitaria, ovata, *flocco* inſtructa, pappus, nullus. *Feminis* ſimilia hermaphroditis.

REC. *Paleis* lanceolatis, longitudine floſculorum, tectum.

SPEC. 1) *Ptarmica*, (gemeines Nieskraut, wilder teutſcher Wieſen-Bertram, Dorant, Berufkraut, weiſſer ſpiziger Rheinfarn,) foliis lanceolatis acuminatis, argute ſerratis: Dracunculus pratenſis. *Loc.* Paludoſis. *Fl.* Jun. Jul. *Vis.* Errhina, vulneraria. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis, ſuibus, vaccis pabulum.

2) *Millefolium*, (gemeine Schafgarben, Schafribben, Tauſendblat.) fol. bipinnatis nudis, laciniis linearibus dentatis, caulibus ſulcatis, vulgare album: tanaceti folio, flore purpureo; *Loc.* agris

agris pratis, viis. *Fl.* Jul - Sept. *Vis.* Tonica, vulneraria, narcotica; amara. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis, ſuib. pabul. muſcos arcet in pratis.

SYNGENESIA.

Ord. III. POLYGAMIA FRUSTRANEA, (Mit fruchtbaren Zwittern und unfruchtbaren Weibchen.)

342) HELIANTHUS, (Sonnenblume,) L. G. 979.

CAL. *Communis* imbricatus, expanſus: *ſquamis* oblongis, acuminatis, baſi latiuſculis, dehiſcentibus undique apicibus.

COR. *Compoſita* radiata: *corollulæ hermaphroditæ* numeroſiſſimæ, in diſco. *Femineæ* pauciores, multo longiores, in radio.

Propria Hermaphroditis cylindracea, calyce communi brevior, *baſi* ventricoſa, orbiculata, depreſſa: limbo quinquedentata, acuta, patens.

Femineis ligulata, lanceolata, integerrima, longiſſima.

STAM. Hermaphroditis *Filamenta* 5. curva infra ventriculum corollulæ inſerta, longitudine tubi. *Anthera* cylindracea, tubuloſa.

PIST. Hermaphroditis *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine corollulæ. *Stigma* bipartitum, reflexum.

Femineis *Germen* minimum. *Stylus* nullus. *Stigma* nullum.

PER. nullum. *Calyx* immutatus.

SEM. *Hermaphroditis* ſolitaria, oblonga, obtuſa, tetragona, angulis oppoſitis compreſſa, interna anguſtiora, Pappus ariſtis duabus lanceolatis deciduis.

Femineis nulla.

REC. magnum, planum, *paleis* lanceolatis acutis, duabus ſingulum ſemen diſtinguentibus, deciduis.

SPEC. 1) *Annuus*, (jährige S. Sonnenkrone.) foliis omnibus cordatis trinervatis, floribus cernuis, radix annua. *Loc.* Cultis, hortis. *Fl.* Flavus Jul. - Sept. apibus proficui. *Uſ.* Folia - pecoribus pabulum, & avibus, gallinis ſemina, e quibus oleum ad lampades, eſculentumque uti & pla-

centæ oleoſæ ad ſaginationem conficiuntur. Capitula nondum aperta ſunt eſculenta loco Cynaræ.

2) *Multiflorus*, (vielblumige S.) fol. inferioribus cordatis trinervatis, ſuperioribus ovatis, radice tereti inflexa perenni. *Loc.* Cultis, hortis. *Fl.* Jul.-Sept,

3) *Tuberoſus*, (Erdäpfel, Jeruſalems-Artiſchocken, Taupinambour.) fol. ovato-cordatis triplinerviis: radice tuberoſa. *Loc.* Braſilia, & hortis Europæ. *Fl.* Flav. *Uſ.* Radix dulcis, eſculenta, ſuccedaneum cynaræ: folia ſuibus ſaginatio.

343) COREOPSIS. (Wanzengeſicht) L. G. 981.

CAL. *Communis* vel ſimplex ſubimbricatus vel duplicatus, *exterior* foliolis ſæpius octo, rudibus, in orbem poſitis: *interior* totidem majoribus, membranaceis & coloratis.

COR. *Compoſita* radiata: *corollulæ hermaphroditæ*, numeroſæ, in diſco. *Femininæ* octo, in radio. *Propria Hermaphroditi* tubuloſa, quinquedentata. *Femineæ* ligulata, quadridentata, patens, magna.

STAM. Hermaphroditis *Filamenta* ς. capillaria, breviſſima. *Antheræ* cylindracea, tubuloſa.

PIST. Hermaphroditis *Germen* compreſſum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* bifidum, acutum, tenue. Femineis *Germen* conſimile hermaphroditis. *Stylus* nullus. *Stigma* nullum.

PER. nullum. *Calyx* vix mutatus.

SEM. *Hermaphroditis* ſolitaria, orbiculata, hinc convexa, inde cava, cum protuberantia tranſuerſali ad apicem ſcilicet & baſin, cincta margine membranaceo, apice bicorni. *Femineis* nulla.

REC. paleaceum.

SPEC. *Bidens*, (zweyzähniges W.) fol. lanceolatis ſerratis oppoſitis amplexicaulibus. *Loc.* Humidis, foſſis. *Fl.* Aug.-Sept.

344) CENTAUREA, (Flockenblume,) L. G. 984.

CAL. *Communis* imbricatus, ſubrotundus: *ſquamis* ſæpius varie terminatis.

COR. *Compoſita* floſculoſa difformis: *corollulæ hermaphroditæ* plurimæ, in diſco. *Femineæ* pauciores, majores, laxæ, in radio.

Pro

Propria Hermaphroditi monopetala: *tubo* filiformi, *limbo* ventricoso, oblongo, erecto, terminato *laciniis* 5. linearibus, erectis. *Femineis* monopetala: *tubo* tenui, sensim ampliato, recurvo: *limbo* oblongo, obliquo, inæqualiter diviso.

STAM. Hermaphroditis *Filamenta* 5. capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulata, longitudine corollulæ.

PIST. Hermaphroditis *Germen* parvum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* obtusissimum, acumine (multis bifido) prominens. Femineis *Germen* minimum. *Stylus* vix nullus. *Stigma* nullum.

PER. nullum. *Calyx* immutatus, comivens.

SEM. *Hermaphroditis* solitaria. Pappus plerisque plumosus s. pilosus. Femineis nulla.

REC. *Setosum.*

SPEC. 1) *Moschata*, (Bisam F.) Calycibus inermibus subrotundis glabris: squamis ovatis, foliis lyrato-dentatis. *Loc.* Persia & Eur. hortis. *Fl.* Purpureus & albus Moschum redolens Jun. Jul.

2) *Cyanus*, (blaue Kornblume,) calycibus serratis, fol. linearibus integerrimis, infimis dentatis: hortensis flore simplici & pleno vel albo, l. carneo, l. cæruleo. *Loc.* Cultis, hortis & inter segetes. *Us.* Folia bob. capr. ovib. pabul. ac apibus flores, e quibus pigmentum habemus cæruleum, literis inserviens, & tabacum fumantes utuntur pro condimento.

3) *Scabiosa*. (braune Bergflockenblume, grosse Scabiose, Eisenwurzel,) calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis, pinnis lanceolatis, capitulis squamatis. *Loc.* Pratis. *Fl.* Jun. Jul.

4) *Jacea*, (gemeine Flockenblume,) calycibus scariosis, laceris, foliis lanceolatis, radicalibus sinuato-dentatis, ramis angulatis: Jacea nigra. *Loc.* Pratis. *Fl.* Jun. Jul. apibus pabul. & folia luteo-tinctoria.

5) *Benedicta*, (Cardobenedicten,) calycibus duplicato-spinosis lanatis involucratis, fol. semidecurrentibus denticulato-spinosis. *Loc.* Eur. hortis. *Vis.* Balsamica, tonica, pellens, purgans, sudorifera, amara.

SYNGENESIA.

Ord. IV. POLYGAMIA NECESSARIA, (Mit unfruchtbaren Zwittern, und fruchtbaren Weibgen.)

345) CALENDULA, (Ringelblume,) L.G.990.

CAL. *Communis* ſimplex, multipartitus, erectiuſculus: *ſegmentis* lineari-lanceolat. 14. ad 20. fere æqualibus.

COR. *Compoſita* radiata: *corollulæ hermaphroditæ* plurimæ, in diſco. *Femineæ* plurimæ, numero radiorum calycis, longiſſimæ, in radio.

Propria Hermaphroditi tubuloſa, ſemiquinqueſida, longitudine calycis. *Feminea* ligulata, longiſſima, tridentata, baſi villoſa, enervis.

STAM. Hermaphroditis *Filam.* 5. capillaria breviſſima. *Anthera* cylindracea, tubuloſa, longitudine corollulæ.

PIST. Hermaphroditis *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, vix ſtaminum longitudine. *Stigma* obtuſum. bifidum, rectum.

Femineis *Germen* oblongum, trigonum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, oblonga, acuminata, reflexa.

PER. nullum. *Calyx* connivens, ſubrotundus, depreſſus.

SEM. *Hermaphroditis centralia* diſci nulla, *peripheriæ propria* rarius ſolitaria, membranacea, obcordata, compreſſa.

Femineis ſolitaria, majora, oblonga, incurva, triangularia, angulis membranaceis, externe longitudinaliter figura vegetabilis inſculpta.

REC. nudum, planum.

SPEC. 1) *Arvenſis*, (Acker R.) ſeminibus cymbiformibus muricatis incurvatis: extimis erectis protenſis. *Loc.* Arvis. *Fl.* Jun. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis pabul. & apib. flores luteo-tinctorii uti crocus.

2) *Officinalis*, (gemeine groſſe R.) ſeminib. radii cymbif. muricat. incurvatis omnibus, echinatis bicornibus. *Loc.* Cultis, hortis, & arvis. *Fl.* Luteus Jul.-Sept. *Vis.* Pellens, ſudorifera; amara. *Uſ.* Flores odorati ad condimentum loco croci.

347) FI-

346) FILAGO (Fadenkraut,) Linn. G. 995.

CAL. *Communis* ex paleis imbricatis, continens in disco flosculos hermaphroditos, plures, in ambitu inter squamas calycis inferiores flosculos femineos solitarios.

COR. Hermaphroditicæ infundibuliformes, *limbo* quadrifido, erecto. *Femineæ* vix conspicuæ, filiformes angustissimæ, ore bifidæ.

STAM. Hermaphroditis *Filamenta* 4. capillaria, parva. *Anthera* cylindrica, apice quadridentata.

PIST. Hermaphroditis *Germen* vix ullum. *Stylus* simplex. *Stigma* acutum, bifidum.

Femineis *Germen* obovatum, maiusculum, depressum. *Styl.* filiformis. *Stigma* bifidum. PER. nullum.

SEM. Hermaphroditis nulla.

Femineis obovata, compressa glabra parva. Pappus nullus.

REC. discus nudus absque paleis, latera vero *Paleis* calycinis flosculos distinguentibus.

SPEC. 1) *Arvensis*, (Acker F.) floribus conicis lateralibus, caule paniculato. *Loc.* Montosis campis fabulosis. *Fl.* Aug. Sept.

2) *Leontopodium*, (Bergruhrkraut, Kazenpfötgen,) caule simplissimo, capitulo terminali bracteis hirsutissimis radiato. *Loc.* Alpibus, pratis. *Fl.* Aug.

SYNGENESIA.

Ord. VI. MONOGAMIA (Mit einzelnen Befruchtungs-Werkzeugen.)

347) JASIONE, (Jasione) Linn. G. 1005.

CAL. *Perianthium commune* polyphyllum: *foliolis alternis* interioribus angustioribus, flores plurimos pedunculis brevissimis adnexos includens, persistens. *Perianthium proprium* quinquefidum, superum, persistens.

COR. propria pentapetala: *petalis* lanceolatis, erectis, basi connexis.

STAM. *Filamenta* 5. subulata, brevia. *Antheræ* 5. oblongæ, basi connexæ.

PIST. *Germen* subrotundum; inferum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* bifidum.

PER.

Per. *Capſula* ſubrotunda, quinquangularis, coronata calyce proprio, bilocularis.
Sem. plura ſubovata.
Obs. *Floſculi centrales ſæpe abortientes ſtigmate indiviſo clavato.*

Spec. *Montana* (Berg I.) foliis lineari-lanceolatis obſolete ſerratis. *Loc.* Collibus ſiccis, viis, montibus. *Fl.* Apibus Jun. Jul.

348) VIOLA (Viole,) Linn. G. 1007.

Cal. *Perianthium* pentaphyllum, breve, perſiſtens: *foliolis* ovato-oblongis, erectis, apice acutioribus, baſi obtuſis, ſupra baſin affixis, æqualibus, ſed diſpoſitione variis: quorum duo fulciunt petalum α. ſingulum petalum β. γ. unicum duo petala δ. ε. ſimul.
Cor. pentapetala: irregularis. *Petalis* inæqualibus; quorum
Petalum α. ſupremum rectum, deorſum ſpectans, latius, obtuſius, emarginatum, deſinens baſi in *Nectarium* corniculatum, obtuſum, inter calycis folia prominens.
β. γ. lateralia paria, oppoſita, obtuſa, recta.
δ. ε. infima paria, majora, ſurſum reflexa.
Stam. *Filamenta* 5. minima; quorum *duo* petalo α. proxima appendicibus annexis intrant nectarium. *Antheræ* ſæpius connexæ, obtuſæ, membranis ad apicem auctæ.
Pist. *Germen* ſubrotundum. *Stylus* filiformis, extra antheras prominens. *Stigma* obliquum.
Per. *Capſula* ovata, trigona, obtuſa, unilocularis, trivalvis.
Sem. plura, ovata, appendiculata valvis affixa. *Receptaculum* lineare, per ſingulam valvulam lineæ inſtar excurrit.
Obs. Stigma *vel* (in Martiis *dictis*) *in hamum ſimplicem reflectitur, vel eſt* (*in* Tricoloribus *dictis*) *capitulum, concavum, apice perforato. Flos* in Europæis inverſus ſemper eſt: in Indicis ſæpius rectus, unde diverſa facies apparens.

Spec. 1) *Odorata*, (wohlriechende Merzen V.) acaulis, foliis cordatis, ſtolonibus, reptantibus teretibus, pedunculis radicalibus. *Loc* Nemoroſis, pratis. *Fl.* Purpureus l. albus odoratus, apibus,

apibus, Febr.-Apr. *Vis.* Flor. anodyna, refrigerans, analeptica. *Uſ.* Folior. ad olera, corollæ cæruleo-tinctorius.

2) *Canina*, (Rosveieln, Hundsviolen,) caule adultiore adſcendente, foliis oblongo-cordatis, inodora ſylveſtris. *Loc.* Apricis. *Fl.* Cærulæus Mart.-May. *Uſ.* Apibus flores herba bob. capr. ovib. pabul.

3) *Tricolor*, (dreyfärbige wilde Acker V. Freyſamkraut, Tag und Nachtblume, Garböckle,) caule triquetro diffuſo, foliis ovato-oblongis inciſis, crenatis, ſtipulis oblongis pinnato-dentatis, hortenſis repens. *Loc.* Cultis, agris, hortis. *Fl.* Flavo-violaceus Mart.-Jun. apibus & bob. capr. pabulum.

349) IMPATIENS, (Springkraut,) L. G. 1008.

Cal. *Perianthium* diphyllum, minimum: *foliolis* ſubrotundo-acuminatis, æqualibus, verſus latera floris poſitis, coloratis, deciduis.

Cor. pentapetala, ringens: *Petalis* inæqualibus: quorum Petalum α. *ſummum* ſubrotundum, planum, erectum, leviter trifidum, apice acuminatum, *labium ſuperius* conſtituens.

β. γ. *infima* paria, reflexa, maxima, extrorſum latiora, obtuſa, irregularia, *labium inferius* conſtituentia.

δ. ε. *intermedia* paria, oppoſita; ad baſin α. exorta. *Nectarium* monophyllum, cuculi inſtar fundum floris recipiens, ore obliquum, extrorſum aſſurgens, baſi in cornu deſinens.

Stam. *Filamenta* 5. breviſſima, verſus baſin anguſtiora, incurva. *Antheræ* totidem, connatæ, baſi diviſæ.

Pist. *Germen* ovato-acuminatum. *Stylus* nullus. *Stigma* ſimplex, antheris brevius.

Per. *Capſula* unilocularis, quinquevalvis, elaſtice diſſiliens valvulis in ſpiram convolutis.

Sem. plura, ſubrotunda, receptaculo columnari affixa.

Obs. *Deficiunt in aliis Petala δ. η. in aliis Cornu nectarii.* Capſulæ *figura differt: hinc* Impatiens *Riv. Capſula longa fuit: &* Balſamina *Riv. ovata.*

Spec. 1) *Balſamina*, (Balſamine, Hanenſporn, Balſamkraut,) pedunculis confertis unifloris ſubag-

ſubaggregatis, foliis lanceolatis, ſuperioribus alternis, nectariis flore brevioribus. *Loc.* India & hortis Europæ. *Fl.* Jul.-Oct. vel albus l. ruber variegatus apibus, & ornamentum hortorum.

2) *Noli me tangere*, (gemein S. gelber Springſamen, wilde gelbe Balſamine,) pedunculis multifloris ſolitariis, fol. ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *Loc.* Silvis, ad muros. *Fl.* Flav. Jul.-Sept. *Uſ.* Capris pabulum.

Claſſis XX.

GYNANDRIA,

(Mit aneinander gewachſenen Staubfäden und Staubwegen.)

GYNANDRIA dignoſcitur a reliquis ſitu Staminum in ipſo Stylo, vel in receptaculo elongato in formam Styli, piſtillum cum ſtaminibus ferente, piſtillique in partem tranſeunte.

Obs. *Primus Ordo hujus Claſſis, qui* Diandria *dicitur, Naturalis eſt, cujus genera, ſola fere conſideratione Nectarii, a ſe invicem differunt: quam notam Radici longe præferimus in conſtituendis generibus, licet a Botanicis antea non recepta fuerit.*

Structura fructificationis hujus Ordinis omnino ſingularis eſt.

Germen *enim ſemper inferum contortum eſt.* Petala 5. *quorum* 2. interiora *connivent ſæpius in galeam. Labium inferius Nectarium conſtituit, quod locum piſtilli & petali ſexti occupat.* Stylus *adnaſcitur margini interiori nectarii, ut cum ſtigmate ſuo vix diſtingui poſſit. Filamenta ſemper* 2. *ſunt, breviſſima, ferentia totidem* Antheras, *inferne anguſtiores, nudas ſeu tunica carentes, pulpæ citri inſtar diviſibiles: hæ teguntur* Cellulis *totidem deorſum apertis, ipſi margini interiori nectarii innatis. Fructus* Capſula *eſt unilocularis, trivalvis, dehiſcens angulis ſub coſtis carinatis.* Semina *ſcobiformia, numeroſa, affixa receptaculo lineari in ſingula valvula.* Vires *aphrodiſiacæ, omnibus his plantis ab omnibus Medicis adſcribuntur.*

Lector

Lector in examinando & conferendo Characteres noſtros ſemper in hac Claſſe tradat Piſtillum ante Stamina, ſi alias diſtinctam idæam ſitus Staminum habere velit; nos enim ne ordinem ſemel receptum mutaremus, Stamina ante Piſtilla deſcripſimus.

Potuiſſem ſi non debuiſſem, *Callam*, *Arum*, *Dracontium*, ad alias *Pothum*, *Zoſteram* demandare Claſſes, quum autem difficillime, nec ulla ratione certum numerum Staminum ſingulo piſtillo adſignare aliquem poſſe puto in his Generibus, conſultius duxi ea heic inſerere, quam tædium examinanti procreare.

Singulares ſunt Flores hujus Claſſis & monſtroſam ac inadſuetam præ ſe ferunt faciem, quod a ſitu partium fructificationis inſolito, reſpectu ad reliquas plantas, oritur.

Ord. I. DIANDRIA.

350) ORCHIS, (Knabenkraut,) Linn. G. 1009.

CAL. *Spathæ* vagæ. *Spadix* ſimplex.
Perianthium nullum.

COR. *Petala* 5. *tria* exteriora, *duo* interiora, ſurſum conniventia in galeam.
Nectarium monophyllum, a latere inferiore inter diviſuram petalorum receptaculo affixum. *Labio ſuperiore* erecto, breviſſimo: α. *inferiore* magno, patente lato. *Tubo*, coniformi, poſtice nutante.

STAM. *Filamenta* duo, tenuiſſima, breviſſima, piſtillo inſidentia. *Antheræ* obovatæ, erectæ, tectæ duplicatura biloculari labii ſuperioris nectarii.

PIST. *Germen* oblongum, contortum, inferum. *Stylus* adnatus labio ſuperiori nectarii, breviſſimus. *Stigma* compreſſum, obtuſum.

PER. *Capſula* oblonga, unilocularis, tricarinata, trivalvis, ſub carinis trifariam dehiſcens, apice & baſi cohærens.

SEM. numeroſa, minima, ſcobiformia.

SPEC. 1) *Bifolia*, (zwezblätriges K. Ragwurz, weiſſe wohlriechende Stendelwurz) bulbis indiviſis, nectarii labio lanceolato integerrimo, cornu longiſſimo, petalis patentibus. *Loc.* Paſcuis aſperis, ſilvis. *Fl.* Purpur. ſuaveolentes aromatici May-Jul. apibus.

2) *Co-*

2) *Coriophora*, (ſtinkendes K.) bulb. indiviſ. nectarii labio trifido reflexo, crenato; cornu brevi, petalis conniventibus. *Loc.* Pratis, paſcuis. *Fl.* Saturate purpureus vel albidus May.

3) *Latifolia*, (breitblätriges K. Ragwurz, Creuzblume, Stendelw.) bulbis ſubpalmatis rectis, nectarii cornu conico, labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus, radicibus palmatis. Petala 2. lateralia ſurſum flexa, 3. vero conniventia: nectarii labium lateribus reflexum, caulis fiſtuloſus. *Loc.* Humidis pratis montoſis. *Fl.* May. Jun. *Uſ.* Ovib. pabul. herba.

4) *Maculata*, (geflektes K. Ragwurz,) bulb. palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus breviore, labio plano, petalis dorſalibus patulis. Petala 3. exteriora erecta, 2. interiora conniventia: nectarii labium trifidum, planum; lobis lateralibus maioribus crenatis: intermedio anguſtiſſimo, integerrimo. *Loc.* Pratis ſucculentis. *Fl.* May. Jun. *Uſ.* Bob. ovib. pabulum.

351) SATYRIUM, (Stendel, Bocksgeilen.) Linn. G. 1010.

CAL. *Spathæ* vagæ. *Spadix* ſimplex. *Perianthium* nullum.

COR. *Petala* 5. ovato-oblonga, *tria* exteriora, *duo* interiora, ſurſum conniventia in galeam. *Nectarium* monophyllum, a latere inferiore inter diviſuram petalorum receptaculo adnexum: *labio ſuperiore* erecto, breviſſimo: *inferiore* plano, pendulo, baſi burſa ſcrotiformi poſtice prominente.

STAM. *Filamenta* duo, tenuiſſima, breviſſima, piſtillo inſidentia. *Antheræ* obovatæ, tectæ duplicatura biloculari labii ſuperioris nectarii.

PIST. *Germen* oblongum, contortum, inferum. *Stylus* labio ſuperiori nectarii adnatus, breviſſimus. *Stigma* compreſſum, obtuſum.

PER. *Capſula* oblonga, unilocularis, tricarinata, trivalvis, ſub carinis trifariam dehiſcens, apice & baſi cohærens.

SEM. numeroſa, minima ſcobiformia.

SPEC. 1) *Viride*, (grüner St.) bullis palmatis, foliis oblongis obtuſis: nectarii labio lineari trifido

do, intermedia obſoleta. *Loc.* Montoſis ſilvis. *Fl.* Jul.

352) OPHRYS, (Zweyblat,) Linn. G. 1011.

CAL. *Spathæ* vagæ. *Spadix* ſimplex.
Perianthium nullum.
COR. *Petala* quinque, oblonga, ſurſum conniventia, æqualia: *duo* horum exteriora.
Nectarium petalis longius, dependens, poſtice carinatum.
STAM. *Filamenta* duo, breviſſima, piſtillo inſidentia. *Antheræ* erectæ, tectæ margine interiore nectarii.
PIST. *Germen* oblongum, contortum. *Stylus* margini interiori nectarii adnatus. *Stigma* obſoletum.
PER. *Capſula* ſubovata, trigona, obtuſa, ſtriata, trivalvis, unilocularis, angulis carinatis dehiſcens.
SEM. numeroſa, ſcobiformia. *Receptaculum* lineare, adnatum ſingulæ valvulæ pericarpii.

SPEC. 1) *Nidus avis*, (Vogelneſt, Waldknabenkraut, nackende Stendelwurz) bulbis fibroſo-faſciculatis, caule vaginato, nectarii labio bifido. Orchis abortiva fuſca. *Loc.* Montoſis, Nemoribus. *Fl.* May. Jun.

2) *Ovata*, (gemeines eyförmiges Z.) bulbo fibroſo, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido. *Loc.* Subhumidis pratis, ſilvis. *Fl.* May. Jun.

353) SERAPIAS, (Serapias) Linn. G. 1012.

CAL. *Spathæ* vagæ. *Spadix* ſimplex.
Perianthium nullum.
COR. *Petala* quinque ovato-oblonga, erecto-patula, ſurſum conniventia.
Nectarium longitudine petalorum, baſi excavatum, melliferum, ovatum, inferne gibbum, trifidum, acutum, intermedia cordata obtuſa, baſi cicatrice bifida tridentata.
STAM. *Filamenta* duo, breviſſima, piſtillo inſidentia. *Anth.* erectæ, ſub labio ſuperiore nectarii collocatæ.
PIST. *Germen* oblongum, contortum, inferum. *Stylus* labio ſuperiori nectarii adnatus. *Stigma* obſoletum.
PER. *Capſula* obovata, obtuſe trigona, tribus carinis adnatis, trivalvis, ſub carinis dehiſcens, unilocularis.

Sem. numerosa, scobiformia. *Receptaculum* lineare, singulæ valvulæ pericarpii adnatum.

Spec. *Longifolia*, (langblätrige S. wilde Nieswurzel, hohe blaue Bergcymbelblume, Stendelwurz.) bulbis fibrosis, floribus erectis bractea longioribus; radicibus fibrosis, nectarii labio obtuso breviore, foliis ensiformibus. *Loc.* Montosis. *Fl.* Jul. Aug.

354) CYPRIPEDIUM, (Venusschuh,) L.G. 1015.

Cal. *Spathæ* vagæ. *Spadix* simplex. *Perianthium* nullum.

Cor. *Petala* 4. vel 5. lanceolato-linearia, longissima, patentia, erecta. *Nectarium* intra petalum infimum, calceiforme, inflatum, obtusum, cavum, petalis brevius, latus; *labio* superiore ovato, plano, inflexo, parvo.

Stam. *Filamenta* duo, brevissima, pistillo insidentia. *Antheræ* erectæ, tectæ labio superiori nectarii.

Pist. *Germen*, longum, contortum inferum. *Stylus* brevissimus, labio superiori nectarii adnatus. *Stigma* obsoletum.

Per. *Capsula* obovata, obtuse trigona: tribus futuris sub quibus dehiscit angulis, trivalvis, unilocularis.

Sem. numerosa, minima. *Receptaculum* lineare, singulæ valvulæ pericarpii longitudinaliter adnatum.

Spec. *Calceolus*, (gemeiner V. Pfaffen- Frauen-Schuh,) radicibus fibrosis, foliis ovato-lanceolatis caulinis: Helleborine caule folioso. *Loc.* Montosis. *Fl.* Vel luteus, l. purpur. l. variegatus Jul.

GYNANDRIA
Ord. VI. HEXANDRIA.

355) ARISTOLOCHIA, (Osterlucey.) L.G. 1022.

Cal. nullus.

Cor. *Petalum* unicum, tubulosum-inæquale: *basis* ventricosa, subglobosa, torulosa: *Tubo* oblongo, hexagono-cylindraceo: *Limbo* dilatato, inferne extenso in linguam longam.

Stam. *Filamenta* nulla. *Antheræ* sex, infra stigmata adnatæ, quadriloculares.

Pist.

PIST. *Germen* oblongum, inferum, angulatum. *Stylus* vix ullus. *Stig.* ſubgloboſum, ſexpartitum, concavum.
PER. *Capſula* magna, ſexangularis, ſexlocularis.
SEM. plura, depreſſa, incumbentia.
OBS. *Fructus figura variat, aliis ſubrotundus, aliis longus.*
SPEC. *Clematis*, (gemeine kleine O. Holzwurz) foliis cordatis petiolatis, caule erecto, floribus axillaribus lateralibus confertis. *Loc.* Ad muros, paſcuis. *Fl.* May. Jun. *Vis.* Pellens, incidens, vomitoria, foetida.

GYNANDRIA.

Ord. VIII. POLYANDRIA.

356) ARUM, (Aron,) Linn. G. 1028.

CAL. *Spatha* monophylla, maxima, oblonga, baſi convoluta, apice connivens, ventre compreſſa, interne colorata.
Spadix clavatus, ſimpliciſſimus, Spatha paulo brevior, coloratus, inferne germinibus obvallatus, marceſcens ſupra germina.
COR. nulla.
STAM. *Filamenta* nulla, niſi Nectaria baſi craſſa, deſinentia in *Cirrhos* filiformes duorum ordinum e medio ſpadice egredientes. *Antheræ* plurimæ, ſeſſiles, tetragonæ, cirrhorum duplici ordini interjectæ, ſpadici adnatæ.
PIST. *Germina* plurima baſin ſpadicis veſtientia, infra ſtamina collocata, obovata. *Styli* nulli. *Stigmata* villis barbata.
PER. *Baccæ* totidem, globoſæ, uniloculares.
SEM. plura, ſubrotunda.
OBS. *Mira floris ſtructura & ſine pari, quæ Botanicis Summis diſputandi materiem præbuit. Vide Tournef. Malpig. Dillen Rivin. &c.*
Receptaculum elongatum in clavam nudam, germina ad baſin retinens, Stamina intra germina, miracula naturæ, receptaculo affixa filamentorum elevantium ope minus indigentia: hinc flos inverſus dici poteſt. Quid ſunt cirrhi iſti ſub filamentis commemorati?
SPEC. *Maculatum*, (gewöhnlicher geflekter A. teutſcher Ingwer, Pfaffenpint, Zehrwurz,) acaule, foliis haſtatis integerrimis, ſpadice excavato,

vato, maculis candidis *f.* nigris. *Loc.* Montosis, fruticetis, dumetis. *Fl.* May. *Vis.* Incidens, expectorans, cosmetica, recens corrodens, acris.

Classis XXI.

MONOECIA,

(Mit halbgetrenten Geschlechtern,)

Masculus flos instruitur staminibus, destituitur Pistillo.
Femineus fl. destituitur staminibus, instruitur Pistillo.
Androgyna planta profert & Flores Masculos & Femineos in eodem individuo.
Monoecia comprehendit flores tantum Androgynos, absque hermaphroditis: i. e. flores Masculos & femineos distinctos, sed ex eadem radice prognatos.
Calyx communis si diversos sexu flosculos comprehendat, non intrat monoeciam, ne confusio oriatur, adeoque nec varia genera *Umbellatorum*, compositorumve florum.

Ord. I. MONANDRIA.

357) CHARA, (Armleuchter,) Linn. G. 1203.

Cal. diphyllus, minimus.
Cor. nulla, (monopetala, Vaill.)
Stam. *Filament.* nullum. *Anthera* unica globosa, receptaculo affixa. Pont.
Pist. *Germen* ovatum. *Stylus* nullus. *Stigmata* 3. latiuscula. Pont.
Per. nullum, (Capsula monospermia Vaill.)
Sem. unicum ovato-oblongum.

Spec. *Vulgaris*, (gemeiner A.) caulibus lævibus, frondibus interne dentatis. *Loc.* Stagnis. Fl. Jul.

MONOECIA. Ord. II. DIANDRIA.

358) LEMNA, (Wasserlinse) Linn. G. 1038.

* *Hermaphroditus Flos.*

Cal. monophyllus, subrotundus, latere dehiscens, oblique extrorsum dilatatus, obtusus, depressus, magnus, integer, patens.
Cor. nulla.

Stam.

STAM. *Filamenta* duo, ſubulata, incurva, longitudine calycis. *Antheræ* didymæ, globoſæ.
PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* brevis. *Stigma* obſoletum.
PER. abortiens.

* *Femineus Flos* in eadem planta cum maſculo.
CAL. ut in hermaphrodito.
COR. nulla.
PIST. *Germen* ſubovatum. *Stylus* brevis, perſiſtens. *Stigma* ſimplex.
PER. *Capſula* globoſa cum acumine, unilocularis.
SEM. nonnulla, oblonga, utrinque acuta, longitudine fere capſulæ, hinc ſtriata.

SPEC. 1) *Minor*, (kleines Entengrün, Waſſerlinſe,) foliis ſeſſilibus utrinque planiuſculis, radicibus ſolitariis. *Loc.* Aquis quietis. *Fl.* May. Jul. *Uſ.* Anatibus, anſeribus, gallinis cum furfure, grata.

2) *Polyrhiza*, (vielwurzliche W.) foliis ſeſſilibus, radicibus confertis: *Loc.* Paludibus, foſſis. *Fl.* Jul. *Uſ.* cum ſuperiori idem.

MONOECIA Ord. III. TRIANDRIA.

59) TYPHA, (Rohrkolbe,) Linn. G. 1040.

* *Maſtuli* numeroſi in amento culmum terminante.
CAL. *Amentum commune* cylindraceum, denſiſſimum, conſtans. *Perianthiis* propriis triphyllis, ſetaceis.
COR. nulla.
STAM. *Filamenta* tria, capillaria, longitudine calycis. *Antheræ* oblongæ, pendulæ.

* *Feminei* numeroſi in amento, culmum eundem cingente, compactiſſime digeſti.
CAL. *Capilli* pappoſi.
COR. nulla.
PIST. *Germen* ſetæ inſidens, ovatum. *Stylus* ſubulatus. *Stigma* capillare, perſiſtens.
PER. nullum. *Fructus* numeroſi cylindrum conſtituunt.
SEM. unicum, ovatum, ſtylo inſtructum, ſetæ inſidens. *Pappus* capillaris, ſetæ ſeminiferæ quaſi affixus, longitudine piſtilli.

SPEC. 1) *Latifolia*, (breitblätrige R. Lieſchkolbe, Pumpskeule,) foliis ſubenſiformibus, ſpica ma-

ſcula femineaque approximatis. *Loc.* Paludibus. *Fl.* Jul. *Uſ.* Bobus pabulum; Pappo pauperes culcitras implent.

2) *Anguſtifolia*, foliis ſemicylindricis, ſpica maſcula femineaque remotis. *Loc.* Paludibus. *Fl.* Jul.

360) SPARGANIUM, (Igelskolbe,) L. G. 1041.

* *Maſculi* numeroſi, in capitulum collecti.

CAL. *Amentum commune* ſubrotundum, undique denſiſſime imbricatum, conſtans *Perianthiis* propriis triphyllis, linearibus, deciduis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, longitudine calycis. *Antheræ* oblongæ.

* *Feminei.*

CAL. ut in mare. *Receptaculum commune* ſubrotundum.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum, deſinens in *Stylum* brevem, ſubulatum. *Stigmata* duo acuta, perſiſtentia.

PER. *Drupa* exſucca, turbinata cum acumine, inferne angulata.

SEM. *Nuces* duæ, oſſeæ, oblongo-ovatæ, angulatæ.

OBS. *Semen in aliis uniloculare, in aliis biloculare obſervat Tournefortius.*

SPEC. *Natans*, (ſchwimmende I. Rindknoſpengras, Degenkraut,) foliis decumbentibus planis, natantibus plano convexis. *Loc.* Lacubus, paludibus. *Fl.* Aug. *Uſ.* Bobus gratum, piſces adlicit: fluvios & lacus pacatos reddit.

361) ZEA, (Türkiſch Korn,) Linn. G. 1044.

* *Maſculi* in ſpicas laxas diſpoſiti.

CAL. *Gluma* biflora, bivalvis: *valvulis* ovato-oblongis, muticis.

COR. *Gluma* bivalvis: *valvulis* oblongis, muticis; longitudine calycis.

Nectaria duo, compreſſa, breviſſima.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* quadrangulæ, quadriloculares, apice dehiſcentes.

* *Feminei* in ſpica denſiſſima infra maſculos, in eadem planta, foliis obtecta.

CAL. *Gluma* propria bivalvis: *ſquamis* ſubrotundis, craſſis, breviſſimis, *exteriore* craſſiore.

COR.

Cor. bivalvis: *valvulis* membranaceis, latis breviſſimis, perſiſtentibus.
Pist. *Germen* minimum. *Stylus* filiformis, omnium longiſſimus. *Stigma* ſimplex, verſus apicem pubeſcens.
Per. nullum. *Receptaculum commune* maximum, longum, excavatum, in quo ad dimidiam partem demerſi ſunt fructus, calyce & corolla propria cincti.
Sem. ſolitaria (poſt ſingulos flores), ſubrotunda, baſi angulata, compreſſa.

Spec. *Mays*, (t. K. Welſchkorn, Weizen,) frumentum indicum. *Loc.* Cultis, agris Europæ. *Fl.* Aug. *Uſ.* Semina varii coloris rubra, flava, purpur. &c. farinoſa ſunt, loco frumenti, ſuccedaneum panis: Americani juſcula, pulmenta, decocta varia præparant: pecoribus, bobus, vaccis, ſuibus, anſeribus, anatibus, columbis ſunt pabulum, & commoda ſaginatio.

362) CAREX, (Riedgras,) Linn. G. 1046.

* *Maſculi Flores* in ſpicam digeſti.
Cal. *Amentum* oblongum, imbricatum, conſtans. *Squamis* unifloris, lanceolatis, acutis, concavis, perſiſtentibus.
Cor. nulla.
Stam. *Filamenta* tria, ſetacea, erecta, calyce longiora. *Antheræ* erectæ, longæ, lineares.

* *Feminei Flores* in eadem vel (quibusdam) in diſtincta planta.
Cal. *Amentum* ut in maſculis.
Cor. *Petala* nulla,
Nectarium inflatum, ovato-oblongum, apice bidentatum, ſuperne contractum, ore dehiſcens, perſiſtens.
Pist. *Germen* triquetrum, intra nectarium. *Stylus* breviſſimus. *Stigmata* tria vel duo, ſubulata, incurva, longa, acuminata, pubeſcentia.
Per. nullum. *Nectarium* majus factum ſemen fovet.
Sem. unicum, ovato-acutum, triquetrum altero angulo, ſæpius minore.

Spec. 1) *Arenaria*, (Sand R. kriechender Flug-Sand, Eiſerpäthen,) ſpica compoſita, ſpiculis androgynis, inferioribus remotioribus foliolo longiori inſtructis, culmo triquetro. *Loc.* Siccis

arena mobili, ſilvis. *Fl.* May, *Uſ.* Arenam volatilem radice ſerpente domat: ſuccedaneum radicis Smilacis Saſſaparillæ.

2) *Brizoides*, (Zittergrasartiges R.) ſpica compoſita diſticha nuda, ſpiculis androgynis oblongis contiguis, culmo nudo. *Loc.* Paludoſis, viis. *Fl.* Jun.

3) *Vulpina*, (Fuchs R. Waſſercyperngras, Bruchſegge,) ſpica ſupra decompoſita inferne laxiore: ſpiculis androgynis ovatis ſeſſilibus glomeratis, ſuperne maſculis. *Loc.* Rivulis, paludibus nemoroſis, viis. *Uſ.* Straminis loco, involvendis mercibus, paludes exſiccat, ſemen avibus pabul.

4) *Limoſa*, (leimiger R. kleinere Torfſegge,) ſpicis ovatis pendulis, maſcula longiore erectiore, radice repente. *Loc.* Paludibus ſilvaticis. *Fl.* May.

5) *Ceſpitoſa*, (Raſen R.) ſpicis erectis cylindricis ternis ſubſeſſilibus maſcula terminali, culmo triquetro. *Loc.* Paludibus turfoſis, ſilvis. *Fl.* May. *Uſ.* Bob. capr. ovib. equis pabulum.

6) *Veſicaria*, (hohes Blaſen R. langſtielige Blaſenſegge,) ſpicis maſculis pluribus, femineis pedunculatis, capſulis inflatis acuminatis. *Loc.* Ripis fluviorum & foſſis. *Fl.* May. *Uſ.* Frigus acerbum hoc gramine eludunt Lappones.

MONOECIA.

Ord. IV. TETRANDRIA.

363) BETULA, (Bircke.) Linn. G. 1052.

* *Maſculi Flores* in Amenta cylindracea digeſti.

CAL. *Amentum* commune, undique imbricatum, laxum, cylindraceum: conſtans *ſquamis* trifloris, quibus ſingulis *ſquamulæ* duæ, minutiſſimæ, ad latera poſitæ.

COR. *Compoſita* floſculis tribus, æqualibus, diſco ſquamæ ſingulæ calycinæ affixis.

Propria monopetala, quadripartita, patens, minima: *laciniis* ovato obtuſis.

STAM. *Filamenta* (Corollulæ) quatuor minima. *Antheræ* didymæ.

* *Feminei Flores* in Amenta ejusdem plantæ.

CAL. *Amentum Commune*, imbricatum, *ſquamis* tribus ubi-

ubique oppoſitis, rachi affixis, biſloris cordatis cum acumine, a mucrone verſus apicem ſinu parum diſſectis, concavis, brevibus.

Cor. nulla manifeſta.

Pist. *Germen* proprium ovatum, minimum. *Styli* 2. ſetacei, longitudine ſquamæ calycinæ. *Stigmata* ſimplicia.

Per. nullum. *Amentum* ſub ſingula ſquama 2. florum ſemina fovens.

Sem. ſolitaria, ovata.

Obs. *Almus*. T. fructus in ſtrobilum ſubrotundum digeſti.

Spec. 1) *Alba*, (weiſſe B. Mayen, Wunnebaum,) foliis ovatis acuminatis ſerratis. *Loc.* Silvis. *Fl.* April. *Uſ. Folia* viridi-luteo-tinctoria. exſiccata pro pabulo boum caprar. ovium equorum; *cortex* craſſior loco pallii *Lapponibus*, aliisque coriarius, rubro-tinctorius ad retia piſcatoria; veteribus loco papyri; *Liber* ter recreſcens in arbore, aquam repellens, Lapponibus ſcatulis, lagenis, Suecis pro tegendis domibus, ſoleis ruſticorum & piſcatorum: Liber uſtulatus & maſticatus gluten producit vaſis teſtaceis: *Rami*, tenaces ad funes contorquendos corbesque piſcatorios, & ſubtiles ſcopas. *Lignum* durum, album, tenax ad manubria cultrorum, rotas, trahas, varia vaſa & inſtrumenta robuſtiora, ad circulos doliorum maiorum; e ligno præparatus fuligo typographis utilis, carbonibus Metallurgiæ, pulveri pyrio & delineationibus pictorum: Oleum e ligno præparatum corio & rotis inungendis; ſuccus e cortice erumpens ſanguinem purificans.

2) *Almus*, (gemeine Erle, Ellern, Arle, Otten.) pedunculis ramoſis: glutinoſa viridis rotundifolia; incana folio incano. *Loc.* Silvis, humidis, montoſis frigidis. *Fl.* Apr. *Uſ.* Ad ſepes, aggeres paludum in ſilvis, ne ripa adiacentem terram exedat, prohibet: *folia* ovibus pabulum. *Cortex*, ſuccedaneum cortic. peruviani, fuſco-rufo-tinctorius ad retia piſcatorum & ſutorum coria: *lignum* tornatoribus, fabris lignariis ad orbiculos, patinas, vaſa lactea, palas, rotas coli ob facilem conglutinationem, ad manubria pectinum pratorum & bombardarum: carbones

nigro tinctorii ad pulverem pyrium, *radix* nigro-tinctoria inſtar ebeni maxime pectinata ſcipionibus, cultrorum manubriis; *lignum* molle glabrum ſero putreſcens ad fulcra ædificiorum, etiam ſub aqua, unde Venetorum urbs quam maxime huic ſuperſtructa eſt, uti & maximus pons de Pialto.

364) BUXUS, (Buchs,) Linn. G. 1053.

* *Maſculi Flores* ex gemmis plantæ prominentes.

Cal. *Perianthium* triphyllum: *foliolis* ſubrotundis, obtuſis, concavis, patentibus.

Cor. *Petala* duo, ſubrotunda, concava, ſimillima calyci, ad majora.

Stam. *Filamenta* quatuor, ſubulata, erecto-patentia, calyce fere majora. *Antheræ* erectæ, didymæ.

Pist. *Germinis* rudimentum absque ſtylo vel ſtigmate.

* *Feminei* in eadem gemma cum maſculis.

Cal. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* ſubrotundis, obtuſis, concavis, patentibus.

Cor. *Petala* tria, ſubrotunda, concava, ſimillima calyci, calyce majora.

Pist. *Germen* ſubrotundum, obtuſe trigonum, deſinens in *Stylos* tres, breviſſimos, perſiſtentes. *Stigmata* obtuſa, hiſpida.

Per. *Capſula* ſubrotunda, triroſtris, trilocularis, trifariam elaſtice dehiſcens.

Sem. oblonga, hinc rotundata, inde plana.

Spec. Sempervirens, (immergrünender B.) arboreſcens, (baumartiger B.) ſuffruticoſa, (ſtaudiger B.) humilis, foliis rotundioribus. *Loc.* Eur. hortis. *Fl.* Mart. *Uſ.* Topiariis, tornatoribus, ſcriniariis, ſculptoribus æreariis lignum ad varia inſtrumenta.

365) URTICA (Neſſel) Linn. G. 1054.

* *Maſculi Flores.*

Cal. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* ſubrotundis, concavis, obtuſis.

Cor. *Petala* nulla.

Nectarium in centro floris, urceolatum, integrum inferne anguſtius, minimum.

Stam. *Filamenta* quatuor, ſubulata, longitudine calycis,

lycis, patentia, intra ſingulum folium calycinum ſingula. *Antheræ* biloculares.

* *Femineis Flores* vel in eadem, vel in diſtincta plana.
CAL. *Perianthium* bivalve, ovatum, concavum, erectum, perſiſtens.
COR. nulla.
PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* nullus. *Stigma* villoſum.
PER. nullum. *Calyx* connivens.
SEM. unicum, ovatum, obtuſo-compreſſum, nitidum,
SPEC. 1) *Urens*, (kleine Brenneſſel, Heiterneſſel,) foliis oppoſitis ovalibus. *Loc.* Cultis, ruderatis. *Fl.* Jun.
2) *Dioica*, (groſſer mit ganz getrennten Geſchlechtern B.) fol. oppoſit. oblongo-cordatis, racemis geminis. *Loc.* Viis. ruderatis. *Fl.* Jun. *Uſ.* Pecoribus pabul. & anſeribus; radices aggerem irruentes prohibent noxam a profluviis aquarum; caules maceratæ ſuccedaneum cannabis.

366) MORUS, (Maulbeerbaum,) Linn. G. 1055.

* *Maſculi Flores* in amenta digeſti.
CAL. *Perianthium* quadripartitum: *foliolis* ovatis, concavis.
COR. nulla.
STAM. *Filamenta* quatuor, ſubulata, erecta, calyce longiora, intra ſingulum folium calycinum ſingula. *Antheræ* ſimplices.

* *Feminei Flores* congeſti vel in eadem, vel diverſa planta a maſculis.
CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* ſubrotundis, obtuſis, perſiſtentibus, oppoſitis duobus exterioribus incumbentibus.
COR. nulla.
PIST. *Germen* cordatum. *Styli* duo, ſubulati, longi, reflexi, ſcabri. *Stigmata* ſimplicia.
PER. nullum. *Calyx* maximus, carnoſus, ſucculentus factus *Bacca*.
SEM. unicum, ovato-acutum.
OBS. *Dantur* & Mares & Feminæ *in diœcia*. 2.
SPEC. 1) *Alba* (weiſſe M.) foliis oblique cordatis lævibus, fructu albo eſculento, &
2) *Nigra* (ſchwarze M.) fol. cordat, ſcabris, fructu

ctu nigro eſculento. *Loc.* Cultis, hortis. *Fl.* Apr. May. *Uſ.* Folia pabulum bombycum: *Vis.* Refrigerans, roborans.

MONOECIA.
Ord. V. PENTANDRIA.

367) AMARANTHUS, (Amarant,) L. G. 1060.

* *Maſculi Flores* in eadem planta cum femineis.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum vel triphyllum, erectum, coloratum, perſiſtens: *foliolis* lanceolato-acutis.

COR. nulla, niſi Calycem ſumas.

STAM. *Filamenta* 5. vel tria capillaria, erecto-patula, longitudine calylis. *Antheræ* oblongæ, verſatiles.

* *Feminei Flores* in eodem cum maſculis racemo.

CAL. *Perianthium* omnino ut in mare.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* tres, breves, ſubulati. *Stigmata* ſimplicia, perſiſtentia.

PER. *Capſula* ovata, parum compreſſa, ut calyx cui inſidet colorata, ejusque magnitudine, triroſtris, unilocularis, circumſciſſa.

SEM. unicum, globoſum, compreſſum, magnum.

SPEC. 1) *Blitum*, (Meyer-A. wilde Melde, Tauſendſchön.) glomerulis lateralibus trifidis, foliis ovatis retuſis, emarginatis, caule diffuſo. *Loc.* Cultis, hortis ſponte. *Fl.* Apr. Jun. *Uſ.* Folia inſtar oleris in annonæ difficulate.

2) *Caudatus*, (Fuchsſchwanz) racemis pentandris decompoſitis cylindricis pendulis longiſſimis. *Loc.* Hortis. *Fl.* Jul.

MONOECIA.
Ord. VIII. POLYANDRIA.

368) MYRIOPHYLLUM, (Federball,) L. G. 1066.

* *Maſculi Flores.*

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *foliolis* oblongis, erectis: horum *extimum* majus, *intimum* minus.

COR. nulla.

STAM.

STAM. *Filamenta* octo, capillaria, calyce longiora, flaccida. *Antheræ* oblongæ.

* *Feminei Flores* infra masculos.
CAL. *Perianthium* ut in mare.
COR. nulla.
PIST. *Germina* quatuor, oblonga. *Styli* nulli. *Stigmata* pubescentia.
PER. nullum.
SEM. quatuor, oblonga.
OBS. M. verticillatum sæpe floribus hermaphroditis est.
SPEC. *Spicatum*, (ährnförmiger F. Federkraut,) floribus masculis interrupte spicatis. *Loc.* Aquis quietis, paludibus. *Fl.* Jul.

369) POTERIUM, (Becherblume) Linn. G. 1069.

* *Masculi Flores* in spicam positi.
CAL. *Perianthium* triphyllum: *foliolis* ovatis, coloratis, caducis.
COR. quadripartita. *Petala* ovata, concava, patentia, basi coalita, persistentia.
STAM. *Filamenta* plurima (30-50.) capillaria, longissima, flaccida. *Antheræ* subrotundæ, didymæ.

* *Feminei Flores* in eadem spica supra masculas.
CAL. *Perianthium* ut in mare.
COR. monopetala, rotata. *Tubus* brevis, subrotundus, ore connivens. *Limbus* quadripartitus: *laciniis* ovatis, planis, reflexis, persistentibus.
PIST. *Germina* duo, ovato-oblonga, intra tubum corollæ. *Styli* duo, capillares, colorati, flaccidi, longitudine corollæ.
Stigmata penicilliformia, colorata.
PER. *Bacca* fit e tubo corollæ, indurato, incrassato, clauso. SEM. duo.
OBS. *Species sanguis. Bacca exsucca angulata, seminibus tetragonis utrinque acuminatis.*
SPEC. *Sanguisorba*, (gemeine B. Nagelkraut, rauhes Blutkraut, klein Sperberkraut, kleine Pimpinelle, Megelkraut.) inerme, caulibus subangulosis, filamentis longissimis. Pistilla 2. debilia, flori masculo inserta 1. 2. *Loc.* Apricis. *Fl.* Jun. *Vis.* Eadem cum Pimpinella sanguisorba officinali & adstringens vulneraria.

370) QUER-

370) QUERCUS, (Eiche,) Linn. G. 1070.

* *Maſculi Flores* in Amentum laxum digeſti.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum vel quadrifidum: *lacinulis* acutis, ſæpe bifidis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* plura (ſ. 8. 10.) breviſſima. *Antheræ* magnæ, didymæ.

* *Feminei* in gemma ſeſſiles, in eadem planta cum maſculis.

CAL. *Perianthium* monophyllum, coriaceum, hemiſphæricum, ſcabrum, integerrimum, in flore vix manifeſtum.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ovatum, minimum. *Stylus* ſimplex, ſfidus: calyce longior. *Stigmata* ſimplicia, perſiſtentia.

PER. nullum.

SEM. *Nux* ovalis, cruſta coriacea univalvi, baſi derafa, affixa brevi calyci, teres, glabra.

SPEC. *Robur*, (gemeine E. Heiſter, Auguſt-Früh-Maſt- Haſel- Stein- Sommer- Roth- Loh - Eiche,) foliis deciduis oblongis ſuperne latioribus, ſinubus acutioribus, angulis obtuſis. *Loc.* Montoſis, ſilvis, *Fl.* May. *Vis.* Adſtringens. *Uſ. Glandes* ad ſaginationem ſuum, feris, meleagridibus gratæ & in annonæ defectu loco panis: *Cortex* ſuccedaneum cortic. peruviani, ad coria maceranda; *Folia* recentia ovibus pecoribus pabulum: *Gallæ* foliis innatæ ad atramentum nigrum. *Lignum* durum tenax, flexuræ patiens, tornatoribus carpentariis, architecturæ navali, militari, civili proficuum & ad ædificia, ſepimenta, ciſtas varias, dolia, ſellas, menſas, repoſitoria, volvulos agrorum, radios axis, aratra, palos, variaque inſtrumenta.

371) FAGUS, (Buche,) Linn. G. 1072.

* *Maſculi Flores* receptaculo amentaceo communi affixi.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum quinquefidum.

COR. nulla.

STAM.

STAM. *Filamenta* plura (12. circiter), longitudine calycis, ſetacea. *Antheræ* oblongæ.

* *Feminei Flores* in gemma ejusdem plantæ ſedentes.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadridentatum, erectum, acutum.

COR. nulla.

PIST. *Germen* a calyce tectum. Styli tres, ſubulati. *Stigmata* ſimplicia, reflexa.

PER. *Capſula* ſubrotunda (quæ calyx fuit), maxima, ſpinis mollibus obſita, unilocularis, quadrivalvis.

SEM. *Nuces* duæ, ovatæ, triquetræ, trivalves, acuminatæ.

OBS. Fagi *T. Flores maſculi in globum digeſti.* 3.

Caſtaneæ *T. Flores maſculi in cylindrum diſpoſiti.* 1. 2.

SPEC. 1) *Caſtanea*, (Caſtanien, Köſtenbaum,) foliis lanceolatis acuminato-ſerratis ſubtus nudis, ſilveſtris; ſativa, (Maronen,) *Loc.* Cultis & ſilvis. *Fl.* Apr. *Uſ. Glandes* eſculentæ nutrientes, ſuibus pabul. & in annonæ penuria loco panis, toſtæ ſuccedaneum coffeæ: *Cortex* adſtringens nutriens; *folia* ſtraminis loco pecorib. & hominibus.

2) *Sylvatica*, (gemeine Naſt- Rothbuche.) foliis ovatis obſolete ſerratis. *Loc.* Silvis. *Fl.* Apr. May. *Uſ.* Ad ſepes denſos, *lignum* optime calefacit hypocauſta in hyeme: ligni lamellæ flexiles vaginis enſium & corticibus librorum utiles, ad aſſeres & folles: *Cineres* officinis metallurgicis, vitriariis, ſaponariis & ad cineres clavellatos: *Cortex* & *folia* coriis parandis; *ſemina* farinoſa, oleoſa pabulum avibus ſciuris, apris, in annonæ caritate loco panis, & toſta inſtar coffeæ, preſſa oleum præbent eſculentum foetidum ad lampades, cujus foetor ſe amittit in urceis lapideis terræ per annum immiſſis.

372) JUGLANS, (Walnus,) Linn. G. 1071.

* *Maſculi Flores* in Amentum oblongum digeſti.

CAL. *Amentum commune* undique imbricato-ſparſum, cylindraceum; conſtans *ſquamis* unifloris: ſingulis ſingulæ corollæ affixis in centro exteriore, extrorſum verſis.

COR. ſexpartita, elliptica, æqualis, plana: *laciniis* erecto-concavis, pedicellatis, centro corollæ interiori & rachi inſertis.

STAM.

STAM. *Filamenta* plura (18.) breviſſima. *Antheræ* erectæ, acuminatæ, longitudine calycis.

* *Feminei Flores* absque Amento, altero vel tertio ſociati, ſeſſiles in eadem planta.

CAL. *Perianthium* quadrifidum, erectum, breviſſimum germen coronans, evaneſcens.

COR. quadripartita, acuta, erecta, calyce paulo major.

PIST. *Germen* ovale, magnum, ſub receptaculo floris. *Styli* duo, breviſſimi. *Stigmata* maxima, clavata, reflexa, ſuperne lacerata.

PER. *Drupa* ſicca, ovalis, magna, unilocularis.

SEM. *Nux* maxima, ſubrotunda, ſulcis reticulata, ſemiquadrilocularis. *Nucleo* quadrilobo, varie ſulcato.

SPEC. *Regia*, (gemeine W.) foliolis ovalibus glabris ſubſerratis ſubæqualibus; fructu maximo, tenero & fragili putamine. *Loc.* Cultis, agris. *Fl.* Jul. *Uſ.* Nux matura eſculenta oleum exhibet ad lampades.

373) CARPINUS, (Hagbuche, Spindelbaum,) Linn. G. 1073.

* *Maſculi Flores* in Amentum cylindraceum digeſti.

CAL. *Amentum commune* undique laxe imbricatum; conſt. *ſquamis* unifloris, ovatis, concavis, acutis, ciliatis, unifloris.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* (ſæpius 10.) minima. *Antheræ* didymæ, compreſſæ, apice villoſæ, bivalves.

* *Feminei Flores* in Amentum oblongum digeſti in eadem planta.

CAL. *Amentum commune* laxe imbricatum; conſtans. *Squamis* bifloris, lanceolatis, villoſis, apice reflexis, unifloris.

COR. calyciformis monophylla ſexfida, laciniis duabus majoribus.

PIST. *Germina* duo, breviſſima, ſingulis. *Styli* duo, capillares, colorati, longi. *Stigmata* ſimplicia.

PER. nullum. *Amentum* maximum evadens, ad baſin ſingulæ ſquamulæ ſemen condens.

SEM. *Nux* ovata, anguloſa.

OBS. Carpinus *T. ſemen intra baſin ſquamæ calycinæ concavæ gerit.* Oſtrya *M. ſemen intra ſquamam calycinam inflatum.* 2,

SPEC.

Spec. *Betulus*, (gemeine H. Weisheck- Rauch-Buche, Rolholz,) ſquamis ſtrobilorum planis. *Loc.* Silvis. *Uſ.* Sepibus vivis, in hortis præſertim, *Cortex* luteo-tinctorius; *lignum* album, durum tenax axibus, trochleis, rotis molendinariis, variisque inſtrumentis opificum aptum & tornatoribus ſculptoribus.

374) CORYLUS (Haſelſtaude) Linn. G. 1074.

* *Maſculi Flores* in Amentum longum digeſti.

Cal. *Amentum commune* undique imbricatum, cylindraceum, conſtans.

Squamis unifloris, baſi anguſtioribus, apice latioribus, obtuſioribus, inflexis, trifidis: *lacinula media* longitudine cum reliquis æquali, duplo vero latiore, reliquasque tegente.

Cor. nulla.

Stam. *Filam* 8. breviſſima, lateri interiori ſquamæ calycinæ adnexa. *Antheræ* ovato-oblongæ, calyce breviores, erectæ.

* *Feminei Flores* remoti a maſculis in eadem planta, ſeſſiles, gemma incluſi.

Cal. *Perianthium* diphyllum, coriaceum, margine laceratum, erectum, longitudine fructus, ſub floreſcentia præ parvitate vix manifeſtum.

Cor. nulla.

Pist. *Germen* ſubrotundum, minimum. *Styli* 2. ſetacei, calyce multum longiores, colorati. *Stigmata* ſimplicia.

Per. nullum.

Sem. *Nux* ſubovata, baſi deraſa, apice parum compreſſa, parum acuminata.

Obs. Affinitate ſumma jungitur carpino.

Spec. *Avellana*, (gemeine wilde H.) ſtipulis ovatis, obtuſis: ſativa (zahme H.) fructu vel albo majore, 1. rotundo maximo, 1. oblongo rubente, 1. nucibus in racemum congeſtis. *Loc.* Cultis, ſylvis, ſepibus. *Fl.* Febr.-Apr. *Uſ. Frutex* ambulacris, ſepibus præſtans. *Nuces* eſculentæ, uti lignum oleum exhibentes, ſunt in deliciis. *Rami* virides frumentum a corruptione præſervantes ad virgulas divinatorias, corbes carbonum, cribra, fulcra piſtorum, vincula doliorum proſunt & ad

virgas piſcatorias, ſtolones: *Carbones* a pictoribus, ſculptoribus, aurifabris ad præludia figurarum ſeliguntur. *Radix* nodoſa, undulata criſpa vaſis diu durantibus loco juglandis præſtans. *Folia* capris pabulum & *flores* apibus.

MONOECIA

Ord. IX. MONADELPHIA, (Mit verwachſenen Staubfäden.)

375) PINUS, (Fichte, Kiefern,) Linn. G. 1077

* *Maſculi Flores* in racemos diſpoſiti.

CAL. Gemmæ ſquamæ hiantes nec aliis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* plurima, connata, inferne in *columnam* erectam, apice diviſam. *Antheræ* erectæ.

* *Feminei Flores*, in eadem planta.

CAL. *Conus communis* ſubovatus, conſtans. *Squamis* bifloris, oblongis, imbricatis, perſiſtentibus, rigidis.

COR. nulla.

PIST. *Germen* minimum. *Stylus* ſubulatus. *Stigma* ſimplex.

PER. nullum. *Conus* calycinus, antea clauſus, nunc connivens.

SEM. *Nux* aucta ala membranacea, ſemine majore, ſquama coni minore, oblonga, hinc recta, inde gibba.

SPEC. 1) *Sylveſtris*, (wilde F. K. Kienbaum, Forchen, Ziegen- Schleis- Spahn- Fürenholz) foliis geminis, primordialibus ſolitariis glabris. *Loc.* Montoſis, ſilvis, ſteriliſſimis, ſicciſſimis ætatem 400 annorum attingit. *Fl.* Jul. *Vis* Turionum reſinoſarum odoratarum ſanguinem purificans, diuretica, diaphoretica. *Uſ.* Arboris ad ſepes durabiles ſemper virentes. *Cortex* interior pauperibus loco panis, ſuibus & equis in Norwegia cum avena mixtus pabulum, exterior loco ſuberis in doliis & retibus. *Lignum* durabile, leve, fiſſile, fabris lignariis ad ædificia, aſſeres, lectos, menſas, ciſtas, variaque ſupellectilia, ad arcus, carinas traharum, ad ſoleas (ſky,) Lapponibus; ad exu-

exuſtiones in conclavibus. *Laminæ* tenuiſſimæ ruſticorum candelæ, reticulatim implicatæ, pro tapetis & cancellis inſerviunt, & *ſtolones* tenues longi, ad ſuſtentacula humuli; arboris hujus *reſina*, therebinthinæ fere conveniens, (Theer,) colophonium, pix nigra, pigmentum (Kienrus) & cineres clavellati varie proſunt in œconomia.

2) *Picea*, (Weistanne, edle Silberdanne,) foliis ſolitariis apice emarginatis, baſi diſtinctis. *Loc.* Silvis. *Fl.* May. apibus. *Uſ.* Idem cum ſequenti.

3) *Abies*, (gemeine Roth- Schwarz- Pechtanne, Kiefe, Fichte, Grämenholz,) foliis ſolitariis, ſubulatis, mucronatis, lævibus, bifariam verſis, apice acuminatis, baſi diſtinctis. *Loc.* Humidiuſculis, ſilvis. *Fl.* May. *Vis.* Terebinthinæ (ſucci huius arboris,) diuretica, balſamica, pellens. *Uſ.* Topiariis ad ſepes ſemper virentes. *Folia* ſpiritum ardentem & cineres clavellatos edentes capris pabul. Pollen amentorum apibus inſervit. *Lignum* leve, humiditatem abſorbens, citius corrumpens ad inſtrumenta muſica, naviculas, aſſeres, ſepimenta, tabulas, malos, tigna, &c. ſcriniariis, tornatoribus. *Carbones* metallurgis, *rami* ad vincula doliorum proficui, & reſina ſebo mixta ad candelas.

MONOECIA

Ord. X. SYNGENESIA. (Mit verwachſenen Staubbeuteln.)

376) CUCURBITA, (Kürbis,) Linn. G. 1091.

* *Maſculi Flores.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, margine terminato dentibus quinque, ſubulatis.

COR. quinquefariam diviſa, calyci adnata, campanulata: *laciniis* venoſo rugoſis.

Nectarium Glandula in centro floris concava, triangularis.

STAM. *Filamenta* tria, conniventia, ſuperne connexa, inferne diſtincta, calyci adnata. *Antheræ* reptantes ſurſum deorſumque, lineares.

* *Feminei Flores.*

CAL. *Perianthium* ut in mare, ſuperum, deciduum.

Cor. ut in mare.
Nectarifera glandula concava, patens.
Stam. *Margo* cingens, in tres cuſpides breviſſimo deſinens.
Pist. *Germen* magnum, infra receptaculum floris *Stylus* conicus, apice, trifidus. *Stigma* unicum margine craſſo, convexo; ſurſum deorſumque re pens, trifidum.
Per. *Pomum* triloculare: *loculis* membranaceis, moll bus, diſtinctis.
Sem. plurima, compreſſa, tumida, obtuſa, gemin ordine poſita.
Obs. Cucurbita *T. feminibus emarginatis.*
Pepo *T. feminibus margine integro tumido cinctis.*
Spec. 1) *Lagenaria*, (Flaſchen K.) foliis cordati denticulatis tomentoſis, baſi ſubtus biglandulo ſis, pomis lignoſis, ſeminibus obſolete bicor nibus. *Loc.* Americæ riguis & Europæ hortis *Fl.* Alb. Jul. apibus. *Uſ.* Fructus exſiccati lage narii, ad lagenas, cochlearia, infundibula, pi leos, variaque alia. Semen oleum exhibet pro ficuum, cortex junior nondum amarus eſculentus
2) *Pepo*, (gemeine K. Peponen, Pfebe.) foliis lo batis, pomis levibus, ſeminum margine tumido *Loc.* Cultis, vineis. *Fl.* Flavus Jul. apibus. *Uſ* Fructus cum medulla temperante in juſculis, & cum lacte in pulmentis eſculentus: oleum dulc ſemen refrigerans exhibet.
3) *Verrucoſa*, (warzige K.) fol. lobatis, pomi nodoſo-verrucoſis, cortice lignoſo duro. *Loc* Cultis, Europ. hortis. *Fl.* Jul. *Uſ.* Corticis a lagenas: fructus junior eſculentus.
4) *Citrullus*, (Waſſer-Melone.) foliis multipar titis, ſeminum margine baſi dilatato. *Loc.* Cali dis, cultis Ungariæ, hortis Germaniæ. *Fl.* Jul *Uſ.* Fructus refrigerans cum aromatibus, eſcu lentus, eſt in deliciis.

377) CUCUMIS, (Gurcke,) Linn. G. 1092.

* *Maſculi Flores.*
Cal. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, mar gine terminato dentibus 5. ſubulatis.
Cor. quinquepartita, calyci adnata, campanulata, *la ciniis* ovatis, venoſo-rugoſis.

Sta

STAM. *Filamenta* 3. breviſſima, calyci inſerta, conniventia, quorum *duo* apice bifida. *Antheræ* ſunt lineæ ſurſum & deorſum repentes, extrorſum adnatæ. *Receptaculum* trigonum, truncatum, in centro floris.

* *Feminei Flores* in eadem planta maſculis.
CAL. *Perianthium* ut in maſculis, ſuperum deciduum.
COR. ut in maſculis.
STAM. nulla. *Filamenta* tria, acuminata, minima, ſine antheris.
PIST. *Germen* inferum, magnum. *Stylus* cylindraceus, breviſſimus. *Stigmata* tria, craſſa, gibba, bipartita, extrorſum verſa.
PER. *Pomum* triloculare: *loculamentis* membranaceis, mollibus, ſeparatis.
SEM. numeroſa, ovato-acuta, compreſſa, gemino ordine poſita.

SPEC. 1) *Melo*, (Melone.) foliorum angulis rotundatis, pomis toruloſis. *Loc.* Cultis. *Fl.* Jul. *Uſ.* Fructus ſuaveolens, refrigerans, eſculentus in deliciis eſt.

2) *Sativus*, (zahme G. Cucumer,) foliorum angulis rectis, pomis ovato-oblongis ſcabris. *Loc.* Cultis, hortis. *Fl.* Jul. apibus. *Uſ.* Fructus refrigerans ad acetaria. *Semen* oleum continet proficuum.

378) BRYONIA, (Zaunrübe.) Linn. G. 1093.

* *Maſculi Flores.*
CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, quinquedentatum: *denticulis* ſubulatis.
COR. quinquepartita, campanulata, calyci adnata: *laciniis* ovatis.
STAM. *Filamenta* tria, breviſſima. *Antheræ* quinque, quarum *duæ* in ſingulo filamento connatæ, *unica* in tertio filamento.

* *Feminei* in eadem planta cum maſculis.
CAL. *Perianthium* ut in maſculis, germini inſidens, deciduum.
COR. ut in maſculis.
PIST. *Germen* ſub receptaculo floris. *Stylus* trifidus, longitudine corollæ patentis. *Stigmata* emarginata, patula.

PER. *Bacca* ovalis, lævis.
SEM. nonnulla, cortici adnata, fere ovata.
SPEC. *Alba*, (weiſſe Z. Zaunreben, Stickwurz, Handkürbſen, weiſſer Enzian,) foliis palmatis utrinque calloſo-ſcabris, baccis nigris: *Loc.* Ad pagos & ſepes. *Fl.* Jun. Jul. *Vis.* Radic. purgans, pellens, antiverminoſa, diuretica, externe reſolvens.

Claſſis XXII.

DIOECIA,

(Mit ganz getrenten Geſchlechtern,)

Ord. II. DIANDRIA, (Mit 2 Staubfäden.)

379) SALIX (Weyde, Felbinger,) L. G. 1098.

* *Mas.*
CAL. *Amentum commune* oblongum, undique imbricatum (involucro e gemma inſtructum): conſtans *Squamis* unifloris, oblongis, planis, patentibus.
COR. *Petala* nulla.
Nectarium Glandula cylindracea, minima, truncata, mellifera, in centro floris.
STAM. *Filamenta* duo, recta, filiformia, calyce longiora. *Antheræ* didymæ, quadriloculares.

* *Femina.*
CAL. *Amentum* ut in mare.
Squamæ ut in mare.
COR. nulla.
PIST. *Germen* ovato-attenuatum in *Stylum* vix diſtinctum, ſquamis calycinis paulo longiorem. *Stigmata* duo, bifida, erecta.
PER. *Capſula* ovato-ſubulata, unilocularis, bivalvis: *valvulis* revolutis.
SEM. numeroſa, ovata, minima, coronata *Pappo* ſimplici, hirſuto.
OBS. *Species dantur, cujus mares ſtaminibus 3. ſeu 5. inæqualis longitudinis inſtruuntur, uti 2. 3. 4. 5. Hermaphroditica* ſola nobis nota floribus hermaphroditis diandris.
Salicis individua mutare ſexum, alteroque anno maſculos,

ſculos, alteroque femineos flores producere, figmentum eſt.

Spec. 1) *Triandra*, (W. mit 3 Staubfäden,) foliis ſerratis, glabris, floribus triandris. *Loc.* Aquoſis, rivis. *Fl.* May. apibus gratiſſimi. *Vis. Corticis* adſtringens, refrigerans, ſuccedaneum cortic. Cinchonæ ſ. Peruviani. *Uſ.* Topiariis ad ambulacra ſepesque vivas. *Lignum* ſubito creſcens tenax prohibet ne adiacentem terram exedat ripa; *Pappus* brevis ſed copioſus ſuccedaneum bombycis.

2) *Arenaria*, (kleine rauhe Bruch- Sand- W.) foliis integris ovatis acutis, ſupra ſubvilloſis, ſubtus tomentoſis. *Loc.* Arenoſis paludibus. *Fl.* May. apibus.

3) *Viminalis*, (Band- Korb- Haar- Fiſcher- Seil- W.) foliis ſubintegerrimis, lanceolato-linearibus, longiſſimis, acutis, ſubtus ſericeis, ramis virgatis. *Loc.* Aquoſis, ripis, ad pagos. *Fl.* Apr. May. *Uſ.* Ambulacris, ſepibus vivis, *lignum* ad combuſtiones in conclavibus, corbibus curruum aliisque & ſepibus colligendis: *Virgæ* tenaces, folia bob. capr. ovib. equis pabulum.

4) *Alba*, (weiſſe W. Felben.) fol. lanceolatis acuminatis, ſerratis utrinque pubeſcentibus, ſerraturis infimis glanduloſis. *Loc.* Aquoſis, ad pagos. *Fl.* Mart. Apr. apibus. *Uſ.* Ambulacris, ſepibus. *Lignum* leve & *Virgæ* ad capiſteria, arculas, thecas, corbes, perticas, clathra, ſtipides: loco Cotis ad acuendos & poliendos cultros menſarios.

DIOECIA

Ord. IV. TETRANDRIA, (Mit 4 Staubf.)

380) VISCUM, (Miſtel,) Linn. G. 1105.

* *Mas.*

Cal. *Perianthium* quadripartitum: *foliolis* ovatis, æqualibus.

Cor. nulla.

Stam. quatuor. *Filamenta* nulla. *Antheræ* oblongæ, acuminatæ, ſingulæ ſingulo foliolo calycino adnatæ.

* *Femina* Mari ſæpius oppoſita.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: *Foliolis* ovatis, parvis, ſeſſilibus, deciduis, germini inſidentibus.

COR. nulla.

PIST. *Germen* oblongum, tetragonum, margine obſolete quadrifido coronatum, ſub receptaculo floris. *Stylus* nullus. *Stigma* obtuſum, vix emarginatum.

PER. *Bacca* globoſa, unilocularis, lævis.

SEM. unicum, obverſe cordatum, compreſſum, obtuſum, carnoſum.

SPEC. *Album*, (weiſſer M. Ginſter, Kniſter, Marentacken.) foliis lanceolatis, obtuſis, caule dichotomo, ſpicis axillaribus. *Loc.* Arboribus paraſitica. *Fl.* Mart. *Vis.* Inviſcans, lubricans, emolliens, diſcutiens. *Uſ.* E baccis, oleo coctis, gluten ad aucupium præparatur, & ne aquæ pluvioſa noceat therebinthina additur.

DIOECIA.

Ord. V. PENTANDRA, (Mit 5 Staubf.)

381) SPINACIA, (Spinat, Birſch,) L. G. 1112.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: *laciniis* concavis, oblongis, obtuſis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, calyce longiora. *Antheræ* oblongæ, didymæ.

* *Femina.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadrifidum, acutum: *laciniis* duabus oppoſitis minimis, perſiſtens.

COR. nulla.

PIST. *Germen* rotundo-compreſſum. *Styli* quatuor, capillares. *Stigmata* ſimplicia.

PER. nullum. *Calyx* coaleſcit, induratur.

SEM. unicum, ſubrotundum, tectum.

OBS. *Fructus nunc rotundus, nunc bicornis, nunc quadricornis eſt.*

SPEC *Oleracea*, (Kohlartiger S.) fructibus ſeſſilibus, ſemine ſpinoſo, Lapathum hortenſe ſemine non ſpinoſo. *Loc.* Cultis, hortis Eur. *Vis.* Diluens, humectans, purgans. *Uſ.* Foliorum ad olera vernalia.

380) CAN-

382) CANNABIS, (Hanf,) Linn. G. 1115.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: *foliolis* oblongis, acuminato-obtusis, concavis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Antheræ* oblongæ, tetragonæ.

* *Femina.*

CAL. *Perianth.* monophyllum, oblongum, acuminatum, latere altero longitudinaliter dehiſcens, perſiſtens.

COR. nulla.

PIST. *Germen* minimum. *Styli* duo, ſubulati, longi. *Stigmata* acuta.

PER. minimum. *Calyx* arcte clauſus.

SEM. *Nux* globoſo-depreſſa, bivalvis.

SPEC. *Sativa*, (zahmer H.) foliis digitatis mas & femina in diverſo thalamo. *Loc.* India. & Eur. cultis. *Fl.* Aug. odoratus. *Vis.* Narcotica, anodyna, pellens. *Uſ. Corticis* ad linteamina varia ſubtilia & craſſa, ad funes, veſtimenta; *ſemen*, oleum anodynum exhibens, avibus, gallinis pabulum.

383) HUMULUS, (Hopfen,) L.G. 1116.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: *foliolis* oblongis, concavis, obtuſis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, breviſſima. *Antheræ* oblongæ.

* *Femina.*

CAL. *Involucrum univerſale* quadrifidum, acutum: *partiale* tetraphyllum, ovatum, octiflorum, cujus ſinguli flores.

Perianthium monophyllum, ovatum, maximum, extrorſum hinc planum, baſi connivens.

COR. nulla.

PIST. *Germen* minimum. *Styli* duo, ſubulati, reflexo-patuli. *Stigmata* acuta.

PER. nullum. *Calyx* baſi ſemen includens.

SEM. ſubrotundum, tunica obtectum.

SPEC.

Spec. *Lupulus*, (männl. H. Neſſel-Femel- tauber- wilder- H.) femina weibl. H. Weiden- Wald- Wieſen- Buſch- Bruch - H.) *Loc.* Cultis, ſepibus, ad domos perticis. *Fl.* Graveolens Jun. Jul. *Vis. Radic.* aperiens, ſudorifera: *folior.* tonica, anodyna, narcotica. *Uſ.* Topiariis ad ambulacra viva; *Turiones* eſculentæ primo vere loco aſparagorum. *Coni* ſ. ſummitates folioſæ exſiccatæ præſervant cereviſiam ab aceſcentia. Caules, aqua macerati, in filamenta uti cannabis tranſeunt, ramuli bob. ovibus pabulum.

DIOECIA.

Ord. VII. OCTANDRA, (Mit 8 Staubf.)

384) POPULUS, (Eſpe, Aſpe,) Linn. G. 1123.

* *Mas.*

Cal. *Amentum commune* oblongum, laxe imbricatum cylindraceum, conſtans.
Squamis unifloris, oblongis, planis, margine laceris.

Cor. *Petala* nulla.
Nectarium monophyllum, inferne turbinatum, tubulatum, ſuperne oblique in ovatum limbum terminatum.

Stam. *Filamenta* octo, omnium breviſſima. *Antheræ* tetragonæ, magnæ.

* *Femina.*

Cal. *Amentum* ut in mare. *Squamæ* ut in mare,

Cor. *Petala* nulla. *Nectaria* ut in mare.

Pist. *Germen* ovato-acuminatum. *Stylus* vix manifeſtus. *Stigma* quadrifidum.

Per. *Capſula* ovata, bilocularis, bivalvis: *valvulis* reflexis.

Sem. numeroſa, ovata, pappo capillari volatilia.

Spec. 1) *Alba* (weiſſe E. weiſſer Pappel-Baum, Weide, Allerbaum,) foliis ſubrotundis dentato-angulatis, ſubtus tomentoſis. *Loc.* Calidis Eur. *Fl.* Mart. apibus. *Uſ.* Luci præcipui ex hac arbore cito creſcente nimiumque ſe multiplicante: *folia* bob. capr. ovib. equis pabul. *Corticis* fumus viridis gryllos pellit: *lignum* leve, album, glabrum molle ad tegendos domos, naves calceos,

ceos, ſoleas, ad clitellas, vaſa lactea, lacus, amphoras, in cellis ad trabes, & ſepimenta, in foco cito comburens lignum minus calefacit. Pappus, ſemina includens, ſuccedaneum bombycis.

2) *Tremula*, (Zitter Pappel E. A. Beber-Flatter-Aſpe,) foliis ſubrotundis dentato-angulatis utrinque glabris, involutis, baſi interne glandula duplici. *Loc.* Silvis. *Fl.* May. apibus. *Uſ.* Ad ambulacra in hortis. *Folia* dulcia capris, ovib. pabulum & feris ſuavia. *Rami* juniores cervis capreolis pab. *lignum* leve, ſpongioſum tornatoribus, & ad calceos, calopodia, imagires.

3) *Nigra*, (ſchwarze E. Pappelbaum A.) fol. deltoidibus, acuminatis, ſerratis, involutis absque glandulis ad baſin. *Loc.* Silvis. *Fl.* May. apibus. *Uſ. Folia* bob. capr. ovib. equis pabul. & feris grata. *Medulla* ad claudendas lagenas vitreas; *Lignum* mox corrumpens, Ebeno ſimile, fabris lignariis, tignariis ad manubria variaque utenſilia. *Lanugo* ſeminum ſ. pappus chartis præparandis, pileis, telis, ellychniis.

DIOECIA.

Ord. VIII. ENNEANDRIA, (Mit 9 St.)

385) MERCURIALIS, (Bingelkraut,) L.G. 1125.

* *Mas.*

CAL. *Perianthium* tripartitum: *laciniis* ovato-lanceolatis, concavis, patentibus.

COR. nulla: nisi Calycem velis,

STAM. *Filamenta* 9. ſ. 12. capillaria, recta, longitudine calycis. *Antheræ* globoſæ, didymæ.

* *Femina.*

CAL. *Perianthium* ut in mare.

COR. nulla.

Nectaria: Acumina 2. ſubulata, ad ſingulum latus germinis ſingula, ſulco germinis impreſſa.

PIST. *Germen* ſubrotundum, compreſſum, latere utrinque ſulco exaratum, hiſpidum. *Styli* duo, reflexi, cornuti, hiſpidi. *Stigmata* acuta, reflexa.

PER. *Capſula* ſubrotunda, ſcrotiformis, didyma, bilocularis. SEM. ſolitaria, ſubrotunda.

SPEC.

Spec. 1) *Perrennis*, (beſtändiges B.) caule ſimpliciſſimo, foliis ſcabris. *Loc.* Montoſis, nemoribus. *Fl.* May. *Vis.* Suſpecta, vomitoria, purgans. *Uſ.* Capr. ovibus folia pabulum.

2) *Annua*, (jähriges B.) caule brachiato, foliis glabris, floribus ſpicatis. *Loc.* Umbroſis, ſilvis, hortis ſponte. *Fl.* May. *Vis.* Emolliens, leniter purgans, repellens, cosmetica.

DIOECIA.

Ord. XII. MONADELPHIA, (Verwachſene Staubf. in einem Trop.)

386) JUNIPERUS, (Wachholder) L. G. 1134.

* *Mas.*

Cal. *Amentum* conicum, conſtans rachi communi, cui tres flores oppoſiti, triplici oppoſitione apponuntur, terminante decimo amentum: ſingulus flos pro baſi agnoſcit.

Squamam latam brevem, incumbentem pedicello columnæ affixam.

Cor. nulla.

Stam. *Filamenta* (*in floſculo terminali*) tria, ſubulata, inferne coalita in unum corpus, (*in floſculis lateralibus* vix manifeſta.) *Antheræ* 3. diſtinctæ *in floſculo terminali*, at ſquamæ calycinæ in *lateralibus* adnatæ.

* *Femina.*

Cal. *Perianthium* tripartitum, minimum, germini adnatum, perſiſtens.

Cor. *Petala* tria, perſiſtentia, rigida, acuta.

Pist. *Germen* inferum. *Styli* tres, ſimplices. *Stigmata* ſimplicia.

Per. *Bacca* carnoſa, ſubrotunda, inferne parte tribus oppoſitis tuberculis (e calyce accreto) iisque obſoletis notata, apice tribus denticulis (antea petal.) umbilicata.

Sem. *Offícula* 3. hinc convexa, inde angulata, oblonga.

Spec. *Communis*, (gemeiner W. Weckholder, Kranwebbaum, Feuerb. Jachandelb. Kaddigb. Feldcypreſſe, Dürenſtaude,) foliis ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus. *Loc.* Frigidis, ſilvis. *Fl.* Febr.-May. *Vis.* Ligni & radic. pel-

pellens, carminativa, diuretica, calefaciens, mundificans, alexipharmica, aromatica. *Uſ.* Topiariis ad ſepes, ſepimenta, *baccæ* turdis gratæ exhibent roob & infuſum aquoſum, vinoſum, ſuave, & oleum aromaticum. *Rami* ſuaveolentes ad ſuffimigia antiputredinoſa, lignum ſuaveol. tornatoribus, & ad gratos cantharos: *Cortex* ad funes idoneus, carbones diu ignem alunt.

Claſſis XXIII.

POLYGAMIA,

(Mit vermengten Geſchlechtern.)

Ord. I. MONOECIA, (Mit halbgetr. Geſchl.)

387) PARIETARIA, (Glaskraut, St. Peterskr.) Linn. G. 1152.

* *Hermaphroditi Flores* duo continentur *Involucro* plano, hexaphyllo; *foliolis* duobus oppoſitis & exterioribus majoribus.

CAL. *Perianth.* monophyllum, quadrifidum, planum, obtuſum, magnitudine involucri dimidiati.

COR. nulla: niſi Calycem dicas.

STAM. *Filam.* 4. ſubulata, perianthio florente longiora, illudque expandentia, perſiſtentia. *Antheræ* didymæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, coloratus. *Stigma* penicilliforme, capitatum.

PER. nullum. *Perianthium* elongatum, majus, campanulatum, ore laciniis conniventibus clauſo.

SEM. unicum, ovatum.

** *Femineus Flos* unus inter hermaphroditos ambos intra involucrum.

CAL. ut hermaphroditi. COR. nulla.

PIST. ut hermaphroditi.

PER. nullum. *Perianthium* tenue, involvens fructum.

SEM. ut in hermaphrodito.

SPEC. *Officinalis*, (gewöhnliches G.) foliis lanceolato-ovatis, alternis. *Loc.* Ruderatis, hortis ſponte. *Fl.* May. Jun. *Vis.* Diuretica, emolliens, leniens. *Uſ.* Herbæ aſperæ ad vaſa metallica vitraque mundanda.

386) ATRI-

388) ATRIPLEX, (Melde) Linn. G. 1153.

* *Hermaphroditus Flos.*

CAL. *Perianth.* pentaphyllum, concavum, perſiſtens: *laciniis* ovatis, concavis, margine membranaceis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* 5. ſubulata, calycis foliis oppoſita, iisque longiora. *Antheræ* ſubrotundæ, didymæ

PIST. *Germen* orbiculatum. *Stylus* bipartitus, brevis. *Stigmata* reflexa.

PER. nullum. *Calyx* clauſus, pentagonus, 5. angularis, *angulis* compreſſis, deciduis.

SEM. unicum, orbiculare, depreſſum.

* *Femineus Flos* in eadem planta.

CAL. *Perianth.* diphyllum: *foliolis* planis, erectis, ovatis, acutis, magnis, compreſſis.

COR. nulla.

PIST. *Germen* compreſſum. *Stylus* bipartitus. *Stigmata* reflexa, acuta.

PER. nullum. *Calycis* valvæ maximæ, cordatæ, inter ſe includentes ſemen.

SEM. unicum, orbiculatum, compreſſum.

OBS. *Atriplex absque flore femineo eſſet* Chenopodium *& Chenopodium cum flore ejusmodi femineo eſſet* Atriplex. *Summa ergo affinitas generum* Chenopodii, & Atriplicis.

SPEC. *Hortenſis*, (zahme Garten M.) caule erecto herbaceo, foliis triangularibus, alba ſ. pallide-virens, ſ. rubra. *Loc.* Cultis, hortis. *Fl.* Jun. *Uſ.* Foliorum ad olera loco ſpinaciæ: bob. capr. ovib. ſuibus pabulum.

389) HOLCUS, (Honiggras,) Linn. G. 1046.

* *Hermaphroditus Flos.*

CAL. *Gluma* ſubbiflora, bivalvis, rigida, mutica: *Valvula exteriore* ovata, concava, magna, amplexante *interiorem* oblongam, lateribus convolutam.

COR. *Gluma* bivalvis, tenella, villoſa, calyce minor: *Valvula exteriore* ſæpe cum *Ariſta* rigida, calyceque longiore: *interiore* vero mutica, minima.

STAM. *Filamenta* 3. capillaria. *Antheræ* oblongæ.

PIST. *Germen* turbinatum. *Styli* duo, capillares. *Stigmata* penicilliformia.

PER.

PER. nullum. *Corolla* involvit, tegit, adnascitur semini.
SEM. solitarium, ovatum, tectum.

* *Masculus Flos* femineo minor.
CAL. *Gluma* bivalvis: *Valvulis* ovato-lanceolatis, convolutis, muticis, acutis.
COR. nulla; nisi Calycem dicas.
STAM. *Filamenta* tria, capillaria. *Antheræ* oblongæ.
SPEC. *Lanatus*, (wolliges H. Pferd-Darr-Gras.) glumis bifloris villosis, hermaphrodito mutico, masculo arista recurva, foliis pubescentibus, panicula contracta. *Loc.* Pascuis arenosis, ad aquas. *Fl.* Jun. Jul. *Us.* Pecoribus pabulum.

390) VALANTIA, (Vailantien.) L. G. 1151.

* *Hermaphroditus Flos* solitarius.
CAL. vix ullus, cujus loco Germen.
COR. monopetala, plana, quadripartita: *laciniis* ovatis, acutis.
STAM. *Filam.* 4. longitudine corollæ. *Antheræ* parvæ.
PIST. *Germen* magnum, infra receptaculum floris. *Stylus* longitudine staminum, semibifidus. *Stigmata* capitata.
PER. *coriaceum*, compressum, reflexum.
SEM. unicum, globosum.

* *Masculus Flos* hermaphrodito utrinque solitarius adsistens.
CAL. vix ullus, cujus loco Germen.
COR. monopetala, plana, tripartita aut quadripartita: *laciniis* ovatis, acutis.
STAM. *Filamenta* totidem, longitudine corollæ. *Antheræ* parvæ.
PIST. *Germen* parvum, infra receptaculum. *Stylus* & *Stigmata* obsoleta, vixque notabilia.
PER. abortit: at *Rudimentum* tenue oblongum adhæret lateri hermaphroditi.
SEM. nullum.
OBS. Flores masculi trifidi in V. *Murali* & *Aparine*, quadrifidi in *Articulata* & *Cruciata*.
SPEC. 1) *Aparine*, (vaillantisches Klebkraut,) floribus masculis trifidis pedicellatis, hermaphroditici pedunculo insidentibus: semine lævi. *Loc.* Germania inter segetes. *Fl.* Jun.

2) *Cru-*

2) *Cruciata*, (Creuzförmige Vaill. Pf.) Florib. masculis quadrifidis, pedunculis diphyllis, foliis quaternis, floſculis in alis confertis. *Loc.* Sepibus. *Fl.* May. Jun. *Vis.* Herbæ vulneraria, radix rubro-tinctoria oſſa.

391) ACER, (Maſsholder) Linn. G. 1055.

* *Hermaphroditi.*

CAL. *Perianth.* monophyllum, 5fidum acutum, coloratum, baſi plana & integra, perſiſtens.

COR. Petala 5. ovata, extrorſum latiora, obtuſa, calyce vix majora, patentia.

STAM. *Filam.* 8. ſubulata, brevia. *Antheræ* ſimplices, *Pollen* cruciforme.

PIST. *Germen* compreſſum, immerſum *Receptaculo* conuexo, perforato, magno. *Stylus* filiformis, per dies altior excreſcens. *Stigmata* 2. acuminata, tenuia, reflexa.

PER. *Capſulæ* numero ſtigmatum, baſi coalitæ, ſubrotundæ, compreſſæ, ala membranacea maxima ſingulæ terminatæ. SEM. ſolitaria, ſubrotunda.

* *Maſculi Flores.*

CAL. ut in Hermaphrodito.

COR. ut in Hermaphrodito.

STAM. ut in Hermaphrodito.

PIST. *Germen* nullum. *Stylus* nullus. *Stigma* biſidum.

OBS. Ad primam explicationem floris *Stigma* modo apparet, deinde aliquod poſt dies *Stylus*.

A. pſeudo-Platano Corolla vix a calyce diſtincta, & ſtamina longa. A. rubrum dioicum eſt.

Flores in eadem umbella Hermaphroditi, ſæpe duplicis generis: inferiores Hermaphroditi feminei, quorum antheræ non dehiſcunt, ſed piſtillum mox in fructum excreſcit; ſuperiores Hermaphroditi maſculi, quorum antheræ pollen pluunt; piſtilla vero non accreſcunt, ſed decidunt.

SPEC. 1) Pſeudo platanus, (gemeiner groſſer weiſſer unächter Ahorn, groſſer M. Waldeſche, Spillenholz, Arle, Maſern,) foliis quinquelobis inæqualiter ſerratis, floribus racemoſis. *Loc.* Montanis, ſilvis. *Fl.* May. *Uſ.* Ad ſepes, *lignum* leve album, durum ſcriniariis, tornatoribus, ad diſcos, cochlearia, fuſos, cantharos, inſtrumenta muſica, menſas, ſellas variaque uten-

utenſilia. *Folia* ſtraminis loco, & pecorib. pabul. *ſuccum*, ex arbore exſudantem, ſacharum exhibentem Angli loco aquæ cereviſiæ addunt.

2) *Platanoides*, (M. mit Ahornblättern, ſpiziger Bryahorn, deutſcher Zucker A. Minabern, Binbaum, *L*einöhre, breit Wein-Blat,) fol. ſlobis acuminatis palmatis, acute dentatis glabris, florib. corollatis dichotomo-corymboſis. *Loc.* Montoſis, ſilvis. *Fl.* May. apibus grati. *Uſ.* Idem cum A. præcedenti: ad ambulacra umbroſa, & ſepes.

3) *Campeſtre*, (gemeiner Feld M. kleiner Milch-Ahorn, Mavellen, Weislebern, Eplern, Apeldören,) fol. lobatis obtuſis emarginatis, tripartito-palmatis, laciniis utrinque emarginatis, obtuſis, cortice ſulcato. *Loc.* Aquoſis, ſilvis. *Fl.* May. *Uſ.* Cum prioribus ſpeciebus idem

POLYGAMIA. Ord. II. DIOECIA.

(Mit ganz getrennten Geſchlechtern.)

392) FRAXINUS, (Eſche,) Linn. G. 1160.

* *Hermaphroditus.*

CAL. nullus: aut *Perianthium* monophyllum, quadripartitum, erectum, acutum, parvum.

COR. nulla: aut *Petala* quatuor, linearia, longa, acuta, erecta.

STAM. *Filamenta* duo, erecta, corolla longe breviora. *Antheræ* erectæ, oblongæ, quadriſulcæ.

PIST. *Germen* ovatum, compreſſum. *Stylus* cylindraceus, erectus. *Stigma* craſſiuſculum, bifidum.

PER. nullum præter Cruſtam ſeminis.

SEM. lanceolatum, compreſſo-membranaceum, uniloculare.

* *Femina.*

CAL. ut in hermaphrodito. COR. ut in hermaphrodito.

PIST. ut in hermaphrodito. PER. ut in hermaphrodito.

SEM. ut in hermaphrodito.

OBS. F. Ornus *P. corolla & calyce gaudens, ſemper hermaphrodita pura eſt, absque mare.*

F. excelſior femina ſæpe interſparſos gerens flores hermaphroditos, & hermaphroditus femineos, hæc corollæ & calyce deſtituitur.

SPEC. *Excelſior*, (gemeine hohe Eſchern, Aſchbaum,

baum, Wundholzbaum,) foliolis ſerratis, floribus apetalis, nudis. *Loc.* Sepibus. *Fl.* Mart. Apr. *Uſ. Frondes* ovibus equis, & amenta apibus inſerviunt, *radix* ſerpens in littoribus injurias aquæ arcet: cortex loco corticis peruviani: *lignum* celeriter creſcens, tenax, album, durum, obediens ſectioni, ad varia utenſilia ſcriniariis, tornatoribus, fabris lignariis, ad rotas, axes, crates, ephippia, rhedas, veſicula, canthos, pocula, aratra, ſcalas, menſas, doliorum circulos, ad ædificia, inſtrumenta phyſica, & opificum, ad manubria, cochlearia, capita pectinum pratorum, vectes curruum.

Claſſis XXIV.

CRYPTOGAMIA.

(Mit unkenntlichen Geſchlechtern.)

CRYPTOGAMIA continet vegetabilia, quorum fructificationes oculis noſtris ſe ſubtrahunt, & ſtructura ab aliis diverſa gaudent. *Linnæus.*

Ordines hæc Claſſis conſtituit.

1) *Filices* Dorſiferas, Epiphylloſpermas ſ. Capillares vulgo includit.

Calyx, ſquama e folio enata, altero latere dehiſcens, ſub qua globuli pedunculati. Globulus annulo elaſtico cinctus, qui elaſtico rumpitur, effundens pulverem.

Cum hic nulla nobis nota certitudo dividendi plantas a fructificatione conſtet, eas a ſitu ſub ſuis operculis in ordinem digeſſimus. Fructificatio harum etiamnum obſcura eſt, qui vivas adeunt Trichomanis ſpecies, in hac attente inquirant.

2) *Muſcos* diviſimus ſecundum Antheras calyptratas aut non calyptratas, in eodem vel diſtincto vegetabili, cum floſculis femineis aggregatis aut ſolitariis, præcipue principiis Dillenii innixi, qui hanc familiam abſolvit. Semina muſcorum nuda ſunt corcula absque cotyledonibus, aut tunica, cum ſiccati reviviſcant. confer. Amoenit. acad. 207. v. 2. p. 284.

Antheræ quas nominamus, forte potius *capſulæ* dicendæ, & earum Pollen vera *ſemina*, cum in Buxbaumia

mia aliisque vidimus intra opercula veras *Antheras* polliniferas e filamento suo dependentes, apice dehiscentes, pollen dimittere in cilia, tanquam in *Pistilla*.

3) *Algæ* etiamnum obscure quoad fructificationem latent, præter eas, quæ *Michelio* debentur.

4) *Fungos* ex doctrina *Dilleniana* potius dividere quam ex *Micheliana*, nobis visum fuit, quum illius omnibus pateat, hujus vero solum, & vix lynceis; pulchra tamen annisus est *Michelius* in hac familia, ut & in Muscis ac Algis, cui soli debetur notitia harum fructificationum, quatenus etiamnum innotuit.

Classis 24ta tam diversas obtinet formas, quam ut in angustos tabulæ cancellos cogi possit; harum loco succinctas definitiones *Ordinum*, qui in systematibus aliis sunt totidem *Classes*, ex Celeberr. Virorum D. D. *Gleditsch* & *Scopoli* scriptis exaratas, subjungere haud a re nostra alienum fore duco.

I. *Filices*; his Fructificatio est cryptostemonis (i. e. occulta, obscura & sæpius dubia; a fructificatione phænostemoni seu aperta tamen semper quam maxime distincta), in amentis: *Equisetum Arvense* (equiset. off.); in frondibus, *Asplenium scolopendrium* (scolopendria off.) *Asplenium ruta muraria*, (ruta mur. off.) explicatis aut contractis; in spicis distinctis: *ophioglossum vulgatum*, (oph. off.); in foliis radicalibus, vesiculis & peltis, (GLEDITSCH systema plant. Berol. 1764.)

Frondes his ante explicationem deorsum spiraliter involutæ. Flores non manifesti, in dorso foliorum propriis in sulcis collocati. Capsula membranacea, annulo cincta, dehiscens, effundens semen unum aut plura. (SCOPOLI Flor. Carniolica. Viennæ. 1760.)

II. MUSCI: Fructificatio cryptostemonis intra cavitates folliculorum *a.* antheriformium (sæpe operculo *b.* & calyptra *c.* tectorum.) (Gled. l. c.): *Polytrichum commune*, (adianthum aureum off.)

Sunt plantæ perennes, foliis a caule distinctis præditæ: quibus viror perpetuus est, calore & siccitate squalescens, aqua denuo reparabilis; Floribus instructæ masculis & femineis in eadem aut distincta planta minime manifestis; ita tamen ut masculi constent an-

thera ſeu capſula membranacea ſeſſili aut pedunculata, ex alis foliorum, aut ramulorum apicibus orta, operculo & calyptra ſæpius inſtructa, vel nuda, aut apice dehiſcente, & ſcobem tenuiſſimam fundente. (Scop. l. c.)

III. ALGÆ: Fructificatio Cryptoſtemonis in corporibus granuloſis, tuberculis, veſiculis aut peltis varie formatis, atque diſpoſitis. (Gl. l. c.): *Lichen pulmonarius* (muſcus pulmon. off.) *Lichen plicatus* (muſcus arboreus off.), *Tremella auricula* (auricula Judæ off.) Gleditſchio & aliis inter fungos relata.

His Flores apetali, nudi, non manifeſti, maſculi & feminei ſeorſim in eadem aut diſtincta planta. Vita perennis. Subſtantia pulverulenta, lanuginoſa, filamentoſa, foliacea, gelatinoſa, caloris impatiens, aqua intumeſcens. Semina plurima, ſæpius aggregata, minime manifeſta. (Scop. l. c.)

IV. FUNGI: Fructificatio cryptoſtemonis aut in ſuperficie & receptaculis, aut intra cava & ipſam ſubſtantiam corporum, ab omnibus reliquis totius regni vegetabilis tam habitu peregrino, quam figura omnium facile inconſtantiſſima diſtinctorum. (Gl. l. c.)

Flores nudis oculis non manifeſti, apetali, ſtaminei, nudi a feminis ſeorſim in eadem planta poſiti. Semina non conſpicua, plurima. Subſtantia carnoſa, aphylla, in medicos uſus raro recepta, venenata ſæpius, ſuſpecta ſemper. (Scop. l. c.)

Ord. I. FILICES. (Farnkräuter.)

393) EQUISETUM, (Kannenkraut,) L. G. 1169

FRUCTIFICATIONES in ſpicam ovato-oblongam digeſtæ. *Singula* orbiculata, a baſi dehiſcens pluribus valvulis, apice plano, peltato connexis.

SPEC. 1) *Arvenſe*, (Acker K. Schafthalm, Schaftheu, Kazenzügel, Pferdeſchwanz,) ſcapo fructificante nudo, ſterili frondoſo. *Loc.* Agris pratis, rivulis. *Fl.* Apr. *Obſ.* Vaccis ovib. noxium.

2) *Fluviatile*, (Waſſer-Rosſchwanz-Schluten Fluskannenkraut, Schaftheu mit langen Borſten Wieſenſchafthalm,) caule ſtriato, frondibus ſubſimplicibus. *Loc.* Ad ripas lacuum, fluviorum. *Fl.* May. *Uſ.* Bob. capr. ſuibus, equis pabulum vacc

vaccis & ovibus noxium: ſcriniarii lignum, & fabri pectines, manubria, ſcipiones, metalla lævigant & expoliunt.

3) *Hyemale*, (Winterkannenkraut, Kazenwedel, Zinnkraut,) caule nudo ſcabro, baſi ſubramoſo. *Loc.* Silvis, aſperis, uliginoſis. *Fl.* Mart. *Uſ.* Paleæ foeno miſtæ ſiccatæ bob. capr. ovib. equis, ſuib. pabul. in neceſſitate. Culinaris uſus ad vaſa ſtannea depurganda.

394) OPHIOGLOSSUM, (Natterzünglein) Linn. G. 1171.

CAPSULA diſticha: *articulis* numeroſis, transverſalibus, in totidem loculamenta diviſa: dehiſcente ſingulo *loculo* maturo transverſim.

SEM. numeroſa, minima, ſubovata.

SPEC. *Vulgatum*, (gemeines N.) fronde ovata, folio ovato, ſpica diſticha. *Loc.* Pratis ſilvaticis, montibus. *Fl.* May. Jun.

395) OSMUNDA, (Osmunde) Linn. G. 1172.

CAPSULÆ globoſæ, diſtinctæ, in racemum diſpoſitæ, horizontaliter dehiſcentes.

SEM. numeroſa, minima, ovata.

SPEC. 1) *Lunaria*, (Mondraute-Kraut, St. Walpurgis-Kraut, Leberrauten, gemeine Traubenfarren.) ſcapo caulino ſolitario, fronde pinnata ſolitaria, pinnis lunulatis. *Loc.* Aquoſis, pratis. *Fl.* May. *Uſ.* Ovibus pabulum.

2) *Regalis*, (Königliche O.) frondibus caulinis bipinnatis apice racemiferis, ſcapo paniculato polyphyllo, pinnis lanceolatis. *Loc.* Ad fluvios. *Vis* Balſamica, adſtringens.

396) ACROSTICUM, (vollblühende Farren,) Linn. G. 1173.

FRUCTIF. acumulatæ per totam paginam inferiorem frondis ut eandem undique tegant.

SPEC. *Septentrionale*, (mitternächtiges V.) frondibus nudis linearibus laciniatis. (Ruta muraria.) *Loc.* In Europ. fiſſuris rupium.

397) PTERIS, (Flügelfarn) Linn. G. 1174.

Fructificationes digeſtæ in lineam, ſubtus cingentem marginem frondis.

Spec. *Aquilina*, (F. Stos- Rhein- Wald- Saum- Farren, Adlerkraut, äſtig Farrenkraut,) frondibus ſupradecompoſitis, foliolis pinnatis, pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis, ſuperioribus minoribus. Filix ramoſa major pinnulis obtuſis non dentatis. *Uſ.* Radix graveolens ad cimices, herba coriis parandis, & ad ſcarabæos incenſa. *Folia* pro culcitris equisque ſubſternendis in Dania: *cineribus* aqua coctis, globulos faciunt Angli lotricibus, loco ſmegmatis; ligni inopia adhibetur Anglis ob flammam calidiſſimam. *Loc.* Silvis. *Fl.* Aug,

398) ASPLENIUM, (Milzkraut,) L. G. 1178.

Fructif. in lineas rectas, diſco frondis ſubjectas, diſpoſitæ.

Spec. 1) *Scolopendrium*, (Hirſchzunge, Streifenfarrn,) frondibus ſimplicibus cordato-lingulatis integerrimis, ſtipitibus hirſutis. *Loc.* Umbroſis, nemoroſis, montoſis. *Fl.* Jun. *Vis* exſiccans, adſtringens olim.

2) *Ruta muraria*, (Mauer-Stein-Raute) frondibus alternatim decompoſitis, foliolis cuneiformibus crenulatis. *Loc.* Ad muros, ex rupium fiſſuris. *Fl.* Jun. *Vis* Olim antiſcorbutica, exſiccans, roborans.

399) POLYPODIUM, (Engelſüſs,) L. G. 1179.

Fructff. in puncta ſubrotunda, per paginam frondis averſam diſtributæ.

Spec. 1) *Vulgaris*, (gewöhnliches E. Süſsfarn,) frondibus pinnatifidis, pinnis oblongis ſubſerratis obtuſis, radice ſquamata, quercis creſcente. *Loc.* Rupes. *Fl.* Oct. *Vis.* Edulcorans, incraſſans, expectorans.

2) *Filix mas*, (Farrenkrautmänlein, Tüpfelfarn,) frondib. bipinnat. pinnis obtuſis crenulatis, ſtipite paleaceo. *Loc.* Silvis vineis, ſepibus. *Fl.* Jun.-Sept. *Vis.* Radic. antiverminoſa, adſtringens. *Uſ.* Herba coriis parandis; ſiccata Gallis

loco

loco ſtraminis: cineres elixivati exſiccati in globulos loco ſaponis Anglis.

3) *Filix femina*, (Farrenkraut Weiblein,) frondibus bipinnat. pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *Loc.* Subhumidis, ſilvis. *Fl.* Jul. Aug.

CRYPTOGAMIA,

Ord. II. MUSCI, (Mooſe.)

400) LYCOPODIUM, (Bärlappen,) L. G. 1185.

* *Maſculus* flos in alis foliorum ſeſſilis.

CAL. Calyptra nulla.

Anthera reniformis, bivalvis, ſeſſilis.

Femineus flos in eodem vegetabili.

CAL. Perianthium tetraphyllum.

PIST. nullum.

SEM. plumula connata calyci absque cotyledonibus.

SPEC. 1) *Clavatum*, (Keulförmige B. Wein-Gürtel-Kraut, Wolfsklauen, gemeines Kolben-Schlangen-Moos.) foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis teretibus pedunculatis geminis. *Loc.* Silvis, muſcoſis. *Fl.* Jul. *Vis* Exſiccans, anodyna, repellens: in decocto adſtringens, diuretica. *Uſ.* *Pollen* ſpicarum pilulis conſpergendis, aqua non madeſcens, ad phyſica experimenta pro fulgurationibus idoneum. Lycop. ad ſtoreas in pavimentis; ſpongiarum ſuccedaneum, vinum degenerans corrigit, fulvo tinctorius uſus.

2) *Selago*, (Tannenförmiger B.) fol. ſparſis octifariis, caule dichotomo erecto faſtigiato, floribus ſparſis. *Loc.* Silvis aceroſis. *Fl.* Jun. *Uſ.* Decoctum prodeſt pecoribus, bobus, vaccis, equis, ſuibus pediculis preſſis.

401) SPHAGNUM, (Torfmoos,) Linn. G. 1187.

* *Maſculus* flos ſubſeſſilis.

CAL. *Calyptra* nulla.

COR. nulla, ſed membrana fugax intra antheram & receptaculum.

ANTHERA globoſa: *ore* integerrimo, tecto operculo obtuſo.

Receptaculum *Apophyſis* marginata, obſoleta, ſub anthera.

* *Femineus* flos etiamnum nobis latet.

Spec. *Paluſtre*, (ſumpfiger T.) ramis deflexis, molle, ſquamis cymbiformibus. *Loc.* Paludibus profundis ſilvaticis.

402) POLYTRICHUM, (Goldhaar) L. G. 1192.

* *Maſculus* flos pedunculatus, ex apice vegetabilis.

Cal. *Calyptra* conica, ſæpius villoſa, æqualis.

Anthera oblonga: *ore* ciliari, tecto Membrana orbiculari, operculo conico.

Recept. *Apophyſis* marginata, antheræ ſubjecta.

Perichætium vagina cylindrica, pedunculo brevior.

* *Femina* in diſtincta planta, ſeſſilis.

Cal. communis, patens in roſulam imbricatam, coloratam.

Pist. filiformia articulata.

Spec. *Commune* (gemeines G. Haarmos, gulden Wiederthon.) caule ſimplici, anthera parallele pipeda; quadrangulare vulgare, yuccæ foliis ſerratis; *β.* quadrangul. juniperi foliis brevioribus et rigidioribus: *γ.* quadr. minus juniperi foliis piloſis. *Loc.* *α.* uliginoſis, *β.* paſcuis, *γ* ſteriliſſimis. *Uſ.* Lectus Lapponum in ſilvis oberrantium: *Ceſpites* ab urſis ad hyemationem, ad hybernaculum colliguntur, & Weſtrogothis ad ſcopas fornacum.

403) MNIUM, (Sternmoos,) Linn. G. 1193.

* *Maſculus Flos* pedunculatus.

Cal. *Calyptra* oblonga, acuminata, obliqua.

Anth. ſubrotunda, ore ciliari annulato, tecto operculo ſubconico.

Recept. Apophyſis nulla.

* *Femineus Flos* in diſtincto ſæpius individuo.

Cal. communis ſtellatus ex foliis radiantibus.

Pist. plurimi, centrales, congeſti.

Spec. 1) *Setaceum*, (borſtiges St.) antheris erectis, operculis filiformibus longitudine antherarum: caules erecti, breviſſimi, pedunculi atropurpurei, flexuoſi, antheræ cylindricæ, lividæ, opercula & calyptræ filiformes, longiores & anguſtio-

guſtiores quam in reliquis. *Loc.* Muris, aggeribus, ſepibus. *Fl.* Mart.

2) *Serpyllifolium*, (St. mit Quendelblättern.) pedunculis aggregatis, fol. patentibus pellucidis: α. *punctatum*, pedunculis aggregatis, fol. obovatis integerrimis obtuſis punctatis; β. *Cuſpidatum*, peduncul. aggr. fol. alternis acutis ſerratis; γ. *proliferum*, pedunc. aggr. fol. roſaceo-congeſtis lanceolatis acutis; δ. *undulatum*, pedunc. aggr. fol. oblongis undulatis. *Loc.* Viis, pratis, ſilvis. *Fl.* Mart.

404) BRYUM, (Knoten-Moos) Linn. G. 1194.

* *Maſculus Flos* ex apice furculorum pedunculatus.

Cal. *Calyptra* oblonga, acuminata, obliqua.

Anthera ſubrotunda ſ. oblongiuſcula, ore ciliari annulato, tecto operculo conico.

Recept. Apophyſis nulla.

Perichætium nullum, ſed tuberculum pro baſi pedunculi.

Spec. 1) *Striatum*, (geſtreiftes K.) α. antheris ſubſeſſilibus ſparſis, calyptris ſtriatis ſurſumve piloſis. β. capſulis ſeſſilibus minus. γ. capſ. ſeſſilib. foliis brevibus rectis carinatis, δ. calyptris acutis piloſiſſimis. *Loc.* α. Arboribus, β. ſaxis, γ. muris, δ. ſilvis. *Flos.* Febr.-Mart.

2) *Rurale*, (Feld K.) antheris erectiuſculis, foliis piliferis recurvis. *Loc.* Muris, ruſticorum tectis, arborum truncis. *Fl.* Febr.-Mart. *Uſ.* Tectis ſtramineis putredinem impedit, humidum exſorbendo.

3) *Murale*, (Mauer K.) antheris erectis, fol. piliferis rectiuſculis, furculis ſimplicibus cæſpitoſis. *Loc.* Saxis, muris, tectis, tegulis. *Fl.* Febr.-Mart.

405) HYPNUM, (Aſtmoos) Linn. G. 1195.

* *Maſculus Flos* pedunculatus, ex alis foliorum ad latera furculorum.

Cal. *Calyptra* obliqua, oblonga, glabra.

Anthera oblongiuſcula *ore* ciliari, tecto operculo acuminato.

Recept. Apophyſis nulla.
Perichætium, ſquamoſum, ad latera furculorum pedunculum emittens.
Femineus flos in eodem vegetabili ex alis foliorum.
CAL. communis nullus.
PIST. ſolitaria, ex alis foliorum, nudæ plumulæ.
SPEC. 1) *Complanatum*, (geebnetes A.) fronde pinnata ramoſa, foliolis imbricatis acutis complicatis compreſſis. *Loc.* Ad truncos arborum, pratis, ſilvis. *Fl.* Febr.-Apr.
2) *Proliferum*, (ſproſſendes A.) furculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. *Loc.* Pratis, ad truncos arborum ſilvaticarum. *Fl.* Apr. *Uſ.* Ad ædificiorum ligneorum rimas obturandas præcalore & frigore, uti in Suecia, & ad filtra lactis.
3) *Sericeum*, (Seidenmoos,) Surculo repente, ramis confertis erectis, foliis ſubulatis, antheris erectis. *Loc.* Ad truncos, inprimis ſalices, muros, tecta. *Fl.* Febr.-Apr.
4) *Serpens*, (kriechendes A.) furculis repentibus, ramis filiformibus, foliis obliteratis. *Loc.* Ad caudices, ligna, ſaxa. *Fl.* Febr.

CRYPTOGAMIA

Ord. III. ALGÆ. (Aftermooſe.)

406) JUNGERMANNIA, (Jungermannie,) Linn. G. 1196.

* *Maſculus Flos* pedunculo longo, recto, e calyce prodeunti inſiſtit.
CAL. Perichætium tubuloſum.
COR. nulla.
STAM. *Anthera* ovata, dehiſcens in valvulas 4. patentes, perſiſtentes, æquales.
** *Femineus Flos* ſeſſilis, ſæpius in eadem planta.
CAL. nullus (nobis manifeſtus.)
COR. nulla.
SEM. ſolitaria, vel conferta, ſubrotunda.
SPEC. *Complanata*, (flache I. Jungermanniſch Aftermoos.) furculis repentibus, foliolis inferne auriculatis, duplicato-imbricatis, ramis æqualibus. *Loc.* Ad arborum truncos. *Fl.* Apr.

407) HAR-

407) MARCHANTIA, (Marhantiſches Afterm.) Linn. G. 1198.

* *Maſculus Flos* pedunculo longo, recto, e calyculo prodeunte, exoritur.

CAL. *Perianthium commune* quadrifidum, 5fidum, vel 10fidum, peltatum, (*laciniis* æqualibus, lateribus deflexis), maximum, ſub ſe continens floſculos tot, quot lacinias habet.

COR. monopetala, turbinata, calyce brevior, recta.

STAM. *Filam.* unicum, corolla longius, ſimplex. *Anthera* ſubovata, ab apice dehiſcens in tot lacinias, quot calyx communis. *Pollen* crinulo affixum.

* *Femineus Flos* ſeſſilis, in eadem planta.

CAL. *Perianth.* conſtans margine membranaceo, erecto, patulo, integro, perſiſtente, monophyllo.

COR. nulla: niſi Calycem dicas.

SEM. plura ſubrotunda, compreſſa, nuda, in fundo calycis.

SPEC. *Polymorpha*, (Sternförmige Marchantie,) calyce communi decemfido. *Loc.* Umbroſis, ad aquas. *Fl.* Apr.-Aug. *Vis* Aperiens, reſolvens in obſtructionibus, & decoctum cosmeticum in morbis cutaneis.

408) LICHEN, (Flechte) Linn. G. 1202.

* *Maſculi Flores* numeroſi, innati *Receptaculo* ſæpius orbiculato, maximo, nitido, plano convexo vel concavo, glutinoſo.

* *Feminei Flores* & *ſemina* farinæ inſtar ſparſa in eadem vel diſtincta planta.

Leproſus tuberculatus, ſcutellatus, imbricatus, foliaceus, coriaceus, ſcyphiferus, fruticuloſus, filamentoſus.

SPEC. 1) *Candelaruis*, (Licht F.) Cruſtaceus flavus, ſcutellis lutis; farinacea flava. *Loc.* Parietibus, muris, truncis arborum, præſertim quercus. *Uſ.* Sebi ad candelas luteo-tinctorius.

2) *Parietinus*, (Wand F.) imbricatus, foliis criſpis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *Loc.* Parietibus, rupibus, lignis. *Fl.* Mart. *Uſ.* Luteo-tinctorius: capris gratus.

3) *Pulmonarius*, (Lungen-F.-Moos, groſſe Baumflechte,) foliaceus laciniatus obtuſus glaber, ſu-

pra

pra lacunoſus, ſubtus tomentoſus. *Loc.* Silvis umbroſis ſuper arbores antiquas, in Fagis & Quercubus. *Fl.* Dec.-Jan. *Uſ.* In tuſſi pecudum; coriis parandis.

4) *Juniperinus*, (Wachholderbeer-Baum Moos,) foliaceus laciniatus criſpus fulvus, peltis lividis. *Loc.* In Eur. Juniperetis, *Uſ.* Luteo-tinctorius.

5) *Vulpinus*, (Dach F.) filamentoſus articulatus, ramulis tenuiſſimis punctatis. *Loc.* Silvis. *Fl.* Apr. *Uſ.* Luteo-tinctorius; tolluntur lupi in Norwegia.

409) TREMELLA, (Gallerte,) Linn. G. 1204.

Subſtantia uniformis, pellucida, membranacea, gelatinoſa, foliacea.

Obs. *Tuberculis* & ſcutellis non obviis a *Lichene* differt.

Spec. 1) *Iuniperina*, (Wachholder G.) ſeſſilis membranacea auriformis fulva. *Loc.* In Juniperetis primo vere.

2) *Auricula*, (Judasohr.) ſeſſilis membran. auriformis cinerea. *Loc.* Ad arbores putridas.

410) FUCUS, (Meergras, Taug,) L. G. 1205.

* *Maſculi Flores?*

Veſiculæ glabræ, cavæ, pilis intus adſperſæ.

* *Feminei* flores?

Veſiculæ glabræ, gelatina repletæ, adſperſæ punctis perforatis ſemine foetis.

Spec. *Veſiculoſus*, (Meereiche, Schweinentang,) fronde dichotoma integra, caule medium folium tranſcurrente, veſiculis verrucoſis terminalibus. *Loc.* Marinis, in Atlantico mari. *Uſ.* Suum pabulum farina adſperſum, Weſtgothis ad tecta, & rubro-tinctorius uſus.

411) ULVA, (Ylle, Matt,) Linn. G. 1206.

Fructificationes in membrana veſiculari absque fronde.

Spec. *Granulata*, (Kornerige Y.) ſphærica aggregata: paluſtris, veſiculis ſpæricis fungiformibus. *Loc.* Ad ripas fluviorum.

Fibræ

412) CONFERVA, (Grasleder) L. G. 1207.

Fibræ ſimplices, uniformes, capillaceæ, filamentoſæ.
Obs. Sunthæ fibræ vel continuæ vel articulatæ.

Spec. 1) *Rivularis*, (Bach G. Waſſer-Wate,) filamentis ſimpliciſſimis æqualibus longiſſimis. *Loc.* Rivulis fluviisque pacatioribus. *Uſ.* Fila, ſæpius 5. ulnarum longitudinem ſuperantia, cum lana camelina mixta, ad telas, ellychnia, pulvinaria in rhedis.

2) *Fontinalis*, (Quell G.) filament. ſimpliciſſ. æqualibus digito brevioribus. *Loc.* Eur. fontibus.

413) BYSSUS, (Haar oder Staubaftermoos,) Linn. G. 1208.

Fibræ ſimplices, uniformes, lanuginoſæ ſ. pulverulentæ.

Spec. *Phosphorea*, (violettes H. vegetabiliſcher Staub,) lanuginoſa violacea lignis adnaſcens. *Loc.* Lignis putreſcentibus.

CRYPTOGAMIA.

Ord. IV. FUNGI, (Schwämme.)

414) AGARICUS, (Blätterſchwamm.) L. G. 1209.

Fungus horizontalis, ſubtus lamellatus.
Obs. Agaricus *D. caret petiolo, & margine laterali adnaſcitur.* Amanita *D. inſtruitur petiolo, centro orbiculari capitis inſerto.* Agaricos *Dill. ab* Amanita: Boleto *&* Erinaceo *Dill. non ſpecie differre, ſed ſolo loco naſcendi mutatos reddi, ſuadent obſervationes quotquot hactenus fuere inſtitutæ.*

Spec. 1) *Muſcarius*, (Fliegenſchwamm,) ſtipitatus, cauleſcens lamellis dimidiatis ſolitariis, ſtipite volvato, albo baſi globoſo, apice dilatato, baſi ovato, pileo ſanguineo verrucis lamellisque albis. *Loc.* Pratis. *Uſ.* Cimices necat & muſcas lac huic fungo ſuperfuſum.

2) *Delicioſus*, (Reizker, Rietſche, eſsbarer Schw.) ſtipitatus, pileo teſtaceo ſucco luteſcente, croceo turgens. *Loc.* Montoſis, ſterilibus, ſilvoſis. *Uſ.* Eſculentus aqua & cum aromatibus, ſale, butyro, coctus.

3) *Campeſtris*, (Ehegürtel, Champignon,) ſtipitatus cau-

cauleſcens, pileo convexo ſquamato albido, membranaceo, pileolo ſordido lacero, lamellis ruffis. *Loc.* Cultis, hortis, pratis, Jun. poſt pluvias: eſculentus in lixivio ſalis culinaris, vel aceto cum aromatibus præparatus.

4) *Fimetarius*, (Miſt B.) ſtipitatus, pileo campanulato lacero, conico cinereo lamellis nigris lateraliter flexuoſis, ſtipite fiſtuloſo, longiſſimo albo, margine lacero. *Loc.* In fimetis: venenoſus.

5) *Quercinus*, (Eichen B.) acaulis, lamellis labyrinthiformibus. *Loc.* In Quercubus.

6) *Betulinus*, (Bircken B.) acaulis coriaceus villoſus, margine obtuſo, lamellis ramoſis anaſtomoſantibus. *Loc.* In Betulis.

415) BOLETUS, (Löcherſchwamm) L. G. 1210.

Fungus horizontalis, ſubtus poroſus.

Spec. 1) *Igniarius*, (Feuerſchw. Zunder, Zundel.) acaulis pulvinatus lævis, poris tenuiſſimis: pedis equini facie. *Loc.* In Betulis aliisque arboribus. *Uſ.* Pro fomite inſervit, immiſſus antea in lixivium urinoſum, & contuſus malleo addito ſimul nitro: fumo culices fugantur a Lapponibus.

2) *Suaveolens*, (wohlriechender L.) acaulis, ſuperne levis, ſalicinus. *Loc.* In ſalice.

3) *Bovinus* (Kuhbüz.) ſtipitatus, pileo glabro pulvinato marginato, poris compoſitis acutis, porulis angulatis brevioribus. *Loc.* Pratis, ſilvis Aug. a vaccis devoratus lac nauſeoſum reddit.

416) HYDNUM, (Stachelſchwamm,) L. G. 1211.

Fung. horizontalis, ſubtus fibris ſubulatis echinatus.

Spec. *Imbricatum*, (Ziegelartiger St.) ſtipitatum, pileo convexo imbricato, eſculentus albus craſſus. *Loc.* Silvis aceroſis.

417) PHALLUS, (Gicht-Morgelſchwamm.) Linn. G. 1212.

Fung. ſubtus glaber, ſuperne callis reticulatus.

Spec. *Eſculentus*, (Morgel, Aderſchwamm,) pileo ovato celluloſo, ſubtus laxo, nudo rugoſo. *Loc.* Pratis humidis, ſilvis, carbonum ſtruibus, May. *Uſ.* Culinaris in juſculis delicatis.

418) CLA-

418) CLATHRUS, (Gitterſchwamm.) L. G. 1213.

Fungus ſubrotundus: conſtans corpore reticulari, feneſtrato, cavo, undique connexis ramificationibus.

Spec. *Nudus*, (entblöſter G.) ſtipitatus, capitulo oblongo axi longitudinali adnato. *Loc.* Italia lignis putridis.

419) ELVELA, (Helvella,) (Faltenſchwamm.) Linn. G. 1214.

Fung. ſuperne & inferne lævis.

Spec. *Mitra*, (Biſchofsmüze,) pileo deflexo adnato lobato difformi. *Loc.* In truncis putridis.

420) PEZIZA, (Becherſchwamm,) L. G. 1215.

Fung. campanulatus; ſeminibus orbiculatis, convexoplanis.

Spec. 1) *Lentifera*, (Linſen B. Schüſſelſchwamm,) campanulata lentifera, calyce campanulato β. calyce campanulato interne ſtriato, externe ſquamoſo. *Loc.* Agris, lignis, ſepimentis.

2) *Punctata*, (getüpfelter B.) Turbinata truncata, diſco punctato, petiolo breviſſimo, pileo turbinato, diſcus niveus punctis atris eminentibus. *Loc.* In ſtercore equino.

421) CLAVARIA, (Keulſchwamm) L. G. 1216.

Fungus perpendicularis, ſuperficie unica.

Spec. 1) *Piſtillaris*, (ſtengelförmiger K.) clavæformis ſimpliciſſima; clavata integerrima obtuſa erecta; alba piſtilli forma; major lutea. *Loc.* Silvis umbroſis.

2) *Coralloides*, (Corallenſchwamm, Geisbart,) ramis confertis, ramoſiſſimis inæqualibus, barba caprina flava & rubra. *Loc.* Silvis opacis, eſculentus.

422) LYCOPERDON, (Staub-Kugel-Schwamm) Linn. G. 1217.

Fung. ſubrotundus, ſeminibus farinaceis inpalpabilibus repletus, ab apice dehiſcens.

Spec. 1) *Tuber*, (Trüffel,) globoſum ſolidum muricatum radice deſtitutum: brumale pulpa obſcura odorata. *Loc.* Arenoſis, arboribus, ſub terra a canibus

nibus venatoriis propriis inveſtigatur. *Uſ.* Culinariis, irritamentum gulæ.

2) *Boviſta*, (gemeiner Kugel S. Boviſt, Pfüſter.) ſubrotundum lacerato-dehiſcens, maximus rotundus pulverulentus. *Loc.* In Campis ſterilibus. *Vis* Adſtringens, obſtipans, abſorbens, incraſſans.

423) (MUCOR, (Schimmel) Linn. G. 1218.

Fung. veſicula ſubrotunda, in qua ſemina numeroſa, affixa receptaculis cruciformibus.

Spec. 1) *Sphærocephalus*, (kugelrunder S.) perennis, ſtipite filiformi nigro, capitulo globoſo cinereo. *Loc.* In parietibus, lapidibus, lignis.

2) *Embolus*, (Stempfel S.) ſeta nigra, villo fuſco. *Loc.* In lignis putridis.

3) *Mucedo*, (gemeiner S.) ſtipitatus capſula globoſa; filamentis granulatis fugacibus putreſcentibus, innatis. *Loc.* In variis putridis, pane, plantis.

4) *Cruſtaceus*, (ſchorfiger S.) ſtipitatus, ſpicis digitatis, cruſtac. albus, capitulis ſetisque aqueis. *Loc.* In cibis corruptis.

SPECIALIORA QUÆDAM BOTANOPHILO OBSERVANDA.

1) *Partes plantæ* omnes *tyro* inprimis ſibi reddat notiſſimas. Ill. Linn. Philoſ. bot. p. 289.

Vulgatiſſimas plantas Herbationibus diſcat ille dignoſcere.

Colligat, exſiccet, adglutinet ipſe plantas majores, quotquot poterit.

Fructificationis partes primarias diſcat diſtinguere. Partes 1) *Maſculinæ* in ſyſtemate Linnæano ſunt *Stamina*, horum partes *Filamenta*, & *Antheræ*, polline obductæ. 2) *Femineæ*, *Piſtillum*, hujus *Germen*, *Stylus*, *Stigma*. Inveſtigetur accurate ſtructura & numerus Staminum, & Piſtilli ad characteres naturales cujusvis Claſſis & Ordinis p. 17. §. 18. 19. indicatos & cuivis claſſi in Part. IIda præmiſſos, tum facile quoad ſtaminis conditionem *Claſſis*, & quoad piſtilli conditionem *Ordo* pateſcet, ad quem planta referenda eſt. Si Claſſis & ordo eſt determinatus, facili opera *Nomen* plantæ reperietur accurata comparatione Generum, in hac claſſe & ordine deſcriptorum, quoad ſtructuram reliquarum plantæ partium, e. g. quoad calycem, corollam &c. Si *Nomen* patet & *Genus*, ad quod referenda eſt planta, haud difficulter detegenda erit *Species*, ſi deſcriptiones ſpecierum, cuivis generi ſubordinatarum, comparantur cum planta cujus ſpecies inveſtigatur. Determinatis Genere & Specie plantæ uſum œconomicum & medicum in ſcriptis medicis & œconomicis quivis facile poterit evolvere.

Claſſes & *Ordines* ſyſtematis ſibi reddat familiares tiro, & ſimpliciores, & evidentiores flores ad eosdem reducat.

Demonſtrationibus Magiſtrorum in Arte frequenter adſit.

Terminos artis ſecundum definitiones ſibi habeat perſpectos.

Genera ſibi nota, circiter 50. ſecundum genera plantarum examinet, collatis fructificationibus cum charactere plantæ.

Characteres Genericos 50. proprio marte, eadem methodo conficiat, & ſecundum genera plantarum emendet.

Deſcriptiones ſpecierum, 60. circiter, conficiat ex lege artis, incipiendo a ſimpliciſſimis plantis, procedendo ad difficiliores, quas corrigat Magiſter in arte.

Ignotas ſibi plantarum ſpecies *inveſtiget* ipſe ſecundum claves, characteres, differentiasque ſyſtematis.

Principia & fundamenta botanices rite intelligat.

Hiſtoriam litterariam rei botanicæ, & inprimis auctores de ſpeciebus plantarum familiares ſibi reddat.

Synonyma auctorum, retrogrediendo ad inventores, evolvere adſueſcat.

Uſum plantarum ſpeciebus adſcribat, medicum & œconomicum.

II) *Herbarium* omni *botanico* neceſſarium, præſtat omni Icone. Linn. phil. bot. p. 7.

1) *Plantæ* non humidæ *colligendæ*, 2) *partes* nullæ auferendæ; 3) moderate *explicandæ*, 4) non vero *inflectendæ*, 5) *fructificatione* præſente, 6) *ſiccandæ* inter papyra ſicca, 7) *citiſſime*, vix ferro calido ſucculentæ, 8) *prelo* modice compreſſo, 9) *adglutinandæ* ichthyocolla, 10) in *folio* ſemper aſſervandæ, 11) *unica* tantum in pagina, 12) *plagula* non alliganda, 13) *genus* ſupra adſcribendum, 14) *ſpecies* & hiſtorica infra vel a tergo, 15) *congeneres* inter *philyram* reponendæ, 16) diſponendæ ad *methodum*.

Plantæ methodo datæ, collectæ in herbarium vivum, aliis hortum ſiccum dictum, diſponuntur ſecundum *ſyſtema*, ut prompte evolvantur. Linn. Philoſ. bot. p. 291.

Herbarium, ſecundum ſyſtema ſexuale diſpoſitum, aſſervatur optime *Arca* ex ligno, claudenda *valvulis* duabus longitudinalibus, reſpondentibus apte diſſepimento perpendiculari.

Spatium arcæ interne accurate determinetur. *Altitudo* pariſ. pedum 7 1/2, a ſummo ad infimum. *Latitudo* pariſ. unciar. 16. præter diſſepimentum. *Profunditas* pariſ. ped. 1. a pectore ſc. ad tergum.

Locula fiant horizontaliter diſtincta, Aſſere craſſo lin. 6.

Claſ-

Claſſium loculamenta ſint inſtructa ſecundum copiam ſpecierum, uti numeri claſſium indicant.

Claſſis 1.	unciar.	2.	Cl. 2.	u. 3.	Cl. 3.	u. 6.	Cl. 4.	u. 5.
Cl. 5.	--	14.	- 6.	- 6.	- 7.	- 2.	- 8.	- 3.
Cl. 9.	--	2.	- 10.	- 7.	- 11.	- 3.	- 12.	- 5.
Cl. 13.	--	6.	- 14.	- 10.	- 15.	- 5.	- 16.	- 4.
Cl. 17.	--	8.	- 18.	- 2.	- 19.	- 12.	- 20.	- 3.
Cl. 21.	--	5.	- 22.	- 5.	- 23.	- 2.	- 24.	- 7.

Capit hæc arca 6000. Plantas ſiccatas adglutinatas.

Notatis valvulis arcæ numero & nomine generum, exacte reſpondentibus loculis, intra quæ philyræ, genera eadem includentes, eorumque numeris ipſæ notatæ, ſervantur; abſque mora planta omnis protrahitur & evolvitur.

III) *Herbationibus* optime conducit veſtitus leviſſimus, laxiſſimus, botanicis proprius, (ubi licet,) negotio aptiſſimus: tunica brevis ex linteo, & pileus umbraculo ampliſſimo. Linn. Phil. p. 293.

Inſtrumenta herbationibus neceſſaria ſunt.

1) *Libri*, Syſtema naturæ, Compendium botanicum, Flora Faunaque regionis.

2) *Microſcopium*, Acus botanica, Cultellus botanicus, Papyra colligata.

3) *Vaſculum Dillenianum*, ſ. pelvis ſemicylindrica e cupro, longitudine unciarum 9. probe operculata, orificio amplo pro manu, latere plano modice concavo pro femore, ad plantas collectas aqua, irrigatas, vivas ſervandas in veſperam.

4) *Capſula* cum aciculis pro inſectis.

Tempus herbationum a frondeſcentia arborum, excepto Sirio, ad earum defoliationem.

In herbationibus colligendæ ſunt *Plantæ*, præcipue florentes, muſci, &c. uti &c. *Animalia*, Inſecta &c. *Mineralia*.

IV. *Hortus botanicus*, hybernacula, caldaria, tepidaria, frigidaria, muſea, ædes, æſtivaria, vaporaria, ſolaria, areas pro anni tempore, aquaria varia, & arboreta continens, alit plantas numeroſiſſimas, & genera & ſpecies quæ ſemper vivæ a Profeſſore demonſtrari poſſunt. Pretioſa itinera in alienas regiones evitantur, dum plures exoticæ occurrunt in horto

botanico, quam ſpontoneæ in magno terræ tractu.

V) *Syſtematice Botanicus* plantas ſuas diſponit: nec abſque ordine easdem enumerat. Linn. Phil. p. 299.

Fructificationis principium in theoretica diſpoſitione agnoſcit, nec diſpoſitionem ſecundum herbam immutat.

Genera naturalia aſſumit, nec erronea ob ſpeciei notam aberrantem conficit.

Species diſtinctas tradit; nec e varietatibus falſas fingit.

Varietates ad ſpecies reducit; nec eas, pari paſſu, cum ſpeciebus obambulare ſinit.

Synonyma præſtantiſſima indagat & ſeligit; nec acquieſcit in quacunque obvia nomenclatura.

Differentias characteriſticas inquirit; nec inania nomina ſpecifica præponit veris.

Plantas vagas ad genera amandare ſtudet; nec rariores obvias fugitivis oculis adſpicit.

Deſcriptiones, complectentes differentias eſſentiales, compendioſe ſiſtit: nec naturaliſſimam ſtructuram oratorio ſermone ebuccinat.

Minimas partes attente ſcrutatur; nec ea, quæ maxime illuſtrant, flocci facit.

Obſervationibus ubique plantas illuſtrat; nec in vago nomine acquieſcit.

Oculis propriis quæ ſingularia ſunt obſervat: nec ſua ſolum, ex auctoribus compilat.

VI) Variam vegetabilium *Metamorphoſin* obſervat etiam botanophilus.

Radix deorſum, *Herba* ſurſum tendit. Linn. Phil. p. 301.

Herba omnis eſt proceſſus ſubſtantiæ medullaris Radicis.

Flos terminat, foecundatio ſeparat, *ſemen* incipit omnem plantam.

Terminus plantæ idem, vel vita continuata in *Gemma*, vel propagata in *Flore*.

Gemma fines, *ſemina* initia plantæ defendunt a climatis duritie.

Gemma eſt hybernaculum herbæ, *ſemen* ejus capſula.

Gemma conſervat embryones intra ſquamas, *ſemen* intra tunicas.

Gem-

Gemmiparæ non minus ſunt perennes herbæ quam arbores.

Meridionales arbores nequeunt eſſe boreales ob gemmas.

Perennis planta gaudet duplici *flore* : altero *anteceſſore* triumphante; altero *ſucceſſore* occulto.

Gemma aut *gemmulis*, aut *floribus* aut utrisque gravida eſt.

Plumulam ſeminis ſæpius terminat aut flos aut gemma.

Principium *florum* & *foliorum* idem eſt.

Principium gemmarum & foliorum idem eſt.

Gemma conſtat foliorum rudimentis.

Stipulæ ſunt foliorum appendices.

Perianthium fit ex connatis foliorum rudimentis.

Derivato nutrimento ad ſquamas amenti, deſtructis floſculis, mutantur in *Folia*.

Derivato nutrimento ad floſculos amenti, fiunt folia *calyces*.

Luxurians vegetatio folia e floribus continuando producit.

Gemmæ vix *frondeſcunt*, niſi defoliata arbore vel foliis ex climate mutationem paſſis.

Gemmæ ſæpius deſtruunt ſequentis anni flores, exfoliata æſtate arbore.

Gemmæ annuo ſpatio *præcociores* evadunt, exfoliata æſtate arbores.

Flos ex gemma, annuo ſpatio, foliis præcocior eſt.

INDEX

INDEX
PLANTARVM QVOAD TEMPVS QUO FLORENT.

JANUARIUS.

Bellis perennis. Jan.--Dec. pag. 368
Lichen pulmonarius 425
Ranunculus sceleratus. J.--Apr. 290
Tussilago farfara. Jan.--Mart. 363

FEBRUARIUS.

Alsine media. F.-Apr. 236
Asarum europæum. Febr.-May. 266
Bryum striatum, rurale, murale. F.-Mart. 423
Corylus avellana. Febr.-Apr. 399
Daphne mezereum 251
Hypnum complanatum, sericeum, serpens 424
Juniperus communis. F.--May. 410
Senecio vulgaris. Febr.--May. 364
Viola odorata. F.-Ap. 379

MARTIUS.

Aiuga reptans. Mart.-May. 293
Anemone nemorosa, & Apr. 288
Buxus semper virens 392
Cardamine pratensis. M.--May. 316
Chrysosplenium alternifolium. M.--May. 257
Cornus mas 194
Cochlearia officinalis. M.-Apr. 314
Drapa verna. M.-Apr. 312
Leontodon taraxacum. M.-May. 349
Ornithogalum minimum luteum, & Apr. 242
Prunus armeniaca & Apr. 271
Pulmonaria officinalis, & May. 199
Ranunculus ficaria 290
Ribes grossularia, & A. 214
Salix alba, M.-Apr. 406
Sisymbrinm nasturtium aquaticum. M.-Jun. 317
Thlaspi bursa pastoris. M.-Dec. 314
Tussilago petasites 363
Ulmus campestris, & Apr. 218
Valeriana locusta. M.-May. 174
Viola canina, Mart.-May. tricolor, Mart.-Jun. 379
Viscum album 406

APRILIS.

Adoxa moschatellina 253
Amaranthus blitum. Apr.--Jun. 395
Betula alba, alnus 391
Briza media, & May. 182
Caltha palustris, & May. 291
Carum carvi, A.-Jun. 233
Cerastium arvense 264
Chærophyllum silvestre, & May. 231

Chei-

Cheiranthus cheiri 318
Crocus vernus 174
Equiſetum arvenſe 418
Fagus caſtanea, ſylvatica, Ap.--May. 397
Fragaria veſca & May. 278
Glechoma hederacea, & May. 296
Hypnum proliferum 424
Jungermannia complanata 424
Levcoium vernum 239
Lichen vulpinus 426
Lithoſpermum officinale & May. 198
Marchantia polymorpha 425
Morus alba, nigra, Ap. & May. 394
Paris quadrifolia, & May. 253
Primula veris, & May. auricula & Sept. 202
Prunus padus, ſpinoſa, & May. 271
Ribes rubrum, nigrum, & May. 213
Salix viminalis. Ap.-May. 405
Spergula arvenſis 265
Tulipa gesneriana, & May. 241

MAJUS.

Acer pſeudo-platanus, campeſtre 414
Actæa ſpicata 280
Adonis autumnal. æſtival. M.--Jun. 289
Aegopodium podagraria. M.-- Jun. 234
Agroſtis capillaris 180
Aira aquatica 131
Ajuga pyramidalis 293
Alchemilla vulgaris. M.-- Aug. 195
Alopecurus pratenſis. M. & Jun. 179
Alyſſum incanum 315
Anchuſa officinalis. M. & Jun. 198
Anthemis nobilis. M. & Jun. 371
Anthoxanthum odoratum, & paniculat. 172
Anthyllis vulneraria. M.-- Jun. 332
Antirrhinum cymbalaria 308
Aquilegia vulgaris. M. & Jun. 386
Ariſtolochia clematis. M. & Jun. 385
Arum maculatum 385
Aſclepias vincetoxicum. M. & Jun. 217
Aſparagus officinalis. M. & Jun. 243
Aſperula odorata. M. & Jun. 191
Aſphodelus ramoſus 242
Avena elatior. M.-Jul. 185
Berberis vulgaris. M. & Jun. 246
Braſſica campeſtris. M.-- Jun. 321
Bromus tectorum. 185
Callitriche verna. 164
Campanula rotundifolia. M.--Aug. 205
Carex arenaria, vulpina, limoſa, ceſpitoſa, veſicaria 390
Cheiranthus incanus. M.-- Jun. 318
Chelidonium majus M.. & Jun. 283

Chenopodium bonus henricus. M. & Jun. 218
Chryſanthemum Levcanthemum. M.--Jun. 370
Ciſtus helianthemum. M. & Jun. 283
Cornus ſanguinea. M. & Jun. 194
Convallaria polygonatum, maialis, biflora. M.--Jun. 243
Cratægus torminalis, oxyacantha. 273
Crepis tectorum, biennis. M.--Jun. 351
Cynogloſſum officinale. M. & Jun. 199
Dactylis glomerata. M. & Jun. 183
Datura ſtramonium. M.--Sept. 208
Equiſetum fluviatile 418
Eriophorum polyſtachyon 177
Evonymus europæus 213
Euphorbia eſula, peplus. M.--Dec. 269
Feſtuca ovina. M.--Sept. rubra, fluitans M.-Jul. 184
Fumaria officinalis. M.--Jun. 329
Galeopſis galeobdolon 298
Geniſta tinctoria, germanica. M.--Jul. 331
Geranium pratenſe, ſanguineum, robertianum. M. & Jun. 324
Geum rivale 279
Gnaphalium arenarium, dioicum. 361
Hedyſarum onobrychis. M.-Jun. 339
Helleborus foetidus. M.--Aug. 291
Heracleum ſphondylium 226
Heſperis inodora 319
Hieracium piloſella, auricula, umbellatum 350
Hippocrepis comoſa 338
Hordeum murinum. M. & Jun. 188
Hyacinthus non ſcriptus, botryoides 244
Hyoſciamus niger. M. & Jun. 208
Iris germanica, pſeudacorus 175
Iſatis tinctoria. M.-Jun. 323
Lamium purpureum. M.--Dec. 297
Lathyrus pratenſis 334
Lemna minor. M.-Jul. 387
Liguſtrum vulgare 165
Linum catharcticum. M. & Jul. 237
Lithoſpermum arvenſe 198
Lonicera caprifolium, periclymenum, xyloſteum 206
Lotus corniculatus 341
Melampirum arvenſe. M.-Jun. 307
Melica nutans. M. & Jun. 181
Mercurialis perennis, annua 400
Milium effuſum 180
Myoſotis arvenſis 197
Narciſſus poeticus 239
Ophiogloſſum vulgatum. M. & Jun. 419
Ophrys nidus avis, ovata M. & Jun. 383

Orchis bifolia, coriophora, latifolia, maculata. M.--Jun. 382
Orobanche maior. M.-Jul. 310
Orobus vernus, tuberoſus. M.--Jun. 334
Osmunda lunaria 419
Oxalis flos cuculi 264
Parietaria officinalis. M. & Jun. 411
Phaſeolus vulgaris. M. -- Jul. 332
Phalaris arundinacea 178
Phytevma ſpicata. M. & Jun. 205
Pinus picea, abies 401
Piſum ſativum. M.-Jun. 333
Plantago maior & Jun. media, lanceolata 193
Poa anguſtifolia, pratenſis & Jun. compreſſa & Aug. 182
Poeonia officinalis 284
Polygala vulgaris. M. -- Jun. 330
Polyganum biſtorta 252
Populus tremula, nigra 409
Potentilla anſerina. Maj.-- Sept. 274
Prunus avium, ceraſus, & Jun. 272
Pyrola rotundifolia & Jun. 257
Pyrus communis, malus, cydonia, & Jun. 274
Quercus robur 396
Ranunculus acris, repens 290
Raphanus ſativus. M.-Aug. raphaniſtrum. M.-Sep. 322
Rhamnus catharcticus, frangula & Jun. 212
Rhinanthus criſta galli & Jun. 306
Reſeda lutea, luteola, & Jun. 268
Salix triandra, arenaria 405
Salvia pratenſis. M.-Aug. 171
Sanguiſorba officinalis & Jun. 194
Saxifraga granulata 257
Scabioſa arvenſis. M.-Aug. 190
Scandix pecten veneris, chærefolium 230
Sinapis arvenſis 321
Silene nutans & Jun. 261
Siſymbrium ſophia. M. -- Jun. 317
Solanum dulcamara & Jun. 210
Symphitum officinale. M.-Aug. 200
Stellaria graminea 261
Syringa vulgaris, perſica 166
Theſium linophyllon & Jun. 215
Thlaſpi arvenſe 314
Thymus ſerpyllum. M.-- Jul. 303
Tormentilla erecta 279
Tragopogon pratenſe. M.-Jun. 346
Trifolium pratenſe. M. -- Aug. 340
Vaccinium myrtillus & Jun. 250
Valeriana dioica, officinalis & Jun. 173
Veronica ſpicata, ſerpyllifolia, teucrium, officinalis, beccabunga, & Jun. anagallis aquatica. M.-- Sept. 167
Viburnum lantana, opulus aquatica & Jun. 235
Vinca minor & Jun. 216

JUNIUS.

Achillea ptarmica. J. & Jul. 372
Aconitum lycoctonum, & Jul. 285
Aethusa cynapium, & Jul. 229
Agrimonia eupatorium. J.-Sept. 268
Agrostis spica venti 180
Aira cærulea, cespitosa 181
Allium porrum, & Jul. 240
Anagallis arvensis 204
Anemone pulsatilla, pratensis, hortensis. 287
Anthemis arvensis. J.-Aug. cotula, tinctoria, & Jul. 372
Anthericum ramosum, & Jul. 242
Apium graveolens, & Jul. 234
Arbutus uredo 256
Arenaria trinervia 261
Arnica montana. J.-Aug. 367
Asperugo procumbens 201
Asplenium scolopendrium, ruta muraria 420
Aster alpinus 364
Atriplex hortensis 412
Atropa belladonna, & Jul. 210
Avena fatua, pratensis 185
Ballota nigra. J.-Sept. 300
Beta vulgaris 218
Borrago officinalis, & Jul. 200
Brassica oleracea J.-Aug. 321
Bromus secalinus, pinnatus 185
Bryonia alba. J. & Jul. 404
Butomus umbellatus, & Jul. 254
Calendula arvensis 316
Carduus tuberosus 355
Carex brizoides 390
Centaurea moschata, cyanus, scabiosa, jacea, benedicta Jun. & Jul. 375
Cerastium viscosum 264
Chenopodium album 218
Chrysanthemum montanum 370
Conium maculatum 224
Convolvulus arvensis, sepium, & Jul. 204
Coriandrum sativum 230
Cynosurus cristatus 183
Cytisus cajan, nigricans. J. & Jul. 337
Daucus carota & Jul. 223
Delphinium consolida, & Jul. 285
Dianthus carthusianorum, & Jul. 259
Dictamnus albus 255
Drosera rotundifolia 237
Echium vulgare 202
Erisymum officinale. Jun.-Aug. 318
Ervum lens, hirsutum 336
Eryngium campestre 220
Euphorbia exigua, acuta. J.--Sept. 269
Galium verum, aparine, & mollugo Jul. 192
Gentiana centaurium J.--Sept. 219
Geranium palustre 324
Geum urbanum 279
Gratiola officinalis. Jun. & Jul. 168
Hesperis matronalis 319
Hieracium paludosum 350

Hip-

Hippuris vulgaris 163
Holcus lanatus. J. & Jul. 413
Hordeum vulgare 188
Hypericum perforatum; J.-Sept. hirſutum Jun. & Jul. 343
Hyoſeris foetida 251
Humulus lupulus 407
Jaſione montana. Jun. & Jul. 378
Jasminum fruticans 165
Juncus conglomeratus, & Jul. 245
Lactuca perennis 348
Lapſana communis 352
Lathyrus odoratus. J.-Aug. tuberoſus. J. & Jul. 334
Lepidium latifolium. Jun.-Aug. 313
Liguſticum leviſticum 226
Linum uſitatiſſimum 237
Lolium perenne. J.-Sept. 186
Lotus ſiliquoſus 341
Lycopodium ſelago 421
Lycopus europæus: & Jul. 169
Lyſimachia numularia 203
Malva ſylveſtris. J.--Aug. 326
Medicago ſativa, falcata. Jun. & Jul. 342
Myagrum ſativum. Jun. & Jul. 312
Myoſotis ſcorpioides 197
Narciſſus tazetta, jonquilla 239
Nicotiana ruſtica & Jul. 209
Nymphaea lutea & Jul. 282
Oenanthe crocata, & Jul. 228
Ornithopus perpuſillus 338
Papaver rhoeas, ſomniferum & Jul. 281
Pedicularis paluſtris 307
Phalaris canarienſis 178
Phellandrium aquaticum. J.--Sept. 228
Phyſalis alkekengi 210
Picris hieracioides 346
Piſum arvenſe. J. & Jul. 333
Polygonum perſicaria. J.--Sept. 252
Polypodium filix mas. Jun.-Sept. 420
Potentilla reptans 278
Poterium ſanguiſorba 395
Portulaca oleracea 266
Prunus domeſtica, & Jul. 272
Prunella vulgaris 305
Roſa centifolia J.-A. canina, alba & Jul. 276
Rosmarinus officinalis. 170
Rubus idæus, fruticoſus & Jul. 277
Rumex acutus J.-Aug. acetoſa, acetoſella & Jul. 246
Ruta graveolens 255
Sagina procumbens. Jun.-Sept. 196
Salvia officinalis, & Jul. 171
Sambucus nigra 235
Sanicula europæa, & Jul. 220
Scabioſa ſucciſa, & Jul. columbaria, J.-Aug. 191
Scorzonera humilis, hiſpanica 346
Scrophularia nodoſa. J. & Jul. 309
Scutellaria galericulata. J.-Aug. 304
Secale cereale 187
Sedum rupeſtre, album 262

Sinapis nigra 322
Solanum Lycoperſicum, & Jul. 211
Sonchus oleraceus. Jun.--Aug. 347
Sorbus domeſtica 273
Spartium ſcoparium 330
Spiræa filipendula, ulmaria & Jul. 275
Teucrium chamædris & Jul. 293
Thalictrum flavum 288
Tilia europæa, & Jul. 282
Trigonella foenum græcum 342
Triticum repens 188
Trollius europæus 290
Tropæolum minus. Jun.--Aug. 249
Turritis glabra 320
Urtica urens, dioica 393
Valantia aparine 413
Valeriana phu 173
Verbaſcum thapſus, & Jul. 207
Veronica anagallis, aquatiea Jun. 167
Vicia cracca, ſativa, ſepium, faba 335
Vitis vinifera & Jul. 214

JULIUS.

Achillæa millefolium. J.--Sept. 373
Aconitum napellus 285
Æſculus hippocaſtanum 248
Allium vineale, cepa 240
Aliſma plantago aquatica. J.-Sept. 248
Althæa officinalis 325
Amaranthus caudatus 394
Anagallis ſcammonia 204
Angelica ſilveſtris 227
Anethum graveolens, foeniculum 232
Antirrhinum linaria 308
Apocynum cannabinum 216
Arabis alpina 320
Arctium lappa. Jul. & Aug. 354
Artemiſia abſynthium, vulgaris. Jul. & Sept. 360
Aſtrantia major, & Aug. 221
Aſtragalus glycyphyl. 339
Aſperula arvenſis 192
Avena flaveſcens 185
Betonica officinalis 298
Bidens cernua. Jul. & Aug. 358
Bupleurum rotundifolium 221
Calendula officinalis. Jul.-Sept. 376
Campanula rapunculus, trachelium. & Aug. 205
Carduus nutans. Jul. & Aug. 355
Carlina acaulis 357
Carthamus tinctorius. Jul. & Aug. 357
Chara vulgaris 386
Cichorium intybus, endivia 353
Cicuta viroſa, & Aug. 229
Clematis vitalba, flammula 288
Clinopodium vulgare, & Aug. 301
Conyza ſquarroſa. Jul. & Aug. 362
Coronilla varia. J.-Aug 337
Cucubalus behen 260
Cucumis melo, ſativus 403
Cucurbita lagenaria, pepo, verrucoſa, citrullus 402
Cynara ſcolymus. Jul. & Aug. 356
Cypripedium calceolus 384

Dian-

Dianthus caryophillus, plumarius, & Aug. 260
Digitalis purpurea. J.-Aug. 310
Dipsacus fullonum 190
Doronicum plantagineum 368
Epilobium hirsutum, & Aug. 250
Erica vulgaris, & Aug. 251
Erigeron acre. Jul.-Sept. 362
Euphrasia officinalis. Jul.-Sept. 306
Gentiana lutea, & Aug. 219
Helianthus annuus, multiflorus, tuberosus. J.-Sept. 374
Hyssopus officinalis 294
Jasminum officinale 165
Impatiens balsamina. Jul.-Oct. noli me tangere. Jul.-Sept. 380
Inula helenium, dysenterica Jul. & Aug. 366
Juglans regia 398
Laserpitium latifolium 225
Lathyrus silvestris 335
Lavandula spica 295
Lemna colyrhiza 387
Leonurus cardiaca 301
Leontodon autumnale. J.-Sept. 353
Lunaria annua 316
Lilium candidum, bulbiferum, martagon 241
Lycopodium clavatum 421
Lythrum salicaria 267
Malva alcæa. J.-Aug 326
Matricaria parthenium, chamomilla 371
Melissa officinalis 303
Menianthes trifoliata 203
Mentha crispa, & Aug. 296
Monarda fistulosa: & Aug. 270
Monotropa hypopithys 256
Myriophyllum spicatum 395
Nepeta cataria & Aug. 295
Nicotiana tabacum, & Aug. 209
Nigella sativa 287
Nymphæa alba 282
Ocymum, basilicum. J.-Aug. 304
Ononis spinosa. J.-Sept. 331
Onopordum acanthium Jul. & Aug. 356
Origanum majorana, vulgare. J.-Sept. 302
Panicum verticillatum, crus galli 178
Pastinaca sativa 231
Peucedanum officinale 225
Philadelphus coronarius 271
Phleum pratense 179
Phytolacca decandra 265
Pimpinella saxifraga. J.-Sept. 233
Pinus silvestris 400
Polygonum fagopyrum 252
Potamogeton natans 196
Prenanthes purpurea 349
Reseda odorata 268
Rubia tinctorum 193
Sambucus ebulus 235
Saponaria officinalis 259
Satureja hortensis 294
Satyrium viride 382
Scirpus palustris, lacustr. 176
Scherardia arvensis, & Aug. 191
Sempervivum tectorum, & Aug. 270
Senecio jacobæa, saracenicus, Jul. & Aug. 364

Serapias longifolia, J. & Aug. 384
Serratula arvenſis 354
Solanum nigrum 211
Spiræa aruncus 275
Stachys germanica, & Aug. 299
Tagetes patula, erecta. J.-Sept. 369
Tanacetum vulgare 359
Teucrium ſcordium 293
Tordylium anthriſcus 222
Trifolium hybridum, arvenſe, melilotus officinalis. J.-Sept. 340
Trigonella corniculata 341
Tropæolum majus 249
Typha latifolia, anguſtifolia 388
Utricularia vulgaris. Jul.-Aug. 168
Verbaſcum nigrum, & Aug. 207
Verbena officinalis: & Aug. 169

AUGUSTUS.

Alcæa roſea 325
After amellus. Aug. & Sept. annuus, mutabilis, chinenſis. 365
Athamanta cervaria, orcoſelinum 224
Arundo phragmitis 186
Bidens tripartita. Aug. & Sept. 358
Cannabis ſativa 407
Carlina vulgaris. Aug. & Sept. 357
Carduus paluſtris 355
Caucalis grandiflora 223
Colchicum autumnale, & Sept. 247
Coreopſis bidens, Aug. & Sept. 374
Cuſcuta europæa 196
Epilobium paluſtre 250
Eupatorium cannabinum 358
Filago arvenſis, leontopodium, Aug. & Sept. 377
Galeopſis ladanum & Sept. 298
Globularia vulgaris 189
Gnaphalium ſylvaticum 361
Juncus campeſtris 245
Lactuca ſativa 348
Lolium temulentum 187
Lycopſis arvenſis 201
Lyſimachia vulgaris 203
Marrubium vulgare 300
Mentha arvenſis, & Sept. 296
Mirabilis jalappa, & Sept. 207
Parnaſſia paluſtris A.-Sept. 236
Polypodium filix femina 421
Pteris aquailina 420
Schœnus mariſcus 176
Scleranthus perennis 258
Scrophularia aquatica. A.-Sept. 309
Sedum telephium 262
Serratula tinctoria 354
Sium latifolium 227
Solidago virga aurea 366
Sonchus arvenſis 347
Sparganium natans 388
Stachys ſylvatica 299
Stellaria nemorum 261
Trifolium repens 340
Triglochin paluſtre 247
Zea mais 389

SEPTEMBER.

After dumoſus 365
Gypſophyla muralis 258

He-

Hedera helix 214
Helleborus niger. S.-Dec. 291
Hypochœris radicata 352
Scleranthus annuus 258

OCTOBER.

Callitriche autumnalis 164
Crocus officinalis 174
Polypodium vulgare 420

NOVEMBER.

Bellis perennis. Jan.-Dec. 368.

DECEMBER.

Helleborus hyemalis 291
Lichen pulmonarius 425

INDEX
GENERVM ET SPECIERVM
LATINVS.

Abſinthium pag. 360
Acer 414
Acetoſa 246
Acetoſella 263. 246
Achillea 372
Aconitum 285
Acorus 244
Actæa 280
Acroſtichum 419
Adonis 289
Adoxa 253
Aegopodium 234
Aeſculus 248
Aethuſa 229
Agaricus 427
Agrimonia 267
Agroſtema 263
Agroſtis 180
Aira 180
Aiuga 292
Alcæa 325
Alchemilla 195
Aliſma 247
Allium 239
Alkekengi 210
Alnus 391
Alopecurus 179
Alſine 236
Althæa 324
Alyſſum 315
Amaranthus 394
Anagallis 203
Anchuſa 198
Anemone 287
Anethum 232
Angelica 226
Anthemis 371
Anthericum 242
Antirrhinum 307
Anthoxanthum 172
Anthyllis 331
Apium 233
Apocynum 216
Aquilegia 286
Arabis 319
Arbutus 256
Arctium 353
Arenaria 261
Ariſtolochia 384
Arnica 367
Artemiſia 359
Arum 385
Arundo 186
Aquilegia 286
Aſarum 266
Aſclepias 216
Aſparagus 243
Aſperugo 200
Aſperula 191
Aſphodelus 242
Aſplenium 420
Aſter 364
Aſtragalus 339
Aſtrantia 220
Athamantha 224
Atriplex 412
Atropa 209
Avena 185
Ballotta 299
Balſamina 379
Baſilicum 304
Belladona 209

Bellis 368
Berberis 245
Beta 218
Betonica 298
Betula 390
Bidens 357
Biſtorta 252
Blitum 164
Bolétus 428
Borrago 200
Braſſica 320
Briza 182
Bromus 184
Bryonia 403
Bryum 423
Bupleurum 221
Burſa paſtoris 314
Butomus 254
Buxus 392
Byſſus 427
Calendula 376
Callitriche 163
Caltha 291
Campanula 204
Cannabis 407
Capſicum 211
Cardamine 316
Carduus 355
Carex 389
Carlina 356
Carota 223
Carpinus 398
Carum 232
Caryophyllus 259
Carthamus 357
Caucalis 222
Centaurea 374
Centaurium 219
Cepa 240
Ceraſtium 264
Cerefolium 230
Chamomilla 371
Chara 386
Chærophyllum 231
Chondrilla 348
Cheiranthus 318
Chelidonium 280
Chenopodium 217
Chryſanthemum 369
Chryſoſplenium 257
Cichorium 353
Cicuta 228
Circæa 166
Ciſtus 283
Clavaria 429
Clematis 288
Clinopodium 301
Cochlearia 314
Colchicum 247
Conferva 427
Conium 223
Convallaria 243
Convolvulus 204
Conyza 361
Coreopſis 374
Coriandrum 229
Coronilla 337
Cornus 194
Corylus 399
Cratægus 272
Crepis 350
Crocus 174
Cucubalus 260
Cucumis 402
Cucurbita 401
Cuſcuta 195
Cyanus 375
Cynara 356
Cynogloſſum 198
Cynoſurus 183
Cypripedium 384
Cytiſus 336
Dactylis 183
Daphne 251
Datura 208
Daucus 223

Del-

Delphinium 284
Dianthus 259
Dictamnus 254
Digitalis 309
Dipsacus 189
Doronicum 367
Drapa 312
Drosera 237
Ebulus 235
Echium 201
Elvela 429
Endivia 353
Epilobium 249
Equisetum 418
Erica 250
Erigeron 362
Eriophoron 177
Ervum 336
Eryngium 219
Erysimum 317
Esula 269
Eupatorium 358
Euphorbia 269
Euphrasia 306
Euvonymus 212
Fagopyrum 252
Fagus 396
Farfara 363
Festuca 183
Filago 377
Fœniculum 232
Fœnum græcum 342
Fragaria 277
Fraxinus 415
Fucus 426
Fumaria 328
Galeopsis 297
Gallium 192
Genista 330
Gentiana 219
Geranium 323
Geum 279
Glechoma 296
Globularia 189
Gnaphalium 360
Gratiola 167
Gypsophyla 258
Helleborus 290
Hedera 214
Hedysarum 338
Helenium 366
Helianthus 373
Heracleum 225
Hesperis 318
Hieracium 350
Hippocastanum 248
Hippocrepis 338
Hippuris 163
Holcus 412
Hordeum 187
Humulus 407
Hyacinthus 244
Hydnum 428
Hyoscíamus 208
Hyoseris 251
Hypericum 343
Hypochæris 352
Hypnum 423
Hyssopus 294
Iacobæa 364
Iasione 377
Iasminum 164
Iberis 314
Illecebrum 215
Impatiens 379
Inula 366
Iris 174
Isatis 322
Iuglans 397
Iungermania 424
Iuniperus 410
Iuncus 245
Lactuca 347
Lamium 297
Lapsana 352
Laserpitium 225

La-

Lathyrus 334
Lavandula 295
Lemna 386
Leontodon 349
Leonurus 300
Lepidium 313
Levcoium 238
Lichen 425
Liguſticum 226
Liguſtrum 165
Lilium 240
Linaria 308
Linum 237
Lithoſpermum 197
Lolium 186
Lonicera 206
Lotus 340
Lunaria 315
Lychnis 263
Lycoperdon 429
Lycopodium 421
Lycopſis 201
Lycopus 169
Lythrum 267
Lyſimachia 203
Malva 325
Marchantia 425
Marrubium 300
Matricaria 370
Medicago 342
Melampyrum 306
Melica 181
Melitotus 340
Meliſſa 303
Mentha 296
Menyanthes 202
Mercurialis 409
Meſpilus 273
Millefolium 372
Milium 179
Mirabilis 206
Mnium 422
Monarda 169
Monotropa 255
Morus 393
Mucor 430
Myagrum 311
Myoſotis 197
Myoſurus 238
Myriophyllum 394
Napellus 285
Narciſſus 239
Naſturtium aquaticum 317
Nepeta 295
Nicotiana 209
Nigella 286
Nummularia 203
Nymphæa 281
Orchis 381
Ocymum 303
Oenanthe 227
Ononis 331
Onopordum 355
Ophiogloſſum 419
Ophrys 383
Orchis 381
Oreoſelinum 224
Origanum 301
Ornithogalum 241
Ornithopus 337
Orobanche 310
Orobus 333
Osmunda 419
Oxalis 262
Pæonia 283
Panicum 178
Parietaria 411
Paris 252
Parnaſſia 236
Paſtinaca 231
Papaver 281
Pedicularis 307
Petaſites 365
Petroſelinum 233
Perſicaria 252
Peucedanum 224

Pe-

Peziza 429
Phalaris 177
Phallus 428
Phaſeolus 332
Phellandrium 228
Philadelphus 270
Phleum 178
Phyſalis 210
Phytevma 205
Phytolacca 265
Picris 346
Piloſella 350
Pimpinella 233
Pinus 400
Piſum 332
Plantago 193
Poa 181
Polygala 328
Polygonum 251
Polypodium 420
Polytrichum 422
Populus 408
Porrum 240
Portulaca 266
Potamogeton 196
Potentilla 278
Poterium 395
Prenanthes 348
Primula 202
Prunella 304
Prunus 271
Pteris 420
Pulmonaria 199
Pulſatilla 287
Pyrola 256
Pyrus 274
Quercus 396
Ranunculus 289
Raphanus 322
Reſeda 268
Rhamnus 211
Rheum 253
Rhinanthus 305
Ribes 213
Roſa 276
Rosmarinus 170
Rubia 192
Rubus 277
Rumex 246
Ruta 255
Sagina 196
Salix 404
Salvia 170
Sambucus 235
Sanguiſorba 193
Sanicula 220
Saponaria 258
Satureja 294
Satyrium 382
Saxifraga 257
Scabioſa 375. 190
Scandix 230
Scherardia 191
Schœnus 175
Scirpus 176
Scleranthus 258
Scordium 293
Scorzonera 346
Scrophularia 308
Scutellaria 304
Secale 187
Sedum 262
Sempervivum 269
Senecio 363
Serapias 384
Serratula 354
Serpillum 303
Silene 260
Sinapis 321
Siſymbrium 317
Sium 227
Solanum 210
Solidago 365
Sonchus 347
Sorbus 273
Sparganium 388
Spartium 330
Sper-

Spergula 264
Sphagnum 422
Spinacia 406
Spiræa 275
Staehys 298
Stramonium 208
Stellaria 261
Symphytum 199
Syringa 165
Tagetes 368
Tanacetum 359
Taraxacum 349
Teucrium 293
Thalictrum 288
Theſium 215
Thlaſpi 313
Thymus 302
Tilia 282
Tordylium 221
Tormentilla 278
Tragopogon 345
Trapa 194
Tremella 426
Trifolium 339
Triglochin 247
Trigonella 341
Triticum 188
Trollius 290
Tropæolum 249
Tulipa 241
Turritis 320
Tuſſilago 362
Typha 387
Ulmus 218
Ulva 426
Urtica 392
Utricularia 168
Vaccinium 250
Valantia 413
Valeriana 172
Verbaſcum 207
Verbena 168
Veronica 166
Viburnum 234
Vicia 335
Viola 378
Vinca 215
Vincetoxicum 217
Viſcum 405
Vitis 214
Zea 388

INDEX
GENERVM ET SPECIERVM
GERMANICVS,

Ackerdiſtel 354
Ackerhaſenkohl 347
Ackerklee 222. 340
Achillenkraut 372
Ackerkrumhals 201
Ackerkümmel 263
Ackerpflanze 191
Ackerrösle 289
Ackerſalat 173
Ackerſchmielen 180
Ackervogelkraut 264
Ackerzwiebel 242
Aderſchwamm 428
Adonis 289
Adlerkraut 420
Aepfel 274
Aeſcherwurzel 255
Affodill 242
Aftermooſe 424
Aglei 286
Ahorn 414. 415
Alant 366
Albkraut 358
Allerbaum 408
Alpenkraut 320
Altbaum 271
Altmanskraut 362
Aliſſen 315
Amarant 394
Amarellen 271
Ampfer 246
Andorn 300
Angelic 227. 234
Anemonen 287
Angerblume 368
Apeldöeren 415
Apoſtemkraut 190
Apricoſen 271
Arle 391. 414
Arlsbeer 272
Armleuchter 386
Arnica 367
Aron 385
Artiſchocken 356 374
Aſchbaum 416
Aſcherwurzel 255
Aſclepiade 216
Aſpe 408
Aſtmoos 423
Aſtranz 220
Attich 235
Augentroſt 306
Augenwurzel 173
Auguſteiche 396
Aurickel 202
Bachblume 291
Bachbungen 167
Bärenklauwurz 226
Bärenzahn 349
Bärlappen 421
Baldrian 172
Ballote 299
Balſamkraut 379
Balſamine 379
Bandweide 405
Baſilien 305
Bathengel 293
Bathengen wilde 202
Baurenſenf 314 315
Baumflechte 425
Baumwinde 214
Baumwolle wilde 177
Baumwurzelſauger 256
Beberaſpe 409

Becher-

Becherblume 395
Becherſchwamm 429
Behen 260
Beinholz 206
Beinwel 199
Beisbeere 211
Benedictwurz 279
Bergandorn 299
Bergcymbelblume 384
Bergflockenblume 375
Berggeiswedel 275
Bergkreſſe 316
Bergmünze 301
Bermelte 164
Bergpeterſilie 224
Bergpfeffer 251
Bergranunkel 290
Bergruhrkraut 377
Bergſternkraut 367
Berufkraut 362 372
Beſchreykraut 362
Beſenkraut 317
Beſenkraut 330
Beſinge 250
Betauen 298
Bettelläuſe 222
Beifus 359
Bieberklee 203
Biebernell falſche 194
- - ächte 233
Bienenklee 340
Bienenkraut 303
Bienenſaug 297. 298. 299
Bilſenkraut 208
Binbaum 415
Bingelkraut 409
Binſen 177. 245
Binſekraut 247
Binſengras 247
Binſenwatte 177
Bircke 390
Birſch 406
Birn 274
Biſamdiſtel 355
Biſamflockenblume 375
Biſamhanenfus 253
Biſamkraut 253
Biſchofsmüze 429
Bitterkraut 346
Bitterſüſs 210
Bitterwurz 219
Blätterſchwamm 427
Blaſenſegge 390
Blumenkohl 321
Blutkraut 324. 395. 267
Blutwurz 278. 324
Bockerellen 210
Bocksbart 184. 275. 345
Bocksbeere 213
Bocksgeilen 382
Bochshorn 342
Bohnen 332
Bohnenkraut 294
Borragen 200
Boretſch 200
Boviſt 430
Braunheil 305
Brandlattich 363
Braunwurz 308
Breckendiſtel 220
Brenneſſel 393
Brennwurzel 251. 288
Brombeer 277
Bruchhopfen 408
Bruchkraut 268
Brugſegge 390
Bruchweide 405
Brunelle 304
Brunkreſſe 317
Bruſtwurz 226. 227
Briahorn 415
Buchampfer 263
Buche 396
Buchs 392
Buchweizen 252
Buck 360
Bufbohne 335
Bulkiskraut 298
Bürſtenpflanze 357

Burzelkraut 266
Buſchhopfen 408
Butterblume 349
Calmus 175. 244
Canarien-Gras 178
Capucinerle 249
Cardobenedicten 375
Cartheuſernelke 259
Caſtanien 397
Chamillen 371
Champignon 427
Chondrille 348
Chriſtophskraut 280
Chriſtwurz 291
Cichorie 353
Ciſtenrösle 283
Corallenſchwamm 429
Coriander 229. 287
Cornelle. Cornelkirſchenbaum 194
Coſtenkraut 347
Creuzblume 329. 382
Creuzpflanze 363
Creuzwurz 364
Cucumer 403
Dachflechte 426
Dachhauswurz 270
Dachpipau 351
Daphne 251
Dargras 413
Darmbeer 272
Degenkraut 388
Dill, Dilkraut 232
Diptam 254
Diſtel 189. 354. 355
Diſtelkohl 346
Dolkraut 208. 209
Donderbar 270
Donnerkraut 262
Dorant 307. 372
Doſten 301
Doſtenkraut 358
Dotter 312
Dotterblume 291
Drehkraut 221
Dreyblat 203
Dreyzack 247
Durchwachs 221
Dürenſtaude 410
Dürlizen 194
Durant 300
Dürwurz 362. 366
Eberwurz 356
Edel-Gamanderle 293
Edelleberkraut 313
Egelnkraut 203
Egen 240
Ehegürtel 427
Ehrenpreis 166
Eibiſch 324
Eiche 396
Einbeer 252
Einblat 236
Eiſenhütle, Eiſenhütte 285
Eiſenkraut 168. 318
Eiſerpäten 389
Eiſerich 169
Ellend 220
Ellern 391
Elrizen 272
Elſebeer 272
Elſebeerbaum 271
Endivien 353
Engelblume 290
Engelskraut 367
Engelſüs 420
Engelwurz 226
Entengras 184
Entengrün kleines 387
Enzian 219. 224. 404
Epheu 214
Eppich 233
Eplern 415
Erbſe 332
Erbſele 245
Erdäpfel 374
Erdbathengel 167
Erdbeer 277

Erd-

Erdbeerbaum 256
Erdbirn 211
Erdeicheln 334
Erdfeigen 334
Erdgalle 219
Erdmäusgen 334
Erdnus 334
Erdrauch 328
Erle 391
Erven 333
Esbarer Schwamm 427
Eſche 415
Eſcherizen 273
Eſchern 415
Eſelsfurz 355
Eſelsmilch 269
Eſſichdorn 246
Eſpe 408
Eſpercette 339
Eupforbien 269
Fackelkraut 207
Fadenkraut 377
Falkraut 367
Falſcher Salat 352
Faltenſchwamm 429
Farren 419. 420
Farrenkräuter 418. 420
Färberbeere 212
Färberblume gelbe 331
Färbergniſt-Pfriemen 331
Färbergras 268
Färberkrap 193
Färberkraut 358
Färberröthe 193
Färberwayd 323
Faulbaum 212
Federball 394
Federbinſen 177
Federkraut 395
Feigwarzen-Wurz 309
Felben 405
Felbinger 404
Feldampfer 246
Feldcamille 371
Feldcypreſſe 410
Felddarmkraut 264
Feldkümmel 303
Feldkrap 174
Feldmohn 281
Feldochſenzunge rauhe 201
Feldrösle 289
Feldzwiebel 242
Femel 408
Fenchel 232
Ferkelkraut 352
Fettehenne 262
Feuerbaum 410
Feuerrösle 289
Feuerſchwamm 428
Fichte 400. 401
Fieberklee 203
Fieberkraut 219. 304
Fingerhut 309
Fiſcherweide 405
Fiſchrancken 309
Flachs 237
Flachsgras 177
Flachskraut 308
Flachsſeide 195
Fladergras 180
Flaſchenkürbis 402
Flatteraſpe 409
Flavie 172
Flechte 425
Fleiſchblume 264. 306
Flieder 165
Fliederbaum 235
Fliegenbaum 218
Fliegenleim 218
Fliegenſchwamm 427
Flittergras 182
Flöhkraut 252
Flöhpflanze 361
Flockgras 179
Flockenbinſen 177
Flockenblume 374. 375
Flügelfarn 420
Flugſand 389

Flusblume 361
Fluskannenkraut 418
Fluskraut 196
Flutgras 179
Fœnugræc 339
Fœnick weiſſer 179
Forchen 400
Frauenmantel 195
Frauenſchuh 384
Freyſamkraut 379
Froſchlöffel 247
Fuchsſchwanz 179. 267. 394
Fünffingerkraut 278
Fürenholz 400
Futerwicke 335
Gänſeblume 368. 370
Gänſediſtel 347
Gänſefus 217
Gänſekraut 319
Gänſerich 278
Galgant teutſcher 176
Gallerte 426
Gamander 293
Garböckle 379
Garteniſop 294
Gartenwegwarten 353
Gauchampfer 263
Gauchblume 264. 316
Gauchheil 203
Geisbart 275. 429
Geisblat 206
Geisfus 234. 275
Geiskle 336
Geiswedel 275
Gelbkraut 306
Gelbe Münze 362
Gelbe Rheinblume 361
Gelbe Rüben 223
Gelber Veil 318
Gemswurz 367
Genſt 330
Gerſch 234
Gerſte 187
Gilblume 372
Gichtbeere 213
Gichtroſe 284
Gichtſchwamm 428
Gideon 237
Ginſter 406. 330
Gitterſchwamm 429
Glasglöckle 205
Glanzgras 177
Glaskraut 411
Gleiſſe 229
Gliedweich 260
Glitſch 305
Glockenblume 204. 205
Gnadenkraut 167
Gniſtkraut 330
Gniſter 330
Goldblume 290
Goldhaar 422
Goldkraut 364
Goldmilz 257
Goldrutte 365
Goldwurzel 241
Gondelbeer 250
Gotheil 305
Graskraut 247
Grasleder 427
Grashirſe 181
Graslauch 240
Graswurzel 188
Græmenholz 401
Griechiſch Heu 342
Grindwurz 246
Grundbirn 211
Grundfeſte 350
Grundheil 224
Grüner Kohl 321
Grünſing 278
Gukugsblume 264
Gulden Wiederthon 422
Gulden Wunderkraut 366
Gundelrebe 296
Gundermann 296. 167
Günſel 292
Gurcke 402

Gürtelkraut 421
Guter Heinrich 217
Gypskraut 258
Haarmoos 422. 427
Haasenöhrle 221
Haber 185
Haberdistel 354
Habermauchele 346
Haberwurz 346
Habichtkraut 347. 350
Härtern 194
Haftdolde 223
Hagbuche 398
Hagebutten 276
Hagedorn 272. 273
Hahnenfus 178
Hahnkamm 305
Handkürbsen 404
Hanenkamm-Klee 339
Hanenkopf 339
Hanenfus 178. 289
Hanensporn 379
Hanf 407
Hanfkraut 358
Hanfnessel 298
Hanfwürger 310
Hartheu 343
Harnkraut 268. 308
Hartreder 194
Hartriegel 165. 194
Hartschwingel 184
Harstrang 224
Haselstaude 399
Haselwurz 266
Hasenbrod 182
Hasenkohl 346. 347
Hasenklee 332. 340
Hasenöhrle 221
Hasenpappel 326
Hasenpfötchen 340
Hasenstrauch 348
Hauhechel 331
Hauslaub 269
Hauswurz 262. 270
Hechtzahn 298
Heckenkirsche 206
Heckenkörfel 222
Hederich 317. 321. 322
Heide 250
Heidekorn 252
Heidelbeer 250
Heidelattich 348
Heiden-Isop 283
Heidewicke 335
Heidenschmuck 283
Heilkraut 225. 293
Heister 396
Heiternessel 393
Heilwurz 279
Hemst 324
Herrenblume weisse 236
Hermel 371
Herzfreud 191
Herzgespan 301
Hexenkraut 166. 268. 343
Hezdnisch Wundkraut 366
Himmelbrod 340
Himmelfartsblume 329
Himmelsschlüssel 202
Hindbeer 277
Hinfus 234
Hirschdorn 212
Hirschengras 179
Hirschgunsel 358
Hirschholder 235
Hirschklee 358
Hirschkraut 210
Hirschwurzel 224
Hirtentäschlein 314
Hirschzunge 420
Holder 235
Holderhetteln 235
Hollunder 235
Holzäpfelbaum 275
Holzbirn 274
Holzmangold 256
Holzwurz 385
Honiggras 412

Honigklee 341
Honigwicken 334
Hopfen 407
Hornklee 341
Hornkraut 264
Hufeiſen 338
Huflattich 362
Hünerdarm 204. 236. 261. 264
Hünertritt 204
Hünerwurz 324
Hundelauch 240
Hunderibbe 193
Hundlattichsblume 349
Hungerblümgen 312
Hungerkraut 246
Hundsbaum 271
Hundsbeerſtrauch 194
Hundsgras 183. 188
Hundskirſche 206
Hundskohl 216. 349
Hundslattich 349
Hundslausbaum 212
Hundsläuſte 353
Hundspeterlein 229
Hundsviolen 379
Hundszunge 198
Hure nackende 247
Hyacinthe 244
Jachandelbaum 410
Jacobsblumkraut 364
Jalappen falſche 207
Jaſione 377
Jasmin 164. 270. 271
Jberpflanze 314
Je länger je lieber 197. 210
Jeruſalems-Artiſchocke 374
Jerichoroſe 206
Jeſſel 234
Igelskolben 388
Indianiſcher Pfeffer 211
Indianiſcher Kreſſe 249
Jngrün 216
Ingwer teutſcher 385
Immergrün 214
Johannisbeer 213
Johannisblume 370
Johannisblut falſches 258
Johanniswedel 275
Johannispflanze 343
Jonquille 339
Jpernbaum 218
Jſpenholz 218
Jſpen 294
Jſop 294
Judasohr 426
Judenfeder 177
Judenkirſchen 210
Jungermannie 424
Kaddigbaum 410
Kälberkropf 231
Kalbsauge 370
Kammgras 183
Kannenkraut 418
Karten 189
Kazengeſichte 297
Kazenklee 332
Kazenkorn 188
Kazenmünze 295
Kazenpfötgen 361. 377
Kazenwedel 419
Kazenwurzel 173
Kazenzügel 418
Kellerhals 251
Kermesbeer 265
Kern 231
Kaſten 248
Keulſchwamm 429
Kichern 333
Kienbaum 400
Kiefe 401
Kiefern 400
Kirſchen 271
Klapper 306
Klaproſen, Klaſchroſen 281
Klebkraut 192. 201. 413.

Klebnelke weiſſe 261
Klee 332. 339
Klette, Klettenwurz 353
Klettenkörbel 222
Knabenkraut 262. 381
Knauel 258
Knaulgras 183
Kniſter 406
Knoblauch 239
Knötelbaum 274
Knotenblume 238
Knöterich 251. 265
Knotenmoos 423
Knorpelblume 215
Königskerze 207
Körbel 230. 231
Köſtenbaum 397
Kohl 320. 352
Kohlrabe 321
Kolbengras 179
Kolbenmoos 421
Kopfſalat 348
Korbweyde 405
Kornblume 375
Kornnägele 263
Kornelle 194
Kornröslen 263
Kornroſen 281
Kornwuth 298
Kranichkraut 351
Krap 193
Kranwebbaum 410
Krausbeer 213
Kranzbeer 277
Krebswurz 252
Kreſſe Kreſſig 249. 313. 316
Kreuzdorn 212
Krötendill 372
Krötengras 247
Kronenwicke 337
Kropfrancken 309
Krumhals 201
Kuchenſchelle 287
Kuhblume 291
Kuhbüz 428
Kuhweizen 306
Kugelblume 189
Kugelſchwamm 429
Kümmmel 232
Kürbis 401
Labkraut 192
Lachenknoblauch 293
Lämmerohren 217
Lämmerſalat 173
Laſerkraut 225
Lattich zahmer 347
- - wilder 174. 349
Lauch zahmer 240
Läuſekraut 306. 307
Lavandel 295
Leberblume 236
Leberdiſtel 347
Leberkohl 346
Leberkraut 313
Leberrauten 419
Lein 237
Leinblat 215
Leindotter 311
Leinkraut 261. 308
Leinöhre 415
Levcoje 318
Lichtblume 247
Lichtrœslein 263
Liebesäpfel 211
Liebſtöckel 226
Lienen 288
Lieſchgras 178
Lieſchkolbe 387
Lilie 240. 241
Lilienwurzel 175
Linde 282
Linſe 336
Löcherſchwamm 428
Löffelkraut 290. 314
Löthen-Gras 188
Löwenfus 195
Löwenſchwanz 300
Loheiche 396

Lolch 186
Lonicere 206
Lucerne 342
Lungenkraut 199
Lungenmoos 425
Lyd-weich 260
Lyſimachskraut 203
Majoran 302
Malerkraut 263
Mannagras brandenb. 184
Mannaſchwingel 184
Mangold 218
Manstreu 219
Marchantie 425
Marchantiſches Afterm. 425
Marentacken 406
Mariengras 265
Marienrösle 263. 289
Maronen 397
Maſern 414
Masholder 414
Maslieben 368. 370
Maſtriche 396
Maſtkraut 196
Matt 426
Matronenblume 319
Matſafran 247
Mauerwig 214
Mauerkazen 262
Mauerpfeffer 262
Mauerraute 420
Mauerträuble 262
Maulbeerbaum 393
Mäuſeſchwänzgen 238
Mausöhrgen 197
Mausöhrlein 350. 361
Mavellen 415
Mayblume 243
Mayen 391
Mayenzaucken 243
Maywurz 310
Meelbeere 272
Meeldorn 273
Meereiche 426
Meergras 426
Meerhirſen 198
Megelkraut 395
Megerkraut 191. 192
Mehlbaum 234
Meyeramarant 394
Meierich 261
Meiſterwurz 221
Melde 218. 394. 412
Meliſſe 303
Melone 402. 403
Merianthes 202
Merzenglöckle 238
Merzenviole 379
Merzwurz 279
Metter 371
Meyerkraut 192
Miere 204
Minabern 415
Milchblume 330
Milchen 352
Milchglöckle 205
Milenz 181
Miliz 182
Milzkraut 257. 420
Miſpel 273
Miſtel 405
Mitſchelinsholz 213
Möhre 223
Möllerbrod 273
Mönchskopf 349
Mohn 281
Mohrrüben 223
Monarde 169
Monatsblume 202
Mondkraut 419
Mondraute 419
Mondviole 315
Moosblume 291
Mooſe 421
Morcheln 428
Morchelſchwam 428
Mottenblume 361
Münze 296. 362

Müzkraut 420
Muſcatellerkraut 171
Mutterkraut 303. 367. 370
Nabelkraut 308. 350
Nabelſaamen 192
Nachtſchatten 207. 210. 265
Nachtviole 318
Nagelkraut 215. 312. 395
Nägele-Schierling 246
Narciſſe 239
Narrenkappe 285
Naſtbuche 397
Natterblume 330
Natterkopf 201
Natterwurz 252
Natterzünglein 419
Nelcke 259
Neſſel 297. 392
Neſſelhopfen 408
Nieskraut 372
Nieswurz 290. 384
Nüsleinſalat 174
Ochsauge 371
Ochſenbrech 331
Ochſenkraut 331
Ochſenzunge 198. 201. 202
Odermenning 267
Ohnblat 255
Oelmagen 281
Oelſaamen 312
Orant 307
Osmunde 419
Oſterblume 287
Oſterlucey 384
Otten 391
Otterkopf 201
Papelbaum 408. 409
Pappeln 325. 326
Pappelblume 325
Papeleſpe 408. 409
Pappeln 325
Parthike 267
Paſtinac 231
Pechblume 264
Pechtanne 401
Peltſchenkraut 337
Peponen 402
Perlgras 181
Peſtilenzwurz 363
Peterſilge, Peterling 233
Peterskraut 411
Pfaffen- Hütle- Käpgen, Röslein 213
Pfaffenpint 385
Pfaffenröhrle 349
Pfaffenſchuh 384
Pfebe 402
Pfeffer indianiſcher 211
Pfefferkraut 313
Pfefferreiſeholz 213
Pfenningkraut 203. 314
Pferdegras 413
Pferdeſaamen 228
Pferdeſchwanz 418
Pferſingkraut 252
Pfingſtroſe 283
Pfingſtviolen 319
Pflaumen 271
Pfriemenkraut 330. 331
Pfüſter 430
Pimpinelle 194. 233. 395
Pipau 351
Platerbſe 334
Poley 303
Porſt 225
Portulac 266
Potentille 278
Preuſelbeere 250
Pulverholz 212
Pumpskeule 387
Purgierflachs 237
Quebecken 235
Quecken 188
Quelgras 181
Quendel 303
Quetſchen 272
Quiſpel-Linſen 177
Quittenbaum 275

Raden 263
Radendiſtel 220
Radiesgen 322
Ragwurz 381
Rainkohl 352
Rapünzchen 174
Rapuncel 205
Rauchbuche 399
Rauchlinde 218
Rauche 317
Raute 255
Raygras 185. 186
Rebendolde 227
Reiſelbeer 246
Reizker 427
Rettich 322
Rhabarber 253. 288
Rheinbeere 212
Rheinblume 361
Rheinfarn 359. 372. 420
Riedgras 180. 389
Rietſche 427
Riffen 185
Rindsauge 370
Ringelblume 376
Rindknoſpengras 388
Riſpen 185
Riſpengras 181
Ritterſporn 284
Rödelkraut 306
Röthe 192
Röttich 252
Roggen 187
Rohr 186
Rohrkolbe 387
Rohrſtrausgras 178
Rothauſe 397
Rolholz 399
Roscaſtanie 248
Roſe 276
Rösle 289
Roſenpappel 325
Roshuf 363
Rosmarin 170
Rospoley 298. 299
Rosveil 379
Rothbuche 397
Rotheiche 396
Ruprechtskraut 324
Roththanne 401
Rothwurz 198
Ruchgras 172
Ruhrkirſche 194
Ruhrkraut 361. 362. 366
Ruhrpflanze 360
Ruhrwurz 279
Rüſter 218
Saflor 357
Safran 174
Saintfoin 335
Salat 347. 352
Salbey 170
Salomonsſpiegel 243
Salzkraut 247
Samengünſel 281
Samkraut 196
Samtblume 369
Sandhabichtkraut 348
Sanickel 220
Sandkraut 261
Sandweyde 405
Saturey 294
Saudiſtel 347. 354
Saurampfer 246
Sauerdorn 245
Sauerklee 262
Sauerling 246
Saufenchel 225
Saukohl 346
Saukraut 352
Saumfarren 420
Savoyekohl 321
Scabioſe 190
Schärte 323. 353
Schafampfer 246
Schafgarben 372
Schafgras 184

Schaf-

Schafkörfel 222
Schafkraut 200
Schafribben 372
Schafthalm 163. 418
Schaftheu 418
Schalkraut 251
Scharbocksklee 203
Scharbockskraut 290
Scharfkraut 200
Scharlach 171
Scharte 322. 354
Schaumrösle 260
Scheere 231
Scherarde 191
Schibicken 235
Schierling 223. 229
Schiesbeere 206. 212
Schiesbeerholz 194. 235
Schildbesenkraut 315
Schildkraut 304
Schilf 186
Schimmel 430
Schlafbeer 210. 212
Schlagbeer 212
Schlangenmoos 421
Schlangenmord 346
Schlangenwurz 346
Schlehen 272
Schleisholz 400
Schlingbaum 234
Schlüsselblume 202
Schlutten 210
Schmalzblume 290. 291
Schmeerwurz 256. 310
Schmelen, Schmielen 180
Schmerbel 217
Schminckwurzel 198. 243
Schnabelkraut 324
Schnallen 281
Schneeballen 235
Schneckenklee 342
Schneeglöckle 238
Schnittlauch 240
Schölkraut 280, 290
Schotenklee 340
Schotenviolen 319
Schwämme 427
Schwaden 184
Schwalbenkraut 280
Schwalbenwurz 217
Schwarzdorn 272
Schwarzkraut 280
Schwarzkümmel, Kümmich 286
Schwarzdanne 401
Schwarweizen 307
Schwarzwurz 199
Schaumrösle 260
Schwedisch Heu 342
Schwefelwurz 225
Schweinbrod 334
Schweinsalat 351
Schweinentang 426
Schweiswurz 363
Schweizerhosen 207
Schweizerklee 339
Schwelcken 234
Schwerdlilie 174
Schwertel 174
Schwindelhaber 186
Schwindelkörner 230
Schwingel 183
Schroden 178
Schüsselschwamm 429
Scorzonere 346
Seebinsengras 176
Seekannen 282
Seelenholz 206
Seeplumpen 282
Seerosen 281
Seesalden 196
Seidelbast 251
Seidenbinsen 177
Seidenmoos 424
Seidenpflanze 217
Seifenkraut 258. 260
Seilweide 405
Semsen 176

Senf

Senf 321
Senfkohl 320
Serapias 383
Sichelklee 342
Siebenzeit 342
Sigmarskrautwurz 326
Silberblume 316
Silberkänne 401
Silene 260
Simſen 245
Sinau 195
Sinngrün 215
Soodkraut 357
Sommereiche 396
Sommerzwiebel 240
Sommerwurz 310
Sonnenblume 373
Sonnengünſel 283
Sonnenkrone 373
Sonnenthau 237
Sonnenwürbel 174
Sophienkraut 317
Sorbäpfel 273
Spahnholz 400
Spaniſche Wicken 334
Spargel 243
Spargelklee 342
Spargenſaamen 287
Sparck 264
Spechtwurzel 255
Speckliſie 206
Sperberbaum 273
Sperberkraut 193. 395
Spergel 265
Speyerling 273
Spick 295
Spierpflanze 275
Spiesgras 179
Spilbaum 212
Spillenholz 414
Spinat wilder 217
- - zahmer 406
Spindelbaum 213. 398
Spinnblume 247
Spinnenkraut 242
Springkraut 379
Springſamen 380
Stachelbeere 214
Stachelnus 194. 208
Stachelſchwamm 428
Stahlkraut 169
Stallkraut 331
Stainſel 330
Staubaftermoos 427
Staubſchwamm 429
Stechapfel 208
Steinbrech 257. 264. 275
Steifenfarrn 420
Steineiche 396
Steinhirſe 198
Steinklee 340. 342
Steinlinde 218
Steinpeterlein 233
Steinraute 420
Steinwicken 339
Steinſame 197
Stendel 382
Stendelwurz 381. 383. 384
Sternblume 290. 364
Sternkraut 191. 358. 364
Sternleberkraut 191
Sternmoos 412
Sternwurz 364
Stickwurz 404
Stinckbaum 271
Stockroſen 325
Storchenſchnabel 323
Stosfarren 420
Strausgras 180
Streichblume 372
Streichkraut 268
Streifenfarrn 420
Sternpflanze 261
Strenzel 234
Strickgras 175
St. Walpurgiskraut 419
Sturmhut 285
Süsbaſt 251
Süsfarn 420

Süsholz 334. 390
Süsklee 338
Süsling 346
Sumpfrodel 307
Tabacк 209
Täſchelкraut 314
Tag und Nachtblume 379
Tanne 379
Taſche Taſchenкr. 313. 314
Taubeneſſel 297. 298. 299
Taubenкropf 260. 329
Tauber wilder 408
Taug 426
Taupinambour 374
Tauſendblat 372
Tauſendguldenкraut 219
Tauſendſchön 394
Tazette 239
Teichlilie 175
Teufels abbis 190
Teufelsbeer 210
Teufelskirſche 206
Teufelsmatten 194
Teufelsmilch 269
Thanwedel 163
Theriacskraut 173
Thurnкohl 320
Thurnкraut 320
Thymian 303
Töberich 187
Tollbeer 209
Tollкirſchenbeer 209
Tollкörfel 224
Tollкranz 187
Tolкraut 209. 223
Torfmoos 422
Torfſegge 390
Tragant 339
Traubenbeer rote 213
Traubenкirſche 271
Traubenfarren 419
Traubenſtocк 214
Treſpe 184
Trigonelle 341
Trolblume 290
Trüffel 429
Türкiſcher Bund 240
Türкiſch Korn 388
Tüpfelfarn 420
Tulpe 241
Ulmbaum 218
Unholdenкraut 250
Unſtetкraut 288
Vailantien 413
Veilweiſſer 238. gelber 318
Veilwurz gemeine 175
Venusſchuh 384
Vergis mein nicht 197
Viehgras 182
Vierling 196
Violen 318. 378
Viola matronalis 319
Vogelbeerbaum 273
Vogelfus 337
Vogelкirſche 271. 272
Vogelкraut 236. 312
Vogelmeyer 261
Vogelmilch 241
Vogelneſt 223. 224. 383
Vogelwicken 334. 335
Vöttich 252
Wachholder 410
Wachholderbeerbaum-Moos 426
Wachtelweizen 307
Waid 202. 322
Waidwicke 335
Waldbart 275
Waldbettſtroh 192
Waldeſche 414
Waldfarren 420
Waldhirſe 180
Waldhopfen 408
Waldeichern 335
Waldкirſchenbaum 272
Waldкnabenкraut 383
Waldкohl 320
Waldmangold 256
Waldmeiſter 191

Wald-

Waldmeyerich 261
Waldnachtſchatten tödlicher 210
Waldpoley 301
Waldrebe 288
Waldſtroh 192
Waldwicken 334
Waldwinde 206
Walckerdiſtel 189
Waldmeyerich 261
Walnus 397
Walpurgiskraut 419
Walwurz 200
Walzenkraut 340
Wanzengeſicht 374
Waſſer angelic 227
Waſſerbetonien 309
Waſſerblume 236
Waſſercyperngras 390
Waſſerdoſte 358
Waſſerfroſcheppich 227
Waſſerfalkraut 366
Waſſergras 181
Waſſerhirſe 181
Waſſerholder 235
Waſſerilgen 175
Waſſerklee 203
Waſſerkraut 358
Waſſerrosſchwanz 418
Waſſerſchlauch 168
Waſſerſchluten 418
Waſſerlinſe 386. 387
Waſſerliſch 254
Waſſermelone 402
Waſſermerck 227
Waſſernus 194
Waſſerſtern 163
Waſſertulipan 282
Waſſerviole 254
Waſſerwate 427
Waſſerwegerich 248
Watte 177
Wau 268
Wayd 322
Wegbreit 193
Wegdiſtel 356
Wegedorn 211
Wegerich 193
Wegetritt 251. 258
Wegkres 315
Wegſenf 318
Wegwarten 353
Weide 404. 408
Weidenhopfen 408
Weiderich 203. 249. 267
Weinblat 415
Weinkraut 421
Weinnägele 246
Weinrebe 214
Weinſchierling 246
Weinſtock 214
Weisheckbuche 399
Weisdorn 273
Weislebern 415
Weistanne 401
Weiswurzel 243
Weizen 188. 307. 389
Wekholder 410
Wellſaamen 317
Welſchkorn 389
Weltſtroh 192
Wendeblume 318
Wermuth 360
Wiederſtos 261. 263. 264
Wiederthon 242
Wieſen angelic 227
Wieſenbertram 372
*W*ieſenblume 291. 187
*W*ieſenflachs 177
*W*ieſenfönich 179
*W*ieſengaraffel 279
*W*ieſengeld 203
*W*ieſenhaber 185
*W*ieſenhopfen 408
*W*ieſenklee 340
*W*ieſenkopf 193
*W*ieſenkreſſe 316
*W*ieſenraute 288

Wieſenſchafthalm 418
Wieſenſcharte 354
Wieſenwatte 177
Wieſenwedel 275
Wieſenwolle 177
Wicke 334. 335
Wildgarben 275
Windblume 287
Winde 204
Windhalm 180
Windhaber 185
Wintergrün 214. 216. 256
Winterkannenkraut 419
Wilder Kohl 352
Wirbeldoſte 301
Wirſching 321
Wolfsbaſt 251
Wolfsbart 346
Wolfsbeer 253
Wolblume 331
Wolfsfus 169
Wolfsgeſicht 201
Wolfsgift 285
Wolfskirſche 209
Wolfsklauen 421
Wolfskraut 285. 262
Wolfsmilch 269
Wolfstrap 301
Wohlgemuth 302
Wolgras 177
Wolkraut 207
Wolverley 366. 367
Wucherblume 369
Wüterich 228
Wunderblume 206. 207
Wundholzbaum 416
Wundklee 332
Wundkraut 262. 332
Wunnebaum 391
Wüzerling 228
Yylle 426
Zahnloſe 300
Zapfenholz 212
Zaunblume 242
Zaunreben 404
Zaunrübe 403
Zaunwicken 334. 335
Zeiland 251
Zeitloſe 247
Zehrwurz 385
Zelblume 356
Zellery 234
Zinnkraut 419
Zipperleinskraut 234
Zirmet 221
Zitteresſpe 409
Zittergras 182
Ziegenholz 400
Zottenblume 202
Zuckerahorn 415
Zuckererbſe 333
Zunder Zundel 428
Zungenkraut 262
Zwetſchgen 272
Zweckholz 206. 213
Zweyblat 383
Zweyzahn 357
Zwiebel 240. 242
Zymbelkraut 308
Zyrincken 165

ERRATA.

Pag. 1. lin. 7. lege qui
--37. l. 10. Uſus.
--39. l. 39. quæ
--40. l. 24. acquirentia
--45. l. 30. Thapſus
-45. l. 32. adde Hyoſcyamus
--46. l. 2. excreſcentibus facile qui completi.
--46. l. 10. orientibus
-48. l. 1. plurimi occultantes
--50. l. 19. nullo
--51. l. 22. perpendicularia
--52. l. 2. elevet
--59. l. 18. del. (ſ. enerve,)
--69. l. 4. alii
--76. l. 27. ſine involucris
--77. l. 39. uni
--81. l. 28. Befruchtungs
--87. l. 10. del. geſpaltene, eingeſchnittene
--87. l. 14. Verba Anagallis, Oxalis Convolvulus, Primula, ſunt poſtponenda verbo Veronica l. 19. & l. 15. verba 2. 3. 4. dentata (zahnig) anteponenda ſunt lineæ 28. fiſſa.
--87. l. 31. bifida, trifida &c.
--90. l. 33. Sideroxylon
--93. l. 13. verba conſtans phalangibus 5. verbo Parnaſſiæ poſtponenda ſunt
--99. l. 14. Polygonum
--106. l. 4. Papaveris
--116. l. 37. Hygrometrica
--119. l. 15. antiqui
--119. l. 40. folioſa
--124. l. 2. ſi deficit.
--132. l. 11. glacialis
--165. l. 31. nigrefaciunt & chartarei baccis mutant
--174. l. 7. ad acetaria
--174. l. 26. luteo-tinctorius

pag. 178. l. 28. deſtituta.
--183. l. 5. Gluma
--181. l. 4. Waſſergras, Waſſerhirſe
--185. l. 33. Mäuſe-Haber
--212. l. 34. Frangula
--218. l. 34. adde Ipernbaum
--219. l. 1. prelorum
--219. l. 4. Enzian
-230. l. 12. loco E ponatur C
--238. l. 36. Schnee- Merzen - Glöckle.
--239. l. 32. luteis
--254. l. 25. Diptam
--272. l. 10. ſubanodyna
--272. l. 12. Zwetſchgen
--272. l. 14. Prunum
--274. l. penult. Cydonii
--275. l. 3. malus ſativa eſculenta
--288. l. 39. folioſa
--300. l. 24. Durant.
--301. l. 4. Cardiaca
--318. l. 30. verba Apr. Uſ. Apibus. poſtponenda ſunt verbo Goldlack in lin. 31.
--306. l. 30. Kuhweizen
--304. l. 41. Prunella
--312. l. 6. adde bivalvis, loculis quibusdam ſæpe vacuis.
--325. l. 12. Pappelblume
--331. l. 10. hac
--350. l. 1. diluens
--364. l. 9. Jacobs-Blume-Kraut
--387. l. 23. Maſculi
--401. l. 18. quæ edunt
--405. l. 28. ſtipites
--408. l. 13. octandria
--408. l. ultima tegendas
--414. l. 5. in oſſibus
--416. l. 9. vehicula

Sculptor ærarius *Hypni* ſpeciem, Muſcis inſerendam, Tab, X. n, 3. expreſſit loco *Hydni* quod omiſit.

III. Linæi Classificatio plantarum.

Tab. I.

Monandria. Diandria. Triandria. Tetrandria. Pentandria. Hexandria. Heptandria.

Octandria. Enneandria Decandria. Dodecandria. Icosandria. Polyandria.

Didynamia. Tetradynamia. Monadelphia. Diadelphia. Polyadelphia. Syngenesia.

Syngenesia. Gynandria. Monoecia. Dioecia. Dioecia. Polygamia. Cryptogamia.

Folia Simplicia.

Tab. II.

Tab. III.

63.

Binatum.

64.

Terna tum foliolis ſeſſilibus.

65.

Terna tum foliolis petiolatis.

66.

Digi tatum.

67.

Pedatum.

68.

Piña tum - cum impari.

69.

Piña tum - abruptum.

70.

Pinnatum - alter natim.

71.

Pin natum - interrupte.

72.

Pinnatum - cirrhoſum.

73.

Pin natum - Corjugatum.

74.

Pina tum - decurſive

75.

Pin natum - articulate.

76.

Lyr atum.

77.

Biternatum, Duplicato - ternatum.

78.

Bipin natum, Duplicato - pinnatum.

79.

Triter natum.

Triplicato - ternatum.

80.

Tripinnatum ſine impari.

81.

Tripinnatum cum impari.

Folia Determinata.

Tab. IV.

87. Revolutum.

86. Reclinatum.

85. Horizontale.

84. Patens.

83. Erectum.

82. Inflexum.

91. Florale

90. Rameum.

89. Caulinum.

89.

88. 88. Seminale.

99. Vaginans.

Conatum. 98.

97. Perfoliatum.

96. Amplexicaule

95. Decurrens.

94. Sessile

93. Petiolatum.

92. Peltatum.

107. Fasciculata.

106. Imbricata.

105. Accrose.

104. Alterna.

103. Opposita.

102. Quaterna.

101. Stellata.

100. Articulatum.

108.

109.

Spathulatum.

110.

Parabolicum.

Frons.

Caules

111. Squamosus culmus.

111. Teres caulis.

112.

111.

112.

114. Articulatus culmus.

113.

Scapus.

115.

Volubilis caulis.

116. Dichotomus caulis.

117.

Brachiatus caulis.

Tab. V.

a. Cirrhus
118.
a.
b
c
Glandula concava c.
b
Stipulæ. b.

119.
* Glandula pedicellata.

Spina simplex.
121.
Spina triplex.

flos.
a
a
a. Bractea.
a
b
b
folia.
120.

122. Aculeus simplex.

123. Aculeus triplex.

124.
a. Axilla.
a
b. folia opposita.
a
b
b

Radices.

127. a.
Tunicatus bulbus.

127. b.
Globosa radix.

Solidus bulbis.
126 a.

Fibrosa radix.
b. 126

Squamosus bulbus.
125

129
Fusiformis radix.

Tuberosa radix.
128

130
Ramosa radix.

131
Repens radix.

Tab. VI.



Flos Umbellatus.

flos Caryophilæus.

Tab. VII.

151.
Pollen antherae sub Microscopio.







Pedunculus.



Tab. VIII.

calyx quinquefidus.
b
b
a Corolla quinquefida.
b
b
b
a
a
a
1.
flos Campaniformis.

2.
flos Infundibuliformis.
tubus.

3.
flos Hypocrateriformis.
Corolla.
tubus.

4.
a
b
b
a
a
flos Rotatus.
a. Corolla. b. pistillum.

a
a
a
a. Styli
Ovarium.
Corolla
5.
A. Globosus.

tubus
6.
fl. Linguiformis.

b.
labium superius.
labium inferius.
a
Corolla.
polatum.
Lamina
10. x.
Unguis
Calyx.
a. b. Corolla monopetala ringens.
7.
Fl. Personatus.

a. labium superius.
b. lab. inferius.
c. Stamina.
d. pistillum.
a
d
c
b
8.
Calyx.
flos Ringens.

Labium superius
denticulatum
lab. infer.
Calyx.
9.
fl. Bilabiatus.

Nectarium calcar.
b
a
a
Calyx.
a. Corolla
b. Stamina
10. x.
fl. Cruciformis.

b
a
a. Corolla pentapetala.
b. Stamina
11.
fl. Rosaceus.

a. Stamina.
b. Corolla.
12.
flos Liliaceus.

a. Vexillum
b. ala
c. Carina
fl. Papilionaceus.

i. 16.
fl. Hermaphroditus
Pistillum.
Calyx.
Corolla
Semen coronatum.
Corolla.
Stigma.
antkera.
15. t.
Semen.
fl. Longulatus Compositus.

a
b
c
c
a
14. y.
a. Calyx imbricatus.
b. flores Feminei in radio.
c. flor. Hermaphroditi.
flos Compositus tubulosus.

Anthera.
Corolla.
tubus.
14. y.
Semen Coronatum.
fl. Hermaphroditus disci.

Corolla
14. y.
Semen.
fl. Femineus c radio.

a. Corolla
b. anthera
Calyx.
15. t.

a
b
x
y
a
b
a
a
a
fl. Semiflosculosus.
18.

a
b
a
Stigma.
a
b
a
flos Apetalus Stamineus.
17. c.

Corolla linguilata.
pistillum.
Semen
i. 16.
fl. Femineus.

Calyx.
17. c.

flos Conifer. Strobilus.

Foliatio: Folia transversim dissecta. Tab. IX.

Filices.

Musci.

Algæ.



Agaricus.



Boletus.







Hydnum.

Phallus.

Clathrus



Elvela.



Clavaria.

Lycoperdon.





Mucor.

Peziza.



Stemonitis Gl.